

E. J. 1917



GIDS

VOOR DEN TUIN

1917

29^e JAARGANG.

KONINKLIJKE KWEKERIJ „MOERHEIM”
DEDEMSVAART.

Voorwaarden en Opmerkingen.

PRIJZEN.

De prijzen in dezen Catalogus genoemd, doen die van vorige opgaven vervallen. Alle artikelen worden aangeboden voor zoover zij bij ontvangst der bestellingen disponibel zijn. Na 1 Augustus kunnen de prijzen worden gewijzigd.

Bij bestelling van zaden geldt de prijs, welke per 5 ons is genoteerd, voor minstens 2½ ons; voor minder dan een half ons wordt de prijs per lood berekend. Bij planten, heestergewassen, enz. geldt de prijs per 100 voor minstens 25 stuks; waar alleen de prijs per stuk is aangegeven, worden voor 10 stuks 8 en voor 5 stuks 4 stuks in rekening gebracht.

Voor grootere hoeveelheden dan in dezen Catalogus worden aangeboden, gelieve men prijsopgaaf aan te vragen.

BESTELLINGEN.

Alle bestellingen worden zoo spoedig mogelijk uitgevoerd. Eene opeenloopping van bestellingen in het voorjaar maakt het dikwijls onmogelijk om ze alle onmiddellijk uit te voeren, waarom een tijdige inzending niet genoeg kan worden aanbevolen.

Ingeval de uitvoering niet onmiddellijk kan plaats hebben, ontvangt men eene gedrukte kennisgeving.

Mocht van de gevraagde Zaden, Planten of Heesters soms een enkel artikel niet voorhanden zijn, zoo zal ik zoo vrij wezen deze door de meest nabijkomende soort of kleur te remplacieren, tenzij men bij de bestelling te kennen geeft, dat ze niet door andere soorten mogen worden vervangen.

Om abuizen te voorkomen gelieve men een zeer duidelijke opgave van de verlangde artikelen te doen, en daarvoor de Bestellijst te gebruiken, die hierbij is ingesloten. Men gelieve echter de prijzen niet in te vullen en brieven of mededeelingen op een afzonderlijk blaadje te schrijven, daar deze Bestellijst dan bij de goederen als nota kan worden teruggezonden. Duidelijke opgaaf van naam en woonplaats is zeer gewenscht.

VERPAKKING.

Verpakking wordt zoo billijk mogelijk berekend en alleen dan teruggenomen, wanneer de terugzending franco plaats heeft binnen één maand na de levering, met duidelijke vermelding van het adres van den afzender, en mij hiervan schriftelijk mededeeling wordt gedaan. Hiervoor wordt dan de helft van het in rekening gebrachte bedrag van de nota afgetrokken.

VERZENDING EN VRACHT.

De verzending geschiedt voor rekening en risico van den besteller en, tenzij daaromtrent bepaalde voorschriften zijn gegeven, op de mij meest geschikt voorkomende wijze.

Voor zoover niet van den postpakketdienst kan worden gebruik gemaakt, verdient het aanbeveling de lokale middelen van vervoer op te geven.

De verzending van Zaden en Planten kan veelal niet tegelijk geschieden; men gelieve dus de regeling hiervan geheel aan mij over te laten.

Men heeft mij dikwijls verzoekt om de bestellingen franco te verzenden, doch ik zou dit niet kunnen doen

zonder de prijzen der planten en zaden aanmerkelijk te verhoogen, hetgeen natuurlijk ten nadeele der bestellers zou zijn. Ik ben evenwel bereid om als eene tegemoetkoming in de vracht, bij elke bestelling van zaden gratis eenig bloemzaad, en bij elke bestelling van planten en boomen, gratis eenig bloemzaad of eenige vaste planten of knolgewassen, (alles naar mijne keus) te voegen.

BETALING.

Aan mij onbekende bestellers wordt alleen tegen vooruitbetaling of onder rembours geleverd.

Over het bedrag der facturen wordt gewoonlijk na drie maanden beschikt, tenzij een andere tijd van betaling is overeengekomen. Voor bedragen boven f 10.— ontvangt men, alvorens daarover gedisponeerd wordt, een gedrukte kennisgeving. Met toezending van het bedrag per postwissel zal men mij echter zeer verplichten en de kosten van overmaking kunnen van de rekening worden afgetrokken. Deze bedragen voor sommen van f 5.— en minder 2½ cent; van f 5.— tot f 12.50, 5 cent; van f 12.50 tot f 25.—, 10 cents, enz. Gemakshalve wordt bij de meeste nota's een postwissel-formulier ingesloten, om deze wijze van betaling gemakkelijk te maken, terwijl ze mijne administratie vereenvoudigt. Men gelieve dezen maatregel evenwel niet als een aanmaning tot betaling te beschouwen.

Van ingekomen postwissels wordt per kaart bericht van ontvangst gezonden. Voor zeer kleine sommen worden ook postzegels in betaling genomen.

PROVISIE.

Aan Tuinbazen worden de gebruikelijke voordeelen toegekend, mits zij mij hun adres opgeven. Van Turfstrooisel, Raffia, Snoelmessen, Etiketten, enz. wordt geen provisie berekend.

VERANDERING VAN WOONPLAATS.

Opdat mijne Prijseouranten steeds geregeld kunnen worden toegezonden, wordt men beleefd verzocht mij elke verandering van vaste woonplaats mede te deelen.

BUITENLANDSCHE ORDERS.

Zendingen naar het Buitenland worden met de meeste zorg verpakt, in overeenstemming met den duur der reis, en geschieden alleen tegen vooruitbetaling.

Bij bestellingen uit Oost- en West-Indië, Transvaal, enz., gelieve men het bedrag, vermeerderd met emballage- en frankieerkosten bij de bestelling te voegen.

KLACHTEN.

Wanneer nlettegenstaande de meest nauwlettende zorg, het een of ander door mij geleverd artikel reden tot klagen mocht geven, wordt men vriendelijk verzocht mij daarvan ten spoedigste in kennis te stellen, ten einde zoo mogelijk de oorzaak der klachten weg te nemen.

Men vindt mij ook steeds bereid om, waar door toevallige omstandigheden iets van het gezondene mocht mislukken, dit naar billijkheid te vergoeden, zonder dat dit evenwel recht geeft tot korting op de rekening.

Indien men van dezen Catalogus zelf geen gebruik mocht maken, zoo wordt men beleefd verzocht dien aan anderen ter inzage te verstrekken of af te staan.

Door het mededeelen van adressen van aan mij onbekende belangstellenden, zal men mij bijzonder verplichten.

DEDEMSVAART, Januari 1917.

Telegram-Adres „MOERHEIM” — DEDEMSVAART.
Telefoon Intercommunaal No. 5.

B. RUYS.

Correspondance en français. Correspondence in english. Deutscher Briefwechsel.
Correspondance i dansk og norsk. Brevväxling på svenska.



Hofleverancier van
H. M. de Koningin-Moeder.



Hofleverancier van H. M. de Koningin.



Hofleverancier van Z. K. H.
Prins Hendrik der Nederlanden.

AFDEELING I. ZADEN.

A. Groentezaden.

N.B. Tengevolge van de verbreking van vele internationale verbindtngen door den oorlog als uitvoer-verboden enz., wordt het elk jaar moeilijker om alle soorten Groente- en Bloemzaden verkrijgbaar te stellen en ben ik tot mijn spijt genoodzaakt verschillende soorten uit mijn catalogus te doen vervallen. Zooveel mogelijk zijn deze echter door anderen geremplaceerd en hoop ik dat mijne afnemers zich daarmede zullen willen behelpen. Bovendien was ik genoodzaakt van vele soorten de prijzen belangrijk te verhoogen.

De voorraden van vele artikelen zijn gering en daarom kan het niet genoeg worden aanbevolen om vooral zoo vroegtijdig mogelijk te bestellen, want is de voorraad van sommige artikelen eenmaal uitverkocht, zoo zal het ulterst moeilijk en in sommige gevallen onmogelijk zijn om deze weer opnieuw aan te vullen.

Gemakshalve zijn onderstaande soorten genummerd en zooveel mogelijk alphabetisch gerangschikt, en men kan bij bestelling volstaan, met de nummers en de verlangde hoeveelheden op te geven. Aan het einde der lijst van Groentezaden vindt men de zaden van Keukenkruiden enz.


N.B. 1 lood of decagram = 10 gram.

1 ons of hectogram = 10 lood = 100 gram.

Waar de prijzen niet per gewicht, maar per PAKJE zijn aangegeven, worden geen halve pakjes afgeleverd, en hoeveelheden van minder dan 5 cent worden niet verkocht.

ANDIJVIE.

Andijvie verlangt, evenals de meeste bladgroenten, een flink gemesten grond. De gekruid-bladerige soorten zijn het meest geschikt om als salade te worden gebruikt. Zaai een weinig van de vroege soorten voor de eerste maal half April. Om het doorschieten te voorkomen, moet men eenige malen met een kluitje verplanten en vooral zorgen voor voedzamen grond. Door gieten of schermen tegen felle zonneschijn, wanneer dit noodig mocht blijken moet men voorkomen, dat de groei der planten tot stilstand komt, hetgeen het schieten ten gevolge heeft. De latere soorten zaai men half Juni—Juli. Men plant de andijvie op een voet afstands onderling; zoodra de planten volgroeid zijn, bindt men ze op en na onistreeks 14 dagen zijn ze voor 't gebruik geschikt.



Andijvie, zomerkrul.

1. Andijvie, echte vroege krop p. lood f 0.25
Deze heeft reeds uit zichzelf neiging tot kroppen, toch is het opbinden niet geheel overbodig.

3. Andijvie, fijne zomerkrul f 0.25
Wordt veel gebruikt voor het maken van andijvie-salade.

9. Andijvie, gewone breedblad volhart p. lood f 0.25
Deze soort wordt het meest voor den inmaak gebruikt.

11. Andijvie, echte late krop - 0.30
13. " late fijne krul - 0.25

ARTISJOK.


De Artisjok is eene groente, die ten onzent nog weinig wordt gebruikt. Indien men een warmen bak heeft, zaai men in Februari, de plantjes kunnen dan reeds in Mei worden uitgeplant in een diep losgewerkten, voedzamen, liefst een weinig vochtigen grond en zullen dan hetzelfde jaar nog dragen. Op den kouden grond zaai men in Mei. Om flinke planten te krijgen, plante men ze op een afstand van minstens 80 centim. onderling. Des winters moeten de planten tegen strenge vorst worden beschut. De oude stengels worden dicht bij de wortels afgesneden en om elke plant wordt een heuveltje van aarde gemaakt, ter hoogte van 20 centim., zorgdragende dat er geen aarde in het hart der plant komt. Bij strenge vorst bedekke men daarenboven met droog blad. De bloemhoofdes worden vóór het ontkiemen afgesneden en gestoofd gegeten.


*Artisjokken.*

19. Artisjok, groote groene van Laon f 0.25

ASPERSIE.

Zaai in Maart of April en zorg dat de plantjes, als ze te dicht staan, worden gedund op een onderlingen afstand van 8 à 10 cM. In 't volgende voorjaar, in Maart of April, kan men de bedden aanleggen; men zorg voor diep omgewerkten, voedzamen en goed gedraineerden grond. Plant op 2 voet afstand onderling. Het derde jaar kan men beginnen te steken; men make in 't voorjaar boven elke plant een heuveltje van 1 voet hoog, met grond uit de paden; ook kan men de bedden boven de planten regelmatig oplooogen. Zoodra de spruiten zich daarboven vertoonen, slecht men het heuveltje, breekt de jonge scheut boven den wortelhals af, en maakt het daarna weer in orde. In 't najaar wordt de oppervlakte der bedden weder gelijk gemaakt. Na 15 Juni mogen geen Aspersies meer gestoken worden.

*Aspersie.*

25. Aspersie, vroege van Argenteuil f 0.20
-  Voor Aspersieplanten zie Afdeling II A.

AUGURKEN.

De Augurken verlangen een humusrijken, goed gemesten grond. Men zaai begin Mei op bedden van 1.25 M. breedte, welke in het midden iets hooger zijn dan de zijden en op het midden waarvan men op 60 cM. afstand onderling kuiltjes maakt; in elk der kuiltjes legt men drie zaden en bedekt deze met een weinig aarde. Bij het

opkomen der plantjes behoudt men het sterkste, en snijdt de anderen onder de zaadlobben af. Een weinig verdunde gler kan zeer gunstig op den groei werken.

- p. lood p. pakje
29. Augurken, kleine, groene scherpe . . f 0.40 f 0.15
31. „ „ „ gladder . . . 0.40 - 0.15

BIETEN of KROOTEN.

Voor bieten kiese men een voedzamen, liefst in 't vorig jaar gemesten grond. Zaai in regels die 3 à 4 cM. diep en 30 cM. van elkander verwijderd zijn. De plantjes worden zoodanig uitgedund, dat ze op 25 cM. afstand onderling komen te staan. Tenzij men gaarne zeer vroege bieten wil hebben, zaai men niet vóór eind April of begin Mei. Voor de winterprovisie bewaart men ze het best in een kuil, evenals de aardappelen, of in den kelder.



- p. ons p. 1/4 ons
39. Bieten, gewone donkerroode . . f 0.50 f 0.15
41. Bieten, bleekblad, donkerroode . . f 0.50 - 0.15


Hoewel het blad licht van kleur is, is de wortel bijzonder donker en fijn van smaak.

- p. ons p. 1/4 ons
43. Bieten, Non plus ultra, half lange . . f 0.60 f 0.20
45. „ platronde Egyptische . . . - 0.60 - 0.20
47. „ ronde zwartroode - 0.60 - 0.20

SNIJBIET of WARMOES.

Deze groente wordt geheel op dezelfde wijze gekweekt als de Bieten. Beide behoren tot dezelfde plantensoort. Bij de eerste hebben echter door de cultuur de bladeren, bij de andere de wortelen een meerdere ontwikkeling gekregen. De kweekwijze van beide is gelijk, en verwijs ik hier dus naar hetgeen van de Bieten is gezegd. Tegen het eind van September kan men reeds beginnen met telkens de meest ontwikkelde bladeren af te snijden voor het gebruik, en hiernede voortgaan tot laat in den herfst; waarom deze groente ook wel winterspinazie genoemd wordt.

- p. ons p. 1/4 ons
51. Snijbiet, goudgele f 0.60 f 0.20

*Snijbiet „Lucullus.”*

- p. ons p. 1/4 ons
53. Snijbiet „Lucullus” f 0.80 f 0.25
- Deze nieuwe snijbiet is een prachtige verbetering van de gewone. De bladeren zijn geelgroen en mooi gekruld. Zeer aan te bevelen.

BOONEN

Evenals alle vlinderbloemige gewassen, hebben de boonen tot vermogen, door de bacteriën, die zich in de knolvormige gezwellen der wortels bevinden, stikstof uit de lucht te verzamelen. Ze vereischen dus geen versch gemesten grond, doch hebben veel behoefte aan kali (potasch), welke men met succes kan toedienen in den vorm van haardasch of patentkali. — **Stoksnij- en Stokslaboonen** (of princessen) zaait men begin Mei voor de eerste maal en voor de late pluk nog eens begin Juni. Velen plaatsen de stokken kruiselings over elkander. Op deze wijze winden de ranken zich spoedig in elkander, zoodat licht en lucht niet overal vrijen toegang hebben. Ik kan daarom aanbevelen om elk stok afzonderlijk en recht overeind te zetten op regels, welke 1 M. van elkaar verwijderd zijn, en in de regels op 50 à 60 cM. afstand onderling. Bij elk stok legt men 6 tot 10 boonen. Het is nuttig om de planten tot aan de zaadlobben aan te aarden. **Stamsnij- en Stamslaboonen** (of princessen) zijn minder gevoelig voor de koude dan de stokboonen en kan men reeds vroeger zaaien, namelijk voor de eerste maal begin April, op een warm plekje. Men dekke dan des nachts gedurende eenigen tijd met bloempotten. Indien men vervolgens niet tuschenpoozen van drie weken zaait, tot half Juli, kan men zich tot laat in den herfst een opeenvolgende oogst van boonen verschaffen. De snijboonen zaait men op 20 cM. afstand, op regels welke 50 cM. van elkander verwijderd zijn; de slaboonen op 12 cM. afstand, op regels van 40 cM. afstand onderling.

61. **Stoksnijboonen, vroege breede Veensche.**

p. 5 ons f 2.—, p. ons f 0.45

Deze brengt niet zulke lange scheeden voort als de slagzwaardboonen, maar is vroeger en veel rijkdragender.

63. **Stoksnijboonen, extra lange breede slagzwaard.**

p. 5 ons f 2.—, p. ons f 0.45

Is te bekend om eenige aanbeveling te behoeven.

64. **Stoksnijboonen, lange breede slagzwaard, zonder draden**

p. 5 ons f 2.40, p. ons f 0.50

Eene nieuwe, draadlooze Stoksnijboon, van bijzondere aanbeveling.

67. **Stamsnijboonen, lange breede echte**

p. 5 ons p. ons

f 2.10 f 0.45

71. " vroege smalle

- 1.75 - 0.40

73. " broei

- 1.75 - 0.40

75. **Stokslaboonen, Juli**

- 1.75 - 0.40

Deze is de vroegste, die tot heden bekend is. Zij is bovendien buitengewoon vruchtbaar.

77. **Stokslaboonen, (princessen) gewone**

p. 5 ons p. ons

f 1.50 f 0.35

79. **Stokslaboonen, (princessen) vroege**

- 1.50 - 0.35

81. **Stokslaboonen, (princessen) fijne**

- 1.90 - 0.40

Deze prinsesseboon is zeer geschikt voor den inmaak of om in bussen te worden geconserveerd en is bovendien buitengewoon rijkdragend.

83. **Stokslaboonen, (princessen) fijne**

p. 5 ons p. ons

f 2.— f 0.45

Deze nog betrekkelijk nieuwe soort heeft het onschatbare voordeel, dat ze bij alle goede en voortreffelijke eigenschappen van de fijne trosjes, ook nog geheel zonder draden is en bijzonder malsch.

85. **Stokslaboonen, (princessen) enkele**

p. 5 ons p. ons

f 1.75 f 0.40

87. **Stokslaboonen, (princessen) groote**

- 1.40 - 0.30

89. **Stokslaboonen, (princessen) Van Celst**

- 2.20 - 0.50

91. **Stokslaboonen, Rijnsche dikvleezige**

- 1.75 - 0.40

93. **Erwteboonen, of kievitseitjes, gespikkeld**

- 1.60 - 0.40

95. **Pronkboonen, witbloeiende stok, verbeterde lange reuzen**

- 3.20 - 0.70

97. " roodbloeiende stok

- 1.20 - 0.30

99. **Stamslaboonen „Alpha“**

- 1.75 - 0.40

Eene der allervroegste stamslaboonen met ronde, dikvleezige, zeer lange scheeden en geheel zonder draden. Ze is ontstaan uit de bekende Hinrichs reuzen en heeft dezelfde goede eigenschappen, doch is 10 à 14 dagen vroeger dan deze; zeer rijkdragend.

101. **Stamslaboonen, vroege dubbele met lange scheeden**

p. 5 ons p. ons

f 1.75 f 0.40

Deze slaboon is een der vroegste soorten voor den kouden grond en kan ook wegens de schoongevormde scheeden worden aanbevolen.

104. **Stamslaboonen „Perfect“**

p. 5 ons p. ons

f 2.40 f 0.50

Een in de laatste jaren in den handel gebrachte enkele Stamslaboon, die alle aanbeveling verdient. Zij is zuiver zonder draden en van een fijnen smaak, terwijl zij in tegenstelling met andere fijne soorten goed tegen ongunstig weder bestand en geheel vrij van ranken is.

105. **Stamslaboonen, (princ.) gew. enkele**

p. 5 ons p. ons

f 2.25 f 0.50

107. " (princ.) groote dubbele

- 1.50 - 0.35

108. " dubb. zond. draden

- 1.60 - 0.35

109. " fijne vroegesuiker

- 2.— - 0.45

110. " Delicata

- 1.75 - 0.40

Deze soort wordt ook wel Stamtros-princessen zonder draden genoemd; zeer geschikt voor den inmaak.

111. **Stamslaboonen, (princ.) fijne zonder draden**

p. 5 ons p. ons

f 2.25 f 0.50

113. " Hinrich's reuzen

- 1.60 - 0.35

Deze is een der rijkstdragende stamslaboonen. Zij is tamelijk vroeg en geeft buitengewoon lange scheeden, die uitmunten in malsheid. De boonen zien er zeer eigenaardig bont gekleurd uit, namelijk wit met rose vlekjes. Zij is ook een der smakelijkste boonen om te drogen.

115. **Stamslaboonen, Hinrich's reuzen**

p. 5 ons p. ons

f 2.20 f 0.50

zuiver witte, zonder draden

117. " chocolaadbr. rotjes

- 0.90 - 0.20

119. " citroengele

- 0.85 - 0.20

N.B. In antwoord op sommige aan mij gerichte vragen diene, dat **Slaboonen** ook Princessen-, Heeren-, Suiker- of Spersieboonen worden genoemd.

123. **Stamboonen Chevrier's, groene**

p. 5 ons p. ons

f 1.50 f 0.35

125. " gewone bruine

- 0.50

127. **Stamboonerwtten, gespikkelde**

- 0.85 - 0.20

131. **Tuinboonen, gewone langscheede**

p. 5 ons

f 0.50

133. " vroege breede witklem

- 0.70

Deze verscheidenheid is de beste van alle. Zij is 8 à 10 dagen vroeger dan de gewone Haarlemmer, draagt zeer rijk en brengt breede lange afhangende scheeden voort, terwijl de boonen, daar dezelfde witklem zijn, langer malsch blijven dan eenige andere verscheidenheid.

134. **Tuinboonen, witbloeiende**

p. 5 ons

f 0.80

Deze nieuwe soort heeft de eigenaardigheid, dat zij in tegenstelling met alle andere soorten, wit bloeit, en gekookt, zoowel als ingemaakt, geheel wit blijft.

135. **Tuinboonen, breede Haarlemmer of klooster**

p. 5 ons

f 0.80

137. " lange afhangers of Leidsche

- 0.75

141. " groote Engelsche Windsor

- 0.80

143. " groene Eng. Windsor

- 0.80

147. " Mazagan, voor inmaak

- 0.75

De Tuinboonen zaait men in 't voorjaar, zoodra de grond kan worden bewerkt. Men make daartoe 2 regels op 20 cM. afstand van elkaar en 4 à 5 cM. diep. Hierin legge men de boonen 20 cM. van elkaar verwijderd, en na deze weer te hebben dichtgemaakt, make men op 90 cM. afstand van de vorige weer 2 regels enz. Om ze vroeg te kunnen plukken, kan men ook zeer dicht zaaien op een warm plekje in den tuin of onder een raam, om de jonge plantjes later uit te planten. In den open grond zaait men met tuschenpoozen van 4 weken. Tusschen de dubbele regels kan men gelijk met de boonen, spinazie, radijs enz. zaaien.

CICHOREI.

Zaait begin Mei in diepen, lossen en niet versch gemesten grond, en in regels, die 30 cM. van elkaar en 2 cM. diep zijn. Voor uitdunnen, zoodat de plantjes in de regels op 5 cM. afstand onderling komen te staan, moet worden gezorgd. In November worden de wortelen

gerooid, de bladeren boven den wortelhals afgesneden en zijn ze geschikt, om te worden gebleekt. Men kiese hiertoe een vorstvrije plaats uit in schuur, kelder of ouden broeibak en men kan op verschillende wijzen te werk gaan. Altijd kiese men echter flinke wortelen uit met niet meer dan één kop. Om zeer spoedig te kunnen snijden, make men een ^h van paardemest ter dikte van 40 cM., waarop men een goede laag teelaart van 30 cM. dik aanbrengt. Men steekt hierin de wortelen, die van onderen af op een lengte van pl.m. 20 cM. schuin ^z afgesneden, naast elkaar op regels, die 5 cM. van elkaar zijn verwijderd. Men zorge het licht op de een of andere wijze geheel buiten te sluiten en voor vorst te dekken. Na eenige weken kan men de bladeren snijden en gestoofd of als salade gebruiken. Om kropjes van Brusselsch Witloof te verkrijgen, bedekke men na het planten het geheel met een 20 cM. dikke laag fijne bladaarde of lichten tuingrond.



Cichorei.

Heeft men in schuur of kelder geen ruimte, zoo kan men ook een kuil maken in den tuin, en hierin op dezelfde wijze te werk gaan, het geheel met droge bladeren of oude matten voor vorst en regen dekkende. Ook zonder paardemest kan men de cichorei bleeken, doch dan duurt het langer. Heeft men een warme kuis, dan heeft men een schoone gelegenheid om onder de tabletten eenige aarde aan te brengen en hierin de wortelen te steken.

151. Cichorei, gewone lange	p. ons	p. lood
153. „ Brusselsch Witloof	f 0.60	f 0.15
	- 1.—	- 0.20

ERWTEN.

Tot de vlinderbloemige gewassen behoorende, gedijen de doperwten evenals de boonen enz. het best in grond die 't vorige jaar gemest is, en vele kalk- en kali- (Potsch) houdende bestanddeelen bevat. Het is raadzaam ze niet meerdere jaren achtereen op denzelfden grond te kweken. Stamdoppers legge men in 3 à 4 cM. diepe regels en op 15 cM. afstand onderling. Naarmate de soorten lager of hooger groeien, moeten de regels 30 à 40 cM. van elkaar verwijderd zijn.

De rijdsdoppers (soorten, die pl. m. 60 cM. en hooger groeien) zaai men in dubbele regels, die dan een afstand van 10 cM. onderling hebben. De erwten worden hierin dan uitgestrooid, en wel dunner, naarmate de soorten hooggroeiend zijn. Wanneer de erwten opkomen, plaatse men er rijs bij en is het nuttig ze dan tevens een weinig aan te aarden. Voor de eerste maal zaai men in Januari of Februari, en vervolgens om de 3 weken tot half Juni. Van af het begin van April zaai men de late soorten.

N.B. De verscheidenheden met * gemerkt zijn gerimpeld.

Hoewel de hoogte in centimeters bij elke soort is aangegeven, gelieve men er aan te denken, dat de erwten hooger groeien, naarmate de grond krachtiger, meer stikstofhoudend is.

VROEGE DOPERWTEN.

	Hoogte in cM.	p. 5 ons	p. ons
161. Doperwten *GRADUS (Ideal)	100	f 1.—	f 0.25
Vroege erwt, met enorm groote scheeden.			
163. Doperwten *Wonder v. Amerika 20		- 0.90	- 0.20
Een der vroegste en rijkstdragende stamdoppers.			
165. Doperwten *William Hurst	20	- 1.10	- 0.25
Verbeterde variëteit der W. v. Amerika, die langere schokken voortbrengt en zeer rijkdragend is.			
167. Doperwten, gele stam of kruip 15		f 0.90	f 0.20
169. „ *Bliss' Abundance			
(overvloods)	45	- 0.85	- 0.20
Zeer aanbevelenswaardig; de planten brengen een groote hoeveelheid doperwten voort, zoodat deze verscheidenheid terecht „overvloeddoper" is genoemd.			
171. Doperwten, Emerald Gem.,			
vroege groene extra 45		f 0.90	f 0.20
173. „ Girling's extra vroege 45		- 0.90	- 0.20
Deze beide laatste Engelsche soorten zijn buitengewoon vroeg en rijkdragend.			
175. Doperwten, Lentedopper, vroege			
groene	60	f 0.80	f 0.20
179. „ Carters first crop,			
vroege, extra	75	- 0.80	- 0.20
181. „ *Laxton's Alpha	75	- 1.—	- 0.25

183. Doperwten, eerste vroege Mei	Hoogte in cM.	p. 5 ons	p. ons
„ Prince Albert	75	f 0.65	f 0.15
185. „ vroege Haarlemsche 90		- 0.70	- 0.15
Van de doperwten met gladden korrel is deze zonder twijfel een der vroegste en daarbij zeer rijkdragend. Van de Hollandsche soorten kan ik deze als één der beste aanbevelen, daar bovendien de smaak zeer fijn is.			
187. Doperwten, *Delicates	30	f 0.90	f 0.20
Lage groene; zeer geschikt voor de inmaak.			

MIDDELVROEGE OF VOLGERS.

	Hoogte in cM.	p. 5 ons	p. ons
193. Doperwten, gewone Mei	75	f 0.65	f 0.15
195. „ gele krombek, beste			
opvolgers	120	- 0.75	- 0.20
197. „ Vlijmsche krombek 90		- 0.85	- 0.20
Deze soort wordt in Noord-Brabant op groote schaal gekweekt voor de Engelsche markt. Zij is enorm rijkdragend en zonder twijfel een der beste middelvroegste doppers.			
203. Doperwten, *Champion of			
England	120	f 0.90	f 0.20
207. „ raspers, gele ruige	180	- 0.90	- 0.20
208. „ „ groene „	180	- 0.90	- 0.20

LATE DOPERWTEN.

	Hoogte in cM.	p. 5 ons	p. ons
211. Doperwten, *Daisy	60	f 0.90	f 0.20
Late Engelsche Doperwt, groote scheeden, zeer rijkdragend.			
217. Doperwten, gr. Kaapsche groene 90		f 0.80	f 0.20
219. „ gewone lage groene 90		- 0.65	- 0.15
221. „ hooge groene groote 200		- 0.90	- 0.20

CAPUCIJNERS.

	Hoogte in cM.	p. 5 ons	p. ons
227. Capucijners, stam	30	f 0.85	f 0.20
229. „ lage vroege grijze 90		- 0.65	- 0.15
231. „ gew. lage Kaapsche 90		- 0.65	- 0.15
233. „ *lage witte	90	- 1.—	- 0.25
235. „ *hooge witte	180	- 1.—	- 0.25
237. „ laagbloeiende hooge 180		- 0.65	- 0.15

PEULEN.

VROEGE PEULEN.

	Hoogte in cM.	p. 5 ons	p. ons
243. Peulen de Grace, echte vroege			
stam	15	f 0.90	f 0.20
245. „ vroege stam of kruip	45	- 1.—	- 0.25
249. „ Lentepoul (40-daagsche) 100		- 0.80	- 0.20
251. „ vroege halfstam	70	- 1.—	- 0.25
253. „ „ Hendriks	100	- 0.90	- 0.20
255. „ gele kwee	100	- 1.—	- 0.25
257. „ gewone suiker	120	- 0.90	- 0.20
259. „ Moerheim's Reuzen	120	- 1.05	- 0.25

Deze in mijne kwekerij gewonnen peul is thans reeds over de geheele wereld bekend en behoeft geen bijzondere aanbeveling meer, daar ze zich een eerste plaats onder de peulsoorten heeft veroverd. Ze groeit pl.m. 4 voet hoog. Haar smaak is uitmuntend.

260. Peulen, dikvleezige Boter	75	f 0.85	f 0.20
Eene middelvroegste peul met dikvleezige schoten, welke, zeer lang zacht blijven.			

LATE PEULEN.

	Hoogte in cM.	p. 5 ons	p. ons
261. Peulen, lage grijze roodbl.	75	f 0.85	f 0.20
263. „ Ridder, witte	90	- 0.90	- 0.20
265. „ groote slier of krombek 150		- 1.30	- 0.30
267. „ wijker of zomer	150	- 1.10	- 0.25
270. „ hooge groene late	180	- 1.—	- 0.25

KOMKOMMERS.

Zaai omstreeks 10 à 12 Mei op een terrein, dat zooveel mogelijk tegen koude winden beschut is. In de bakken kan men reeds in Januari en Februari zaaien. Niets is voor de komkommer zoo schadelijk als koude en nattigheid. Het zaaien geschiedt op dezelfde wijze als de Augurken. Evenals voor deze zorge men voor lossen, goed gemesten grond. Om de vruchtbaarheid te bevorderen, moet men de loten, zoodra ze 6 à 7 bladeren hebben, innipen en aan elke plant niet meer dan 8 à 10 der grootste vruchten behouden. Het toedienen van vloeibare mest in een kuiltje bij elke plant, kan vooral bij droog weder worden aanbevolen.

- | | | |
|--|----------------|-----------------|
| | <i>p. lood</i> | <i>p. pakje</i> |
| 277. Komkommers, lange gele tros . . . | f 0.60 | f 0.25 |
| 281. " lange Amsterd. | - 0.25 | |

In de omstreken van Amsterdam wordt deze soort bijna uitsluitend verbouwd, en geeft prachtige lichtgele vruchten. Ze wordt hoofdzakelijk onder glas gekweekt.

- | | |
|---|-----------------|
| | <i>p. pakje</i> |
| 285. Komkommers, extra lange gele Goliath . . . | f 0.30 |
- Eene uitmuntende soort om onder glas te kweeken. De prachtige groote lichtgele vruchten zijn bezet met zwarte doortjes.

- | | |
|--|-----------------|
| | <i>p. pakje</i> |
| 286. Komkommers, witte Delftsche broei . . . | f 0.30 |
- Eene voortreffelijke witte broei-komkommer, welke in het Westland veel wordt geteeld; zeer rijkdragend.

- | | | |
|--|----------------|-----------------|
| | <i>p. lood</i> | <i>p. pakje</i> |
| 289. Komkommers, gewone lange groene . . . | f 0.70 | f 0.30 |
| 291. " Erfurter lange witte . . . | - 0.35 | |
| 293. " Rollison's Telegraph, groene . . . | - 0.30 | |
- Zeer milddragend en van buitengewoon schoonen vorm.

- | | |
|---|--------|
| 294. Komkommers, Alabaster, extra witte broei . . . | - 0.30 |
|---|--------|
- Eene zeer aanbevelenswaardige zuiverwitte broeikomkommer, die in gunstige omstandigheden eene lengte bereikt van 40 à 60 cM.

- | | | |
|---|----------------|-----------------|
| | <i>p. lood</i> | <i>p. pakje</i> |
| 295. Komkommers Japansche klimmende . . . | f 0.60 | f 0.25 |
- Deze moet bij rijen worden gekweekt, en verdraagt beter dan eenige andere, koude en nattigheid.

KOOL.

Bloemkool. De vroege soorten kunnen moeilijk zonder bakken worden gekweekt. Men zaait einde Augustus of begin September op voedzamen grond. Omstreeks half October neme men de plantjes op en plante ze in een bak op 5 cM. afstand onderling, doch late, tot het begint te vriezen, de ramen er af. Ofsehoon de plantjes wel eenige vorst kunnen verdragen, moet men bij strenge vorst, vooral des nachts dekken, doch zorg dragen nu en dan bij helder weder, midden op den dag, de ramen een weinig open te zetten. In Maart plante men uit op een warm plekje in den tuin, op een onderlingen afstand van 50 cM., met tusschenpoozen van 14 dagen en dekke in den eersten tijd des nachts met bloempotten. De Erfurter dwerg is de beste om onder glas te worden vervoegd. Indien men geen bakken ter beschikking heeft, zaait men half April, om ze evenals de Sluitkool verder te behandelen. De herfstbloemkool, zooals de uitmuntende verscheidenheden „Algiersche reuzen” en „Veitch's Autumn Giant” zaait men begin Mei. De planten worden op 70 cM. afstand onderling uitgezet. Zij hebben meer ruimte noodig dan de andere koolsoorten om zich goed te kunnen ontwikkelen. De kool moet steeds des morgens zoo vroeg mogelijk worden gesneden, wanneer de morgendauw er nog opligt.

De Broccoli is een soort Bloemkool en wordt gezaaid omstreeks half Mei en in Juli uitgeplant. In het najaar bindt men de bladeren op, en zoodra het begint te vriezen, brengt men een flinke laag droog blad tusschen de planten. Zoodra de vorst voorbij is, ontbloote men de planten en make de bladeren los; zeer vroeg in 't voorjaar zullen zich dan de koolen beginnen te vertoonen.

Alle koolsoorten verlangen een diepen, niet te drogen, goed gedraineerd grond en een koele standplaats. Alleen voor de vroege kool is het goed een warm plekje in den tuin op te zoeken. Van groot nut is het om het terrein diep om te werken en in 't najaar flink met kalk te bezaaien.

Roode, witte en Savoye kool zaait men gewoonlijk van Maart tot Mei, al naar gelang van de soorten en naarmate men de kool vroeg of laat wenscht gereed te hebben voor het gebruik. Men zaait vooral niet te dik en zoodra de planten een dikte hebben van een ganzeveder, plant men ze uit op een onderlingen afstand van 60 cM., in alle richtingen. Bij elke plant make men een kuiltje om zoo noodig te kunnen gieten.

Spruitkool zaait men tweemaal, n.l. begin Maart en einde April. Men gaat op dezelfde wijze te werk als met de sluitkool, doch plant uit op 50 cM. afstand onderling. Men ruste niet zoo zwaar als voor andere koolsoorten.

Boerenkool is een der minst vleeschende groenten, zoowel wat grondsoort als standplaats betreft. Men zaait half Mei en plante uit op 50 à 60 cM. afstand onderling. Speciale zorgen vereischt de boerenkool verder niet.

- | | | |
|---|-----------------|--------|
| 303. Broccoli, vroege Engelsche witte | <i>p. pakje</i> | f 0.20 |
|---|-----------------|--------|

- | | |
|---|--------|
| 305. Bloemkool, vroege Erfurter broei (gegarandeerd echt) extra | - 0.30 |
|---|--------|

De beste soort om te broeien. Zij is verreweg de vroegste en geen enkele andere soort overtreft haar in vastheid en witheid van kool; ze maakt zeer kleine bladeren en is daardoor zeer geschikt voor den bak.

- | | | |
|--|----------------|-----------------|
| | <i>p. lood</i> | <i>p. pakje</i> |
| 307. Bloemkool, fijne vroege | f 0.35 | f 0.15 |

- | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 309. " kortbeen Lenormand | - 0.50 | - 0.15 |
|-------------------------------------|--------|--------|

Deze is zeer vroeg en geeft flinke koolen, die niet zeer gevoelig zijn voor ongunstig weder.

- | | | |
|---|----------------|-----------------|
| | <i>p. lood</i> | <i>p. pakje</i> |
| 310. Bloemkool, Lecerf's groote middelvr. | f 0.30 | |

- | | | |
|--|--------|--------|
| 311. " groote Utrechtsche kortbeen | f 0.40 | f 0.15 |
|--|--------|--------|

- | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|
| 313. " vroege Langendijker | - 0.50 | - 0.15 |
|--------------------------------------|--------|--------|


- | | | |
|---|--------|--------|
| 315. " Eclipse, vroegste Ital. Reuzen | - 0.50 | - 0.15 |
|---|--------|--------|

- | | | |
|--|--------|--------|
| 317. " Algiersche groote, late | - 0.50 | - 0.15 |
|--|--------|--------|

- | | | |
|--|--------|--------|
| 319. " Non plus ultra, vroege Reuzen | - 0.40 | - 0.15 |
|--|--------|--------|

- | | | |
|--|--------|--------|
| 321. " Veitch's Autumn Giant Late Reuzen | - 0.35 | - 0.15 |
|--|--------|--------|

De vier laatste soorten zijn afkomstig uit Italië en geven bloemkoolen van enorme afmeting. Ze moeten echter niet te dicht worden geplant.




Witte kool „Roem van Enkhuizen.”

- | | |
|---|----------------|
| | <i>p. lood</i> |
| 322. Witte kool, „Roem van Enkhuizen” | f 0.20 |

Deze vroege soort geeft zeer vaste, uiterst fijn geribde kool; bijzonder aanbevelenswaardig.

- | | |
|---|----------------|
| | <i>p. lood</i> |
| 323. Witte kool, vroegste Express | f 0.20 |

Deze is zeer vroeg en geeft vaste spitsvormige koolen.



Witte kool, Winningstüdtter. (Zie blz. 6.)

325. Witte kool, fijne vroege kortbeen	p. lood	f 0.20
327. " " vroege spitse suikerbroods	-	0.20
329. " " " van Etampes	-	0.20
Extra vroege, spitse soort, zeer aanbevelenswaardig.		
331. Witte kool, spitse Winningstädter	-	0.20
(Zie afbeelding blz. 5.)		

Deze soort geeft langwerpige, spitse en zeer smakelijke koolen. Aan de eigenaardige groeiwijze kan men ze reeds van verre herkennen.

333. Witte kool, kortbeen Brunswijker groote	p. lood	f 0.20
335. " " " groote late	-	0.20
337. " " " Langedijker	-	0.20
In Noord-Holland wordt deze bijna uitsluitend gekweekt en bij groote massa's naar binnen- en buitenland verzonden.		
338. Witte kool, Maagdenburger groote witte	p. lood	f 0.20
339. " " Yorksche vroege fijne	-	0.15
341. " " Amager, late	-	0.20

Uitmunten Deensehe soort. Deze is een der beste voor wintergebruik.

353. Roode kool, fijne Utrechtsche zwartroode	p. lood	f 0.25
355. " " gewone donkerroode groote	-	0.25
357. " " groote late	-	0.25
359. " " „Zenith"	-	0.25

Eene middelvroeg soort, welke zeer donkerroode, vaste, fijngeribde koolen levert van middelmatige grootte.


360. Roode kool, Langedijker donkerroode late	p. lood	f 0.35
Winter		

Zeer aanbevelenswaardige late soort.

361. Kapperkool, groote met blauwe randen	-	0.20
365. Savoye kool, platte groote gele Rijsburger	-	0.25
367. " " groote gele, extra	-	0.20
369. " " fijne vroege gele	-	0.15
371. " " Bloemendaalsche gele	-	0.15
373. " " fijne vroege groene	-	0.20
377. " " Victoria fijn gekrulde	-	0.20
379. " " groote groene late	-	0.20
381. " " Noorsehe groote groene late	-	0.25

Deze is de laatste en tegen de strengste koude bestand. Vormt extra groote koolen, die tegen den winter een roodaachtigen tint krijgen.

383. Savoye kool, kleine groene met geel hart	p. lood	f 0.20
---	---------	--------



Spruitkool „Hercules."

391. Spruitkool „Hercules"	p. lood	f 0.20
--------------------------------------	---------	--------

Zoals de afbeelding aantoon, brengt deze prachtige Spruitkool een zeer groote menigte spruitjes voort, die bijzonder stevig en van een heerlijken smaak zijn.

393. Spruitkool, Brusselsche hooge	p. lood	f 0.15
395. " " lage	-	0.15
401. Boerenkool, lage groene gekrulde	-	0.10
403. " " middelhooge groene gekrulde	-	0.10
404. " " met tongvormig blad	-	0.10
Extra fijn gekrulde soort.		
405. " " hooge groene gekrulde	-	0.10
407. " " bonte of dessertkool in kleuren	-	0.20
409. Zeekool (Crambe maritima)	-	0.15

Een zeer smakelijke groente, die in Engeland in groote hoeveelheden wordt geteeld, om des winters of vroeg in 't voorjaar te worden gebruikt. Zij moet evenals de Cichorei gebleekt worden; haar smaak heeft eenige overeenkomst met de Asperge en ze wordt ook op ongeveer dezelfde wijze toe bereid. Ze wordt gezaaid in April.

KOOL- of KNOLRAPEN.

Deze zijn slechts eene verscheidenheid van de kool. Terwijl men van Sluitkool de tot een krop gegroeide bladeren nuttigt, en van Bloemkool den in wording zijnden bladmestengel, zoo wordt van de Knolrapen de knolvormig vergroeide stengel of wortel gebruikt, naar gelang deze zleh boven of onder den grond tot een knol vormt. Die welke boven den grond groeien, worden gewoonlijk Koolrabi of Glaskoolrapen genoemd, in onderscheiding van de gewone Koolrapen (onder den grond). Beide groepen worden op dezelfde wijze gekweekt. Men zaait omstreeks half Mei. Wanneer men vroeger zaait, zoo worden ze, indien ze niet jong worden gebruikt, onsmakelijk en stokkerig op sehotel. Beide soorten kunnen worden verplant, op onderlingen afstand van 35 à 40 eM., ofschoon het beter is de gewone koolrapen terstond ter plaatse te zaaien en later uit te dunnen. Wat den aard van den grond betreft zijn zij niet zoo kieskeurig als de koolsoorten.



Koolraap.

415. Koolrapen, vroege witte riembladerige	p. lood	f 0.15
Deze is buitengewoon vroeg.		
419. Koolrapen, gewone witte	p. ons	f 0.50
421. " " gele	-	0.50
423. " " groote gele blauwkop	-	0.50
426. " " Rutabaga of Zweedsehe	-	0.10

KOOLRABI of GLASKOOLRAPEN.



Koolrabi.

433. Koolrabi, Weener kleinbladerige fijne blauwe	p. pakje	f 0.20
435. " " witte	-	0.20
437. " " gewone groene glas	-	0.10
439. " " blauwe	-	0.15

Deze 4 soorten groeien alle boven den grond.

MELOENEN en CANTALOUPEN.


Meloenen zaale men einde Januari of begin Februari in den warmen bak in rijkelijk gemesten vruchtbaren grond. Na 4 weken zaale men nog eens, daar bij strenge vorst het eerste zaaisel dikwijls mislukt, vooral wanneer men bij donker weder of sneeuw niet dikwijls genoeg lucht kan geven. Omstreeks 4 weken na het zaaien worden de plantjes verspeend op een onderlingen afstand van 12 à 13 cM., eveneens in een warmen bak. Zoolang de plantjes in dien bak staan, moet men zooveel mogelijk lucht geven. In Maart (voor het tweede zaaisel in April) snoeit men ze boven het tweede blad in en brengt ze ter plaatse. De beide vertakkingen, die zich nu bij elke plant zullen vormen, laat men groeien totdat zij elk 8 à 10 bladeren hebben, waarna men ze tot boven het zesde blad innijpt. In 't begin van Mei zal men bij een goede behandeling op deze wijze de eerste vruchten kunnen plukken. Bij het kweken van Meloenen is het van het grootste belang er voor te zorgen, dat de temperatuur in de bakken meestijds hooger is dan 12 graden Celsius. Vooral tegen dat de vruchten rijp zijn, is een hooge temperatuur zeer gewenscht.

449. **Meloën, Berlijnsche net, zeer groot** f 0.20
Algemeen bekende soort.

451. **Meloën, Emerald Gem** - 0.20
Donkergroene Meloën met oranje-geel vleesch.

455. **Meloën, Jenny Lind** - 0.25
Kleine Meloën met groen vleesch.

456. **Meloën, Koning George** - 0.60
Er zijn zoo weinig geurige, scharlakenrood gekleurde Meloenen, dat de hierbij aangeboden nieuwigheid stellig in den smaak zal vallen. Ze wordt ongeveer 1½ tot 2, soms 3 K.G., heeft een prachtig net, verspreidt een heerlijken geur en is bijzonder dik van vleesch. Ze is buitengewoon sappig en van uitmuntenden smaak. Ze is geschikt zoowel voor kultuur op den kouden grond als in de warme bak.



Meloën Koning George.

459. **Meloën, Surprice (oranjekleurig vleesch)** f 0.25
462. **Cantaloup, de Paris** - 0.20
Parijsche marktmeloën.

465. **Cantaloup, noir des Carmes** p. pakje f 0.25

Een der vroegste meloenen, die het gemakkelijkst gekweekt wordt, terwijl de donkergroene, somtijds bijna zwarte vruchten, een bijzonder fijnen, geurigen smaak hebben.

467. **Cantaloup, Prescott fond blanc** p. pakje f 0.25

De groote vruchten hebben een witachtige, groengevlekte schil, die meestal van uitwassen is voorzien. Zeer saprijk.

PETERSELIE.

Om gedurende den ganschen zomer overvloed van Peterselie te kunnen snijden, zaait men in Maart en vervolgens in Mei en Juli, liefst op een half beschaduwde plaats. Het zaad moet niet diep onder den grond worden gewerkt. De beste methode is om op regels te zaaien, die 20 à 30 cM. van elkaar zijn verwijderd. Men dunne vooral de jonge plantjes uit, zoodat ze voldoende ruimte hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Het zaad heeft dikwijls meer dan een maand noodig om te ontkiemen.

471. **Peterselle, gewone snij** p. lood f 0.10

473. " **fijne krul** - 0.10

477. **Wortel-Peterselie** - 0.10

POMPOENEN.

De Pompoenen of eetbare Kalabassen worden in ons land nog zeer weinig als groente gebruikt. In sommige landen, vooral in Engeland, worden ze daarentegen zeer veel gegeten en niet ten onrechte gewaardeerd. Daar ze vrij gemakkelijk te kweken zijn, kan ik ze dus ten zeerste aanbevelen, en denjenigen, die ze niet kennen, aanraden om er de proef eens mee te nemen. Ze hebben evenals de komkommers een zeer voedzamen grond noodig. Het verdient bovendien aanbeveling om den grond 40 cM. diep uit te graven, het liefst langs muur of schutting en daarin een laagje paardenmest aan te brengen. Men vult aan met goeden tuingrond, liefst gemengd met kompostarde. Omstreeks half Mei maakt men op 3 voet afstands ondiepe kuiltjes, in elk waarvan 3 pitten worden gelegd en met zeer weinig grond bedekt. Indien ze alle drie opkomen, behoude men het sterkste plantje en snijde de overigen weg. Indien men vrees voor nachtvorsten, bedekke men de plantjes zoolang ze niet te groot zijn met bloempotten.

483. **Pompoenen, groote gele reuzen** p. pakje f 0.25

De vruchten dezer verscheidenheid worden dikwijls meer dan 50 Kilo zwaar. Men moet ze echter niet te rijp laten worden.

485. **Pompoenen, Vegetable Marrow** p. pakje f 0.25

De fijnste soort die in Engeland veel wordt gebruikt.

Sierkalabassen of Pompoenen, zie onder de rubriek Bloemzaden: „Zaden van Klimplanten.”

POSTELEIN.

Winterpostelein.

De Postelein houdt van een lichten doch voedzamen grond, en is zeer gevoelig voor koude, zoodat men in den open grond niet moet zaaien vóór begin Mei. Men zaait uit de volle hand of op regels, die dan 15 cM. van elkaar verwijderd moeten zijn, zorgdragende dat het zaad slechts weinig door den grond worde bedekt. Uittinnen is aan te bevelen, evenals veelvuldig gieten bij droog weder. Om ze een mooie gele kleur te doen verkrijgen, giete men tweemaal per dag in de volle zon, eenige dagen voor dat men begint te snijden. Wil men gedurende den geheelen zomer Postelein in den tuin hebben, zoo zaait men telkens met tusschenpoozen van 4 weken, tot dat men begin Augustus voor de laatste maal zaait.

491. Postelein, gewone groene p. ons p. 1/4 ons
f 1.10 f 0.30
493. „ „ gele f 1.20 - 0.35

497. Winterpostelein, (Claytonia perfoliata) p. lood
f 0.20
(Zie afbeelding blz. 7.)

Deze wordt op dezelfde wijze behandeld als de gewone Postelein. Men zaait ze Juli-Aug.

PREI.

De Prei heeft, indien men deze groente goed wil kweken een flink gemesten grond noodig. Men zaait voor de eerste maal begin Maart op een kweekbed. Zoodra de plantjes de dikte hebben van een pijpsteel, verplant men ze op 20 cM. afstand, in regels die 30 cM. van elkander verwijderd zijn. Vóór het planten worden de wortels ingekort en de uiteinden der bladeren afgesneden. Men laat een gedeelte der planten op het kweekbed staan; deze zullen dan zeer vroeg voor het gebruik geschikt zijn. Indien men zeer zware prei wenst te kweken, moet men de regels 10 cM. wijder maken en de uiteinden der bladeren nu en dan inkorten. Door aanaarden worden de stengels over een grootere lengte wit en wordt dus het eetbare gedeelte grooter. Dezelfde resultaten kan men ook verkrijgen door te planten in voren van 10 cM. diep. Zoodra de plantjes geworteld zijn, dient men ze hierin vloeiende mest toe, terwijl men na een paar weken den grond weer gelijk maakt. Voor de tweede maal zaait men einde April, doch alleen winterprei. Deze planten zullen in 't voorjaar niet zoo spoedig doorschieten als de vroeger gezaaide. Om in het voorjaar het doorschieten te voorkomen, neme men ze op en kuile ze dicht oopen in diepe voren.

501. Prei, lange Fransche zomer p. lood
f 0.20
503. „ dikke Brabantsche winter - 0.25
505. „ Leidsche winter - 0.30
507. „ Reuzen van Carentan - 0.25

Wordt buitengewoon dik en is evenals de Leidsche prei tegen den strengsten winter bestand.

RABARBER.

In Engeland vooral wordt deze groente op groote schaal gekweekt, en daar zij kan worden gebruikt in het voorjaar als er nog weinig groente is, verdiende zij ook in ons land meer algemeen te worden aangeplant.

De Rabarber verlangt een diep losgewerkten, goed gemesten grond. Indien men er prijs op stelt mooie gelijksoortige planten te hebben, moet men ze kweken door wortelstek, want door zaailing krijgt men gewoonlijk eenige verbastering. Men kan echter zaaien in Maart of April, op regels die pl.n. 30 cM. van elkaar verwijderd zijn. Voor uittinnen en schoonhouden moet natuurlijk worden gezorgd.

Wil men aanplanten voor het gebruik, zoo geve men de planten een tusschenruimte van 1 meter. Eerst een jaar na de planting kan men beginnen de bladstelen te snijden. Indien men het licht afsluit door een oude kist of ton of op andere wijze, zoodat de stelen eenigszins gebleekt worden, zoo verbeterd dit den smaak. De Rabarber laat zich zeer gemakkelijk forceeren. Men neemt de planten op en plaatst ze in kisten of bakken, waar men maar een matige warmte heeft. Men moet den grond vrij vochtig houden.

De zaadstengels moeten intijds worden afgesneden, daar anders de planten te veel verzwakken.

510. Rabarber, Challenge p. lood
f 0.10
Nieuwe variëteit welke vele zware, roode stengels voortbrengt.
511. Rabarber, Queen Victoria, grootbladerige - 0.15
Voor Planten zie Afd. II A.: „Planten voor den moestuin."

RADIJS.

In de bakken kan men Radijs zaaien in Januari en Februari. Op den konden grond begint men hiermede bij open weder in 't laatst van Februari, voor de tweede maal zaait men 3 weken later, en vervolgens gedurende den geheelen zomer, zelfs tot laat in den herfst, geregeld om de veertien dagen. In de warme zomermaanden kleeze men daartoe een koel en beschaduwde terrein. Zoodra de plantjes opkomen, moeten ze op plekken waar ze te dicht staan, worden uitgedund. In vele tuinen wordt dit nagelaten, doch dit verzuim is dan gewoonlijk oorzaak, dat ze slechts dunne, spillige wortels voortbrengen. Al naar gelang van den tijd des jaars, kan men de Radijs 4 à 6 weken nadat gezaaid is, gebruiken.

519. Radijs, Triumph-broel p. ons p. lood
f 0.60 f 0.10

De knol is kogelrond, wit met horizontale scharlakenroode streepen. Ook geschikt voor den vollen grond.



Radijs, Ijskegel.

521. Radijs, Ijskegel p. ons p. lood
f 0.40 f 0.05

Zooals de naam reeds aanduidt, heeft deze radijssoort de vorm en de doorschijnende kleur van een ijskegel. De smaak is zeer pikant en maakt haar tot een van de beste soorten.

523. Radijs, non plus ultra of ronde p. ons p. lood
scharl.roode kortlof broei, extra f 0.50 f 0.10
525. „ rozeroode kortlof broei - 0.60 - 0.10
527. „ scharl.roode witpuntige broei - 0.60 - 0.10
529. „ ronde witte kortlof broei - 0.50 - 0.10
531. „ „ scharlakenroode - 0.50 - 0.10
533. „ „ roode gewone - 0.50 - 0.10
537. „ „ roode witpuntige - 0.50 - 0.10
541. „ „ halflange roode witpuntige - 0.50 - 0.10
543. „ „ scharlakenroode - 0.50 - 0.10
544. „ „ vollegrondssoorten gemengd - 0.50 - 0.10


RAMENAS.

De Ramenas is een verscheidenheid van de Radijs, doch de meeste variëteiten nemen veel grootere afmetingen aan dan deze, indien men ze laat doorgroeien. De zomer-ramenas wordt gezaaid in Maart en April, doch schiet dikwijls door, waarom men met de winter-Ramenas gewoonlijk meer succes heeft. Deze wordt niet vóór Juni gezaaid. Men zaait de Ramenas op regels die 40 cM. van elkaar verwijderd zijn, en men dunt de jonge plantjes zoodanig uit, dat ze op 20 cM. afstand in de regels komen te staan. Men late de wortels niet te dik worden, daar ze dan den aangenamen smaak verliezen. In een koelen kelder kan men de winter-Ramenas tot in het voorjaar in zand bewaren.

545. Ramenas, witte delicatessen p. lood
f 0.15
Uitmuntende vroege soort.
547. Ramenas, ronde zwarte zomer - 0.10
553. „ „ ronde zwarte winter - 0.10
555. „ „ lange zwarte winter - 0.10

RAPEN of KNOLLEN.

Deze gedijen in bijna elken grond. Het best echter op terrein dat het vorige jaar gemest is. Vooral op lichte gronden is het zeer nuttig in het najaar den grond met kalk te bezaaien en dan om te spitten. De vroege soorten zaai men op een beschutte plaats in 't laatst van Februari of begin Maart en vervolgens telkens om de drie weken tot half Mei. Van af Juni tot Augustus neemt men de latere verscheidenheden. Wanneer men voor de laatste maal zaait, is het echter beter om weder Meirapen te nemen. Men zaait, uit de volle hand, of op regels; volgens de laatste methode maakt men de regels op 25 cm. afstand van elkaar. Voor voldoende uitdunnen moet vooral worden gezorgd, daar men anders geen flinke knollen kan verwachten.



Rapen.

- | | | |
|---|----------|---------------|
| 561. Rapen Gratscheff's, vroege platte scharlakenroode | p. lood | f 0.10 |
| 563. Rapen Prins Engalitscheff | - | 0.10 |
| Gele, horizontaal roodgestreepte vroege platte soort. | | |
| 567. Rapen, Italiaansche vroegste roodkoppige witte Mei | p. ons | f 0.10 |
| 571. " platte witte Mei | f 0.50 | - 0.10 |
| 573. " half. witte Hilversumsche | - | 0.10 |
| 575. " lange Nijmeegsche witte | - | 0.10 |
| 577. " ronde witte herfst | - | 0.10 |
| 579. " " gele " | - | 0.10 |
| | p. 5 ons | p. 1/4 ons |
| 583. RAAPSTELLEN | f 1.20 | - 0.30 f 0.10 |

Deze zaai men in Februari of Maart. Daar men deze groente gewoonlijk te dicht zaait, moet hierop vooral worden gelet.

SALADE.

Kropsalade verlangt, evenals de meeste bladgroenten, een goed gemesten grond. Om gedurende den geheelen zomer kropsalade te kunnen snijden, moet men dikwijls zaaien en voor elk jaargetijde de daarvoor meest geschikte soorten nemen. Om vroeg kropsalade te kunnen hebben, zaai men half September en wel vroege roodrand, bonie Chili of dergelijke. Zoodra de plantjes 3 à 4 bladeren hebben, plant men ze op een beschutte plaats of liever nog in een kouden bak op 10 cm. afstand van elkaar. De raimen moeten, tot dat het begint te vriezen, niet op den bak worden gelegd; slechts bij strenge vorst mag worden gedekt, terwijl men veel lucht moet geven. Een dun laagje sneeuw maakt het bedekken, ook van de planten, die op den kouden grond overwinteren, overbodig. In Maart begint men, zoodra het weder zulks toelaat, met het uitplanten op een warme plaats en op 25 cm. afstand onderling. Reeds in Mei beginnen de eerste kroppen zich te vertoonen. Voor het vervroegen in den bak zaai men eveneens in September, doch kleeze dan uitsluitend broeisorten. Om een opeenvolging van kroppen te verkrijgen, moeten de planten niet alle tegelijk worden uitgeplant. In Maart wordt weder op den kouden grond gezaaid, doch vooral niet te dik. Een gedeelte der plantjes worden uitgeplant, terwijl men de andere van afstand tot afstand laat staan; deze laatste zullen dan eenigen tijd eerder beginnen te kroppen dan de andere. Begin April zaait men nog weer een vroege soort en begint in de laatste helft van April met de latere verscheidenheden te zaaien, met 3 weken tusschen tijds, tot einde Juli. De zomerkropsalade wordt op 30 cm. afstand onderling uitgeplant.

Snijlsalade wordt gewoonlijk in Maart en April gezaaid en wel uit de volle hand of op 10 cm. van elkaar verwijderde regels. Men behoeft er verder geen zorg aan te besteden dan schoonhouden. De Fransche latuw wordt van Januari tot Maart in den bak gezaaid.

De **Pluksalade** is eene verscheidenheid tusschen de snij- en kropsalade in. Zij is zeer vroeg en geeft dik gezaaid ook eene uitnuntende snijlsalade. De losse kroppen die zij vormt (wanneer deze de ruimte hebben om zich te ontwikkelen) leveren gestoofd eene uitnuntende groente. **Bindsalade** wordt in Mei en Juni gezaaid en geheel op dezelfde wijze behandeld als de kropsalade; alleen moet ze evenals de andijvie worden opgehouden, om het geel worden der binnenste bladeren te bevorderen. De teelt der **Veldsalade** is zeer eenvoudig; men zaai einde Augustus of begin September, en zorg bijtijds voor voldoende uitdunnen. Zij groeit in bijna elken niet te drogen grond.

p. lood

587. Kropsalade, vroege kleine gele broei . . . f 0.25



Kropsalade „Maikönig.”


p. lood

588. Kropsalade, Maikönig f 0.20

Deze ontwikkelt zich bijzonder vlug en is daardoor als broeisalade zeer aan te bevelen; hare grootte en malschheid overtreffen die van alle andere soorten.

p. lood

589. Kropsalade, vroege kleine roodrand . . . f 0.25



Kropsalade „Duke of Cornwall.”

590. **Kropsalade, kardoezen** p. lood f 0.25
Een uitstekende broeisalade, die op de groenteveiling in Holland meestal den dubbelen prijs van andere soorten opbracht.

591. **Kropsalade, gewone groote gele** p. lood f 0.20
593. „ **bonte Chili, echt** - 0.20


Op alle gronden, doch vooral op zandgrond, is deze soort de kropsalade bij uitnemendheid. Zij kan gedurende den geheelen zomer worden gezaaid, en vormt groote zeer malsche kroppen, die niet spoedig doorschieten. De bladeren zijn eenigszins roodachtig gerand.

594. **Kropsalade, Duke of Cornwall** p. pakje f 0.35
(Zie afbeelding blz. 9.)

Deze soort Kropsalade is in Engeland reeds vrij algemeen; zij geeft groote, vaste kroppen, die zeer malsch en van een fijnen smaak zijn. Het is een vroege soort, die snel groeit en niet spoedig doorschiet.

595. **Kropsalade, Berlijner witte** p. lood f 0.25
597. „ **Rotterdamsche blanke** - 0.25
599. „ **Duitsche groote gele** - 0.20
600. „ **Banket- of Posteleinkrop** - 0.20
603. „ **Zeeuwsche blanke** - 0.20
605. „ **gele Trotskop** - 0.20
Vormt zeer vaste kroppen.
607. „ **Nansen, groote late; geschikt**
voor wintergebruik - 0.25

617. **Snijsalade, Fransche latuw** p. ons f 0.70 - 0.10
619. „ **blanke kropdunsel, fijne**
vroege - 0.65 - 0.10
620. „ **kruldunsel** - 0.75 - 0.10



Pluksalade.

621. **Pluksalade, Amerik. roodrand** p. 1/4 ons p. lood f 0.30 f 0.15
623. „ **Australische gele** - 0.30 - 0.15
629. **Veldsalade, groote N.-Hollandsche** p. ons 0.40 f 0.05
631. „ **donkergroene met volhart** 0.50 - 0.10

Bij deze verscheidenheid groeien de bladeren in rozetjes, zoodat zij gelijken op kleine kropjes. Door hare malschheid munt zij bijzonder uit.
637. **Molsalade, verbeterde breedbladerige** p. pakje f 0.15
639. „ **volhart** - 0.15

De kweekwijze van molsla is zeer eenvoudig. Men zaait ze in Maart of April en verplant ze in Mei of Juni op regels, die 35 cM. van elkaar verwijderd zijn. Men kan ze bleeken door in den herfst op elke plant een bloempot te zetten of het bed met zand te bedekken. Zij kan echter ook als de elcherci worden behandeld.



Bindsalade.

641. **Bindsalade, geelbladerige** p. lood f 0.20

SCHORSENEEREN.

Zaai einde Maart op regels die 20 cM. van elkaar verwijderd zijn. De plantjes worden tot op 10 cM. afstand onderling uitgedund. De Schorseeneer verlangt een voedzamen, ofschoon niet versch gemesten grond, welke diep moet zijn omgespit. Op koude en zware gronden zaait men omstreeks half Augustus. De jonge plantjes zijn niet zeer gevoelig voor vorst en beginnen vroeg in 't voorjaar weer te groeien; deze worden zwaarder dan die, welke in 't voorjaar zijn gezaaid. Gewoonlijk kan men echter, door in 't voorjaar te zaaien, reeds in 't najaar flinke wortels verkrijgen, vooral als men Reuzenschorseeneeren zaait. Als alle wortels in 't voorjaar niet zijn gebruikt, kan men de overgeblevene laten staan en kunnen ze in 't volgend najaar nog worden gebruikt, ofschoon ze niet zoo malsch en smakelijk zijn als de eenjarige.

645. **Schorseeneeren, gewone zwarte** p. ons p. 1/4 ons f 0.70 f 0.20
647. „ **lange zwarte Russische Reuzen** - 0.90 - 0.25

SELDERIJ.

De Selderij houdt van een frisschen, voedzamen, goed gemesten grond, die liever vochtig dan droog moet zijn. Het zaad moet evenals dat van de Peterselie lang in den grond liggen eer het opkomt.

Tuln- of Snijselderij zaait men begin April op den kouden grond. Bij aanhoudende droogte moet men zoo noodig gieten. Als de plantjes 4 à 5 blaadjes hebben, worden ze verplant en vereischen dan verder geen bijzondere zorg.

Bleekselderij. Om vroeg planten te kunnen hebben, zaait men in Februari onder glas, of (als men daarvoor geen bak disponibel heeft) einde Maart in den open grond. Als de plantjes nog klein zijn worden ze in den bak verspeend en na een week of 4 op de kouden grond uitgeplant. In de meeste tuinen wordt de bleekselderij in diepe voren geplant; om dit met succes te kunnen doen, moet men hoog gelegen terrein en een dikke laag teelaarde hebben, daar anders de planten licht gaan kwinen. Meer is het daarom aan te bevelen om op bedden te planten met 3 regels, welke 30 cM. van elkaar verwijderd zijn. In de regels behoudt men denzelfden afstand tusschen de planten onderling. Daar men voor het bleeken veel aarde noodig heeft, laat men tusschen de bedden een strook grond open van 75 à 80 cM. breed, welke men voor radijs, spinazie enz. kan benuttigen. Wanneer de planten bijna haar volkomen wasdom hebben bereikt, bindt men bij droog weder de bladeren van elke plant bij elkaar en strooit met een schop de aarde uit de overgebleven ruimte tusschen de planten, zoodat ze ongeveer tot op de helft zijn ingegraven. Na een dag of tien begraaft men ze zoodanig onder de aarde, dat alleen de toppen der bladeren zichtbaar zijn. Na een veertien dagen zijn ze geschikt voor de keuken en daar ze in dien toestand niet lang kunnen duren, moet men niet te veel planten tegelijk bleeken, telkens met 14 dagen tusschenpoozen.

Knoiseldeij wordt op dezelfde wijze gezaaid als de vorige, doch opdat de knol zich flink kan ontwikkelen, moeten de planten een weinig meer ruimte hebben en plante men uit op 40 cM. afstand in alle richtingen. Om zware knollen te verkrijgen wordt aanbevolen om gedurende den zomer een paar malen de horizontale wortels met een spade af te steken, zorgdragende de dieper liggende niet te beschadigen. Indien men ze vóór de vorst in een koelen kelder plaatst, kan men ze gedurende den geheelen winter bewaren.

651. **Tulnselderij, fijne snij** p. lood p. pakje f 0.15 f 0.05



Bleekselderij Engelsche grove.

- | | | |
|---|---------|----------|
| | p. lood | p. pakje |
| 655. Bleekselderij, Engelsche grove . . . | f 0.30 | f 0.10 |
| 663. Knolselderij, dikke kortlof . . . | - 0.30 | - 0.10 |
| 665. " Reuzen van Praag . . . | - 0.35 | - 0.15 |
- Brengt buitengewoon groote knollen voort.

SJALOTTEN.

Men plante de Sjalotten zoo vroeg mogelijk na den winter op regeis die 25 cM. van elkaar verwijderd zijn, terwijl de bolletjes op 10 cM. afstand onderling komen te staan, zorgdragende dat de bovenste helft derzelfde boven den grond uitkomt. Ze vereischen een voedzamen doch liefst niet versch gemesten grond. Begin Juli kan men ze optrekken en vóór dat men ze naar een droge plaats of zolder brengt, laat men ze eenige dagen in de zon drogen.

669. Sjalotten, om te planten . . . per Kilo f 0.70

SPINAZIE.

Van deze algemeen bekende groente valt weinig bijzonders te vermelden. De zomerspinazie en reuzenspinazie zaait men in Februari, Maart en April, telkens om de 2 à 3 weken; de winterspinazie in September tot begin October, en wel op 25 cM. van elkaar verwijderde regels. Om een goede opbrengst te verkrijgen moet flink worden gemest.

- | | | |
|--|----------|-----------|
| | p. 5 ons | p. 1½ ons |
| 673. Spinazie, breedblad, scherpzaad zomer | f 0.50 | f 0.20 |
| 674. " breedblad, rondzaad zomer | - 0.90 | - 0.35 |
| 675. " rondzaad winter | - 0.90 | - 0.35 |
| 677. " Reuzenblad van Viroflay | - 1.20 | - 0.45 |
| 679. " laat doorschietende scherpz. | - 1.20 | - 0.45 |
| 681. " Victoria, donkergr. zomer | - 1.40 | - 0.50 |

Uitmuntensoort voor den zomer, die niet spoedig doorschiet.

683. Overblijvende Spinazie (Rumex Patientia),

p. ons f 0.40, p. lood f 0.10

Deze behoort tot hetzelfde geslacht als de Zuring en wordt geheel op dezelfde wijze gekweekt. Zaaityd April.

Het is noodzakelijk deze soort ieder jaar opnieuw te zaaien, daar overjarige planten min of meer giftige eigenschappen bevatten.

685. Nieuw-Zeelandsche Spinazie (Tetragonia expansa),

p. ons f 0.30, p. lood f 0.10

Wordt gezaaid in Mei en vereischt weinig zorg.

TOMATEN.

Zonder kunstmatige warmte kan de Tomaat zich in ons land niet volkomen ontwikkelen. Omstreeks half Maart zaait men in een warmen bak en zodra de plantjes 3 bladeren hebben, worden ze in een anderen bak verspeend op 12 cM. afstand in alle richtingen. In 't begin van Mei neemt men overdag de ramen af om de planten langzamerhand aan de lucht te gewennen. In de laatste helft van Mei plant men ze uit in den open grond. Om het zetten der vruchten te bevorderen, moeten de loten nu en dan worden ingenepen. Zodra de vruchten zich hebben gezet, moet men dikwijls gieten.

692. Tomaten „Alice Roosevelt” p. pakje f 0.25

Eene vroege variëteit met groote, gladde, donker scharlakenroode vruchten, van eenen heerlijken smaak.

693. Tomaten „Deensche Export” p. pakje f 0.20

Deze wordt in Denemarken op groote schaal in den vollen grond gekweekt en kan door haar groote vruchtbaarheid en buitengewone gehardheid tegen ongunstig weer niet genoeg worden aanbevolen.



Tomaten „Jennie Vermeer.”

694. Tomaten „Jennie Vermeer” p. pakje f 0.50

Deze nieuwe Tomaat is gewonnen door de Groentekwekerij „t Huis de Geer” en van buitengewone vruchtbaarheid, zoo zelfs dat zij alle andere tot hertoe bekende soorten overtreft. Zij geeft mooi gevormde, vleezige vruchten en is de opbrengst tot 30 pond per plant. Voor hen die iets extra's willen kweken op dit gebied kan ik deze soort dan ook niet warmte aanbevelen.

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 695. Tomaten groote roode | p. pakje f 0.20 |
| 697. " gele | - 0.20 |
| 709. " vroege roode dwerg | - 0.20 |

TUINKERS.

De Tuinkers zaait men gewoonlijk in Februari en Maart, ofschoon men dezelve gedurende den geheelen zomer kan zaaien, doch dan liefst op eenigszins beschaduwde terrein. Geen plant is gemakkelijker te kweken dan deze.

- | | | |
|---------------------------------|--------|----------|
| | p. ans | p. ¼ ons |
| 711. Tuinkers, gewone | f 0.35 | f 0.10 |

De Ui is een der weinige groenten, die men met succes eenige jaren achtereen op denzelfden grond kan kweeken, indien men er de noodige zorgen aan besteedt. Voor bemesting moet men vooral geen ruwe bestanddeelen nemen, zooals versehe stalmen enz. Kippen- of duivenmist, guano- of goed verteerebare stalmist is het meest aan te raden. Wanneer de grond voor het zaaien gereed is, wordt aanbevolen om een mengsel van roet en zout er zeer dun over te zaalen. Men zaait nit de volle hand of op regels, welke dan naar gelang der soorten, 10 tot 15 cM. van elkaar moeten verwijderd zijn, zorgdragende dat het zaad niet te diep door den grond worde bedekt. De plantjes worden tot op 10 à 12 cM. afstand onderling uitgedund. Om zeer vroeg uien te hebben, zaait men in de laatste helft van Augustus tamelijk dik. Gedurende den winter heescht men ze tegen koude en sehrle winden, door eenig erwtewijs zorgvuldig over de bedden te leggen. Indien men deze plantjes vroeg in 't voorjaar, zoodra de grond dit toelaat, verplant op 30 cM. van elkaar verwijderde regels en 15 cM. onderlingen afstand, zoo zijn zij bij een goede behandeling reeds in Augustus voor 't gebruik gesiekt. Voor deze methode leent zich in 't bijzonder de Zwijndrechtsche groote gele, die een enorme grootte kan verkrijgen. De kleine, witte uijles voor den inmaak zaait men in Maart vrij dik, en indien men regelmatig gezaaid heeft, behoeft men niet te dunnen; deze kunnen reeds in Juli geogst worden.

WATERKERS.

De Waterkers is een plant, die in sommige streken van ons land ook in 't wild voorkomt, vooral op vochtige plaatsen. Men zaait op een vochtige plaats in April, zorgdragende veel te gieten, daar ze zonder veel water niet den aangenameur geur heeft. In Engeland vooral wordt de Waterkers veel gebruikt met een weinig zout bij het ontbijt. De sijnak is zeer genig en het is een zeer gezonde groente.

W O R T E L E N.

Wortelen zaait men, evenmin als alle wortelgroenten, niet op versch gemesten grond, daar ze anders dikwijls scheef groeien en spijten. In den bak zaait men voor de eerste maal einde December en vervolgens half Januari en half Februari. Men neme alleen de hroeisorten. Op deze wijze kan men de keuken van April tot Juni van wortelen voorzien. In den open grond zaait men voor de eerste maal in de maand Maart een der broeisorten. Om een geregelde opeenvolging van jonge malsehe wortelen in den tuin te kunnen hebben, moet men dit alle vier weken herhalen, en telkens die versecheidenheden nemen welke voor den tijd des jaars het meest geschikt zijn. Het zaaien geschiedt zoowel nit de volle hand als op rijen, die men dan dicht naast elkaar kan maken. Na het zaaien moet de grond flink worden aangetreden, daar anders de zaadkorrels door de kromme haren, waarvan ze voorzien zijn, niet genoeg met de aarde in aanraking komen. Wanneer de plantjes 3 à 4 blaadjes hebben, dunt men ze zoodanig uit, dat ze een onderlingen afstand van 3 à 4 cm. hebben, waarna het goed is nog eens ant te treden. In 't hegin van Juli zaait men voor de laatste maal en van dit of van een der laatste zaaisels kan men dikwijls gedurende een groot gedeelte van den winter smakelijke jonge wortelen plukken, indien men ze met een dikke laag droge bladeren voor de vorst bedekt. De winterwortelen zaait men in Mei.

Voor den broeiteelt is deze de wortel bij nitnemendheid en wordt door geen enkele andere soort overtroffen. De schoongevormde roode stompuntige wortelen hebben bijna geen hart en munten uit door zoeten en aangename smaak. Ook kan zij zeer goed op den kouden grond worden gezaaid en is dan eveneens zeer vroeg. Door deze nitnuntende hoedanigheden wordt zij terecht zeer gezocht.

749.	Wortelen,	korteroode deuvik	<i>p. ons</i>	<i>p. 1/4 ons</i>	<i>p. lood</i>
		of broei	f 1.60	f 0.45	f 0.20
751.	"	dubbele deuvik	- 1.80	- 0.50	- 0.25
753.	"	haiflange van Ca-			
		rentan	- 1.80	- 0.50	- 0.25

Uitnemende stomppuntige wortel, zoowel voor den bak als voor den vollen grond, die vroeg rood wordt.

755.	Wortelen,	Zwindrechtsche	<i>p. ons</i>	<i>p. 1/4 ons</i>	<i>p. lood</i>
		vroege korte roode f	1.80	f 0.50	f 0.25
759.	"	vroege fijne roode glas-	1.90	- 0.50	- 0.25
761.	"	halflange stompuntige			
		roode van Nantes .	- 1.70	- 0.45	- 0.20
763.	"	Hloornsche halfl. roode-	1.70	- 0.45	- 0.20
765.	"	lange roode stomp-			
		puntige	- 1.60	- 0.45	- 0.20

Voor herfstgebruik en voor winterwortel is deze bijzonder geschikt.

769.	Wortelen,	Nijmeegsche lange	<i>p. ons</i>	<i>p. 1/3 ons</i>	<i>p. lood</i>
		flaake winter . . .	f 1.60	f 0.45	f 0.20
771.	„	Flakkeesche lange			
		roode	- 2.80	- 0.75	- 0.35
773.	„	Friesche stompe			
		roode	- 2.50	- 0.70	- 0.30

Men zaait in April op regels en dunt na eenigen tijd zoodanig uit, dat de planten 20 centim. van elkaar verwijderd komen te staan. Twee maanden nadat men gezaaid heeft, kan men reeds beginnen eenige planten te plukken. In ons land wordt de zuring echter hoofdzakelijk vroeg in 't voorjaar gesneden. Ofsehoon men de zuring zeer goed uit zaad kan kweken, is het toch raadzaamer om planten te nemen met enkel mannelijke bloemen, daar deze geen zaad voortbrengen en daardoor een grooteren opbrengst aan forse brede bladeren geven. Voor die planten zie Afd. II. A. Planten voor den moestuin.

DIVERSE ZADEN.

(De zaaltijd is achter elke soort vermeld).

	<i>p. ons</i>	<i>p. lood</i>	<i>p. pakje</i>
781. Anijs (<i>April</i>)	f 0.40	f 0.10	
783. Basilicum, grove (<i>April</i>)	-	0.15	f 0.05
785. Boonenkruid (<i>Apr.-Mei</i>)	-	0.10	
786. Boterkool (<i>Mrt.-April</i>)	-	0.10	
787. Cardonzen (<i>April-Mei</i>)	-	0.25	- 0.10
789. Citroenmelisse „	-	0.25	- 0.10
790. Coriander „	-	0.15	- 0.05
791. Dessertblad (Malva Crispa) (<i>Apr.-Mei</i>)	-	0.10	- 0.05
793. Dille (<i>April-Mei</i>)	-	0.15	- 0.05
795. Dragon Russische (<i>Maart</i>)	-	-	0.20

Deze komt veel overeen met de echte overblijvende Dragon, doch heeft niet die aangename geur. De echte Dragon brengt nooit rijpe zaden voort, en kan alleen door stekken of afleggers worden gekweekt. Voor planten zie afd. II. A. Planten voor den moestuin.

		<i>p. ons</i>	<i>p. lood</i>	<i>p. pakje</i>
797.	Kervel, gewone (<i>Mrt.-Apr.</i>)	f 0.40	f 0.10	
799.	Komijn (<i>April-Mei</i>)		- 0.10	f 0.05
801.	Lavendel (<i>April-Mei</i>)		- 0.25	- 0.10
803.	Lepelblad „		- 0.25	- 0.10
805.	Lieve-vrouw-bedstroo of Wald- meister (<i>April-Mei</i>)		- 0.85	- 0.20
807.	Majoraan (<i>April-Mei</i>)		- 0.30	- 0.10
809.	Melde, gele (<i>April</i>)		- 0.15	
810.	„ roode „		- 0.15	
811.	Mosterd, bruine (<i>Mei</i>)		- 0.10	
813.	Peper, Spaansche (<i>Febr.-Mrt.</i>)		- 0.20	- 0.05
815.	Pimpernel (<i>April</i>)		- 0.15	- 0.05
	Raapstelen, zie bij Rapen.			
819.	Rozemarijn (<i>April-Mei</i>)		- 0.25	- 0.10
821.	Salle „		- 0.20	- 0.05
823.	Snijmoes blauwe Groninger (<i>Maart-April</i>)	f 0.40	<i>p. 1/4 ons</i> f 0.15	
			<i>p. lood</i>	
831.	Thijm (<i>April-Mei</i>)		f 0.20	- 0.05
833.	Venkel „		- 0.15	- 0.05
835.	Wijnruit „		- 0.25	- 0.10

B. Landbouwzaden.

GRASZADEN.

(Voorloopige prijzen.)

De prijzen van Gras- en Klaverzaden kunnen niet vóór **begin Februari** definitief worden vastgesteld en zullen dan gaarne op aanvraag worden verstrekt.

Voorloopig gelden de onderstaande prijzen. Ze zijn echter niet verbindend.

Voor het aanleggen van weiden gelieve men dienaangaande met mij in correspondentie te treden en daartoe de grootte van het terrein en de gesteldheid van den bodem op te geven. Ook dient te worden in aanmerking genomen, of men blijvend weiland wensch of den wisselbouw toepast. Opgaaf der benoodigde soorten, hoeveelheden en prijsopgaaf wordt door mij gaarne verstrekt en alle mogelijke inlichtingen daaromtrent gegeven.

Voor minstens 10 Kilo graszaad wordt de prijs
per 100 Kilo berekend.

	p. 100 kilo	p. kilo
839. Engelsch Raygras, Lolium perenne	f 48.—	f 0.55
841. Itallaansch „ „ italicum	- 55.—	- 0.60
843. Westerwoldsch Raygras	- 1.10	
845. Fioringras, Agrostis stolonifera	- 1.30	
847. Vossestaart, Alopecurus pratensis	- 2.60	
849. Reukgras, Anthoxanthum odoratum	- 2.65	
851. Fransch Raygras, Avena elatior	- 1.30	
853. Kamgras, Cynosurus cristatus	- 1.40	
855. Kropaar, Dactylus glomerata	- 1.25	
857. Hard Zwenkgras, Fest. duriuscula	- 1.10	
859. Rood „ „ rubra	- 1.50	
861. Schapengras, „ ovina	- 1.10	
863. Beemdlangbloem, „ pratensis	- 1.15	
865. Wollig Zorggras, Holcus lanatus	- 0.85	
867. Timotheegras, Phleum pratense	- 0.75	
869. Boschbeemdgras, Poa nemoralis	- 2.30	
871. Veldbeemdgras, „ pratensis	- 1.50	
873. Ruwbeemdgras, „ trivialis	- 2.50	
875. Gazongras, in de beste soorten gem.	f 100.—	- 1.10

KLAVERZADEN.

- 881. Noord-Brabantsche roode.
- 883. Roozendaalsche roode.
- 884. Overblijvende roode Klaver (Cowgras.)
- 885. Inlandsche witte.
- 887. Luzerne Provencer.
- 889. Zweedsche bastaard.
- 891. Incarnaat.
- 893. Gele Hoppeklaver.

(Prijzen worden gaarne begin Februari opgegeven.)

ZADEN VAN WORTELGEWASSEN.

	p. kilo	p. ons
894. Mangelwortelen Barres van Sludstrup, half lange gele	f 2.40	f 0.25
Eene zeer aanbevelenswaardige, <i>nieuwe</i> variëteit, welke bij eene proef op mijne boerderij uitstekend heeft voldaan.		
	per kilo	p. ons
895. Mangelwortelen, Groninger extra lange roode	f 1.40	f 0.15
897. „ Mammouth roode reuzen	- 1.40	- 0.15
899. „ extra lange gele reuzen	- 1.75	- 0.20
901. „ Golden Tankert	- 1.75	- 0.20
902. „ Eckendorfer roode reuzen	- 1.50	- 0.20
903. „ „ gele reuzen	- 1.40	- 0.15
905. Sulkerwortelen, groenkraag	- 2.40	- 0.25
907. „ jaapjespeen, rose	- 2.25	- 0.25
909. Koolrapen, groote gele blauwkop	- 3.—	- 0.50
911. „ gewone gele	- 3.—	- 0.50
915. Knollen of Rapen, gew. gele herfst	- 2.25	- 0.35
919. Turnips, lange witte roodkoppige	- 2.50	- 0.35
921. „ groote gele „	- 2.50	- 0.35
923. Voederwortelen, Nijmeegsche lange roode	- 1.60	
925. „ groote roode Paarde- of koepeen	- 1.60	
926. „ groote gele koepeen	- 1.—	
927. „ lange witte of pinkster-nakels	- 0.35	

Voor bovenstaande Wortelgewassen geldt de prijs
per Kilo voor minstens 2 1/2 ons.

ZADEN voor den GROENVOEDERBOUW.

(Voorloopige prijzen.)

Bij belangrijke partijen gelieve men eerst prijsopgave
aan te vragen.

	p. kilo
935. Lupinen, gele (Lupinus Luteus)	f —
945. Seradella, (Ornithopus sativus)	- 1.—
947. Spurrie, gew. (Spergula arvensis)	- 0.75
949. „ reuzen (Spergula maxima)	- 0.85



C. Bloemzaden.

Tot versiering onzer bloemtuinen komen hoe langer hoe meer de éénjarige Zomerbloemen in gebruik en m. i. zeer terecht. Door doelmatige keuze der soorten en elkaar opvolgende uitzaaiingen kan elk bloemenliefhebber die een eenigszins gunstig gelegen stukje tuingrond bezit, zich gedurende den geheelen zomer tot laat in den herfst van bloemen voorzien, ook zonder dat hij over een serre of broeibak kan beschikken.

COLLECTIËN BLOEMZADEN.

Voor hen, die met de keuze der soorten minder goed bekend zijn, heb ik evenals vorige jaren eenige collectiën samengesteld van verschillende soorten Zomerbloemen, waaronder Asters, Zomerviolieren, Balsaminen, Portulaca, Klimplanten, Stroobloemen of Immortellen, Siergrassen etc. tegen de volgende uiterst lage prijzen.

Collectie A.	10	pakjes in 10 soorten, Zomerbloemen	naar mijne keus	f 1.—
„ B.	20	„ „ 20 „ „ „	„ „ „	- 1.60
„ C.	40	„ „ 40 „ „ „	„ „ „	- 2.75
„ F.	10	„ „ 10 „ welriekende Zomerbloemen	„ „ „	- 0.90
„ H.	10	„ „ 10 „ Snijbloemen	„ „ „	- 0.90

Vele dezer soorten zijn in gekleurde zakjes verpakt, waarop de cultuur is aangegeven.

N.B. Van de bloemzaden kan geen kleinere hoeveelheid dan één pakje worden afgeleverd, daar deze te voren worden afgewogen en gereedgemaakt en het dus te tijdroovend zou zijn om in den drukken tijd van de verzending halve pakjes te maken.

Zaden van Zomerbloemen.

H. beteekent: hoogte; † beteekent: geschikt als snijbloem; * beteekent: geschikt voor randen.

† ADONIS.

De Adonis-soorten laten zich zeer gemakkelijk kweken; men zaait ze op de perken in de laatste helft van April. H. 50 cM.

1001. **aestivalis**, Zomer-Kooltje vuur, vuurrood, Bloeitijd Juni-Sept. . . . p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

1002. **Aleppica** p. pakje f 0.70

Prachtige, 40 à 50 cM. hooggroeiende plant, welke zeer sterk vertakt is en bijzonder rijk bloeit met glanzig donkerbloedroode bloemen. De bloei duurt minstens twee maanden, terwijl ze zoowel voor groepen als voor potcultuur geschikt is. Men zaait vroeg in het voorjaar op den vollen grond of in een kouden bak, daar het zaad 4 tot 6 weken noodig heeft om te ontkiemen.

1003. **autumnalis**, Herfst-Kooltje vuur, donker bloedrood. Bloeit Juli-Oct. . . p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

AGERATUM MEXICANUM.

Men zaait de Ageratums begin Februari in den warmen bak en zorgt voor eenige malen verspenen en langzamerhand afharderen, totdat men ze einde Mei of begin Juni op de perken uitplant. Ze laten zich ook goed gebruiken voor potcultuur. Bloeit Juni-Sept. H. 20 cM.

1005. „**Blausternchen**” p. pakje f 0.25

Prachtige gedrongen groeiende variëteit; de bloemen zijn blauwachtig wit, dat later in lichtblauw overgaat. Zeer geschikt voor mozaïkzakken.

1007. **Imperial dwarf blue**, donkerblauw, p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

1009. „ „ **white**, wit, p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

1011. **Little Dorrit**, laag met kleine donkerblauwe bloemen. p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

AGROSTEMMA.

Heimelroosje met helder gekleurde bloemen. Kan einde April in den vollen grond worden uitgezaaid. Bloeit Juli-Sept. H. 30 cM.

1017. **coeli-rosa fimbriata nana**, prachtig purperrood, p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

† ALONSOA.

De Alonsoa's worden in Maart-April in den bak gezaaid, onder glas verspeend en in Mei uitgeplant. Zoodra de planten 15 cM. hoog zijn, rijpt men de uiteinden der stengels in om het bloeien te bevorderen. Bloeit Juli-Sept.

1021. **Warscewiczii**, schitterend rood, H. 60 cM., p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10

1023. **linifolia**, scharlakenrood, H. 30 cM. „ „ - 0.10

* ALYSSUM.

Voor randen om bloemperken is dit plantje zeer geschikt. Men zaait het in April in den vollen grond, zorgende, dat het zoodanig wordt uitgedund, dat de plantjes 20 à 25 cM. van elkaar komen te staan. Wanneer men na het bloeien de takjes inkort, herhaalt zich later de bloei. Bloeit Juni-Sept. H. 20 cM.

1027. **Benthami**, wit . . p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

1030. „ **compactum**, wit, welriekend, p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

*ALYSSUM (vervolg).

*Alyssum Benthami compactum lilacinum.*1031. *Benthami compactum lilacinum*, *p. pakje* f 0.30

Deze nieuwe variëteit met rechtopstaande bloemen onderscheidt zich door hare zuiver lilakleurige bloemen van de tot dusver bekende witte soorten. Wanneer in vollen bloei, gelijkt deze plant een miniatuurvorm der lila lberis.

AMARANTHUS.

De Amaranthussoorten worden in April in den bak gezaaid, onder glas verspeend en in Mei buiten uitgeplant. Ze vereischen evenals alle bladplanten een rijk gemesten grond. Bloeit Juli-Sept.

1033. *caudatus*, *Kattestaart*, m. lange donkerroode bloemtrossen, H. 90 cm., *p. lood* f 0.15, *p. pakje* f 0.051035. *Henderi*, met zwartroode bladeren, H. 60 cm.,*p. pakje* f 0.101037. *hybridus* *Princess of Wales*, prachtige bonte bladeren, H. 60 cm., *p. pakje* f 0.151039. *Margaritae*, zeer laag, schoone variëteit, H. 30 cm., *p. pakje* f 0.101041. *salicifolius*, met smalle, franje-achtige bladeren, H. 30 cm., *p. pakje* f 0.101043. *superbus*, langwerpige ronde bladeren, bloedrood met heldergelen rand, H. 60 cm., *p. pakje* f 0.10

*ANAGALLIS.

Men zaait einde April in den vollen grond. Door hare heldere bloempjes, die blauw en rood gekleurd zijn, en hare lage groeiwijze, is de Anagallis zeer geschikt voor randen en perken.

Bloeit Juli-Sept. H. 15 cm.

1047. *grandiflora*, in kleuren gemengd, *p. pakje* f 0.25

† ANCHUSA.

De krachtige hemelsblauwe bloemen hebben een zuiver wit hart. Wanneer men voorjaars in den bak uitzaait, begint ze in Juli te bloeien. Men kan echter ook in Augustus uitzaaien, de planten onder glas doen overwinteren en in 't voorjaar uitplanten. Ze beginnen dan reeds in April te bloeien. H. 75 cm.

1051. *Capensis*, Kaapsche Vergeet-mij-niet, *p. lood* f 0.35, *p. pakje* f 0.10

† ANTIRRHINUM.

De bekende Leeuwenbekjes zaait men in Maart-April en na eenige malen verspeend te hebben, kan men ze in Mei uitplanten. Men kan ze ook in het najaar zaaien, zoodat men dan den volgenden zomer sterkere planten heeft. Ze vereischen veel warmte en een goeden bodem. Bloeit Juli-Oct.

1055. *majus*, hooggroeiende, in gem. kleuren, H. 45 cm., *p. lood* f 0.30, *p. pakje* f 0.101059. *majus nanum* Tom Thumb, dwergachtige Leeuwenbek in schoone kleuren gemengd, H. 15 cm.,*p. lood* f 0.70, *p. pakje* f 0.151060. *majus nanum* Queen of the North, zuiver wit, *p. lood* f 0.65, *p. pakje* f 0.151061. „ „ *Defiance*, helder-scharlakenrood . . „ „ - 0.301062. „ „ *delicaatrosa*, zacht rose „ „ - 0.201063. „ „ *Golden Queen*, grootbl. goudgeel . . „ „ - 0.251064. „ „ *zwarte Prins*, zeer donker „ „ - 0.251065. „ „ *Oranje Prins*, zalm-rose en oranje . . „ „ - 0.251066. „ „ *Albino-mengsei* . . „ „ - 0.20

Een nieuwe variëteit van de bekende Leeuwenbekjes, welke in tegenstelling met de gewone soorten, hoofdzakelijk in lichtere kleuren bloeit. Daarbij zijn de bloemslippen dezer nieuwe soort eigenaardig gevlekt en gestippeld. Sierlijke snijbloem.

† ARCTOTIS.

Deze prachtige, uit Zuid-West-Afrika ingevoerde plant, wordt zeer gemakkelijk gekweekt en groeit ongeveer 70 cm. hoog. Zij bloeit den ganschen zomer tot laat in den herfst met groote bloemen, die een doorsnede hebben van 7-8 cm. De straalbloemen zijn zuiver wit met een smalle, gele ring van onderen, terwijl de helderblauwe met witte meeldraden bezette schijfbloemen daarbij prachtig afsteken. De min of meer vederachtige bladeren zijn witachtig behaard.

*Arctotis grandis.*1067. *grandis* *p. lood* f 0.35, *p. pakje* f 0.15

ARTEMISIA.

1073. *saccorum viridis* *p. pakje* f 0.30

Deze uit China ingevoerde Nieuwigheid heeft geheel het aanzien van een *Zonterden*. Ze groeit zeer snel, zoodat de schoone pyramidaal gevormde planten eene hoogte bereiken van 1-1½ Meter.

Als alleenstaande gazonplant of in groepjes vereenigd, verdient zij alle aanbeveling, terwijl zij ook voor de potcultuur uitstekend geschikt is. Zij verdraagt zoowel aanhoudende droogte en hitte als nattigheid, terwijl eenige graden vorst in den herfst haar niet schaden.

De kleur van het fijn getakte loof is van het donkerste groen en de afgesneden takken blijven zeer lang frisch, zoodat deze tevens een uitstekend materiaal zijn voor de binderij.

ASPERULA.

Lief plantje, dat in Mei kan worden uitgezaaid en dat bijna den geheel zomer met ontelbaar vele hemelsblauwe bloempjes bloeit. H. 30 cM.

1075. *azurea setosa* . . . *p. lood* f 0.15, *p. pakje* f 0.05

† ASTER.

1079. *sinensis*, gemengd. *p. lood* f 0.25, *p. pakje* f 0.10

De hierbij aangeboden enkelbloemige Chinese Asters hebben geheel nieuwe kleuren en zullen dan ook evenals de oorspronkelijke Chinese soort, welke alleen maar lila gekleurd is, zeer in den smaak vallen.

De prachtige paarse, violette, rose en op appelbloesem gelijkende kleuren der groote bloemen steken tegen het zuivere geel der harten sterk af.

Door hunne stevige stelen en langen duur der bloei, zijn ze als snijbloemen uiterst geschikt.



Aster eleganz.

1080. *eleganz*, wit *p. pakje* f 0.25

1081. " donkerblauw " " - 0.25

1082. " helder rose " " - 0.25

1083. " gemengd " " - 0.20

Eene werkelijk schoone enkelbloemige Aster; de bloemen zijn op stevige stengels gezeten en dus voor de binderij bijzonder geschikt, temeer daar zij zich afgesneden zeer lang goed houden.

† Aster sinensis fl. pl.

(DUBBELBLOEMIGE.)

De Asters zijn buitengewoon dankbare bloemen, die in elkengrond kunnen worden gekweekt, mits niet te selraal. Ze worden in Maart onder glas uitgezaaid en zodra ze twee blaadjes hebben, verspeend. Na eenige weken plant men ze in potten, waarin men ze laat staan totdat ze op de perken gezet worden. Men kan ze ook half Mei buiten uitzaaïen en later uitdunnen. De hooggroeiende soorten moeten natuurlijk iets wijder geplant worden dan de lagere.

De Asters kunnen zeer gemakkelijk, zelfs wanneer ze in vollen bloei zijn, verplant worden, waardoor men ze uitnemend kan gebruiken voor het beplanten van perken, waarop vroegbloeiende planten gestaan hebben.

BLOEITIJD JULI—OCTOBER.

No. 1093—1134. Hooge soorten 60 cM. No. 1135—1160 Middelh. 45 cM. No. 1162—1181 Dwerg 30 cM.

† HOOGHE ASTERS.

1093. *Paeonia-perfection*, in kleuren gemengd, *p. lood* f 1.30, *p. pakje* f 0.20

De bloemen dezer verscheidenheid hebben veel overeenkomst met pioenrozen en zijn zeer schoon en regelmatig gevormd.

1095. *Juwel of Bal*, in kleuren gemengd, *p. pakje* f 0.25
Met kolossaal groote, bolronde bloemen.

1097. *Stralen*, in kleuren gemengd - 0.25
De Stralen Asters zijn om haar interessante, naaldvormige bloembladeren zeer bemind.

1099. *Witte Dame* *p. pakje* f 0.25

1101. *Reid's verbeterde Kogel*, gemengd, *p. lood* f 0.80, " " - 0.20

1112. *Struisveder*, *karmozijn* " " - 0.25

1113. " *donkerblauw* " " - 0.25

1114. " *donkerpurper* " " - 0.25

1115. " *lichtgeel* " " - 0.25

1116. " *malmaison rose* " " - 0.25

1117. " *wit met violet, rose spitsen* " " - 0.25

1118. " *zalmkleurig rose vroegbloeiend*, *p. pakje* f 0.25

De bloemen hebben een doorsnede van 10 à 12 cM. en ze bloeit met de allervroegste soorten.

1119. *Struisveder*, *lila rood* *p. pakje* f 0.25

1121. " *hemelsblauw* " " - 0.25

1123. " *helder rose* " " - 0.30

1124. " *terra-cotta-kleurig* " " - 0.25

Daar de terra-cottakleur veel in den smaak valt, is deze soort als snijbloem zeer aan te bevelen.

1125. *Struisveder*, *wit* *p. pakje* f 0.25

1127. " *gemengd*, *p. lood* f 1.40 " " - 0.20

De struisveder-Asters zijn voor alle bloemenliefhebbers een groote aanwinst. De groeiwijze is kandellabrevormig en de bloemen maken met hun lange bloembladen een ongeëvenaard sierlijk effect. Voor bouquets zijn ze onontbeerlijk.

1129. *Amerikaansche Struik*, gemengd, *p. lood* f 0.60, *p. pakje* f 0.15

Is de laatste van alle Aster-soorten in het bloeien.

1134. *hooge*, in soorten gemengd, *p. lood* f 1.—, *p. pakje* f 0.20

† MIDDELHOOGHE ASTERS.

1135. *Hohenzollern* *p. pakje* f 0.25
Prachtige extra grootbloemige, zuiverwitte variëteit.

1136. *Hohenzollern*, *reuzenbl.* gemengd, *p. pakje* f 0.25

1140. *Victoria*, middelhooge, in kleuren gemengd, *p. lood* f 1.30, *p. pakje* f 0.25

Deze klasse heeft groote en sterk gevulde bloemen, die eenigszins plat gevormd zijn.

1144. *Komeet*, in kleuren gemengd, *p. lood* f 1.30, *p. pakje* f 0.25

Deze hebben smalle bloembladeren en maken daardoor een zeer los effect.

1146. *Reuzenkomeet*, *brillant-robijnrood*, *p. pakje* f 0.25

1153. " *verbeterde Sneeuw-witte* " " - 0.25

1154. " *zwavelgeel* " " - 0.25

1155. " *in prachtsoorten gemengd*, *p. lood* f 1.30, *p. pakje* - 0.20

Zeer rijkbloeiende verbetering van de bekende Komeet-Aster met zeer groote, dicht gevulde, prachtig gevormde bloemen.

1156. *Reine des Halles*, in gemengde kleuren, *p. lood* f 0.60, *p. pakje* f 0.15

Is de vroegstbloeiende van alle Asters.

1160. *middelhooge*, in soorten gemengd, *p. lood* f 1.—, " " - 0.20

† DWERG-ASTERS.

*Dwerg Chrysanthemum Aster.*

1162. *Chrysanthemum*-dwerg, in kleuren gemengd,
p. lood f 1.60, p. pakje f 0.25
1164. " wit . . . " " - 0.30
1166. " rose . . . " " - 0.30
1168. " scharlaken . . . " " - 0.30
1170. " donkerblauw . . . " " - 0.30

De *Chrysanthemum*-Asters kunnen onder de schoonste Asters worden gerekend; zij bloeien zeer rijk met groote bloemen en kunnen zoowel voor potkultuur als voor bloemperken worden aanbevolen.

1172. *Dwerg-Bouquet* (*Boltze*), gemengd p. pakje f 0.25

1178. *Victoria*-dwerg, in kleuren gemengd,
p. lood f 1.75, p. pakje f 0.25

Deze bloeien evenals de middelhooge *Victoria*-Asters, doch groeien niet hooger dan 30 cm.

*Triumph-Dwerg Aster.*

1183. *Triumph*-Dwerg, gemengd . . . p, pakje f 0.30
1184. " scharlakenrood . . . " " - 0.40
1186. " wit . . . " " - 0.40

De *Triumph*-Asters zijn de laagstgroeiende van alle; de bloemen zijn kolossaal groot en maken met hare smalle bladeren een schoon effect.

1188. *dwerg*, in kleuren gemengd,
p. lood f 1.50, p. pakje f 0.25

BALSAMINEN, zie *Impatiens*.

BARTONIA.

Dit schoone plantje groeit het best op een droge zonnige standplaats, tegen den wind beschut. Daar het zich niet gemakkelijk laat verplanten, moet men het in Mei buiten uitzaaïen. Bloeitijd Juli-Oct.

1210. *aurea*, helder geel. H. 90 cm.

p. lood f 0.40, p. pakje f 0.15

† BIDENS.

Met fluweelachtige zwartroode bloemen. Men zaait ze in Maart in den warmen bak of in Mei op den kouden grond. In 't laatste geval verschijnen de bloemen natuurlijk veel later. Bloeitijd Juli-Oct. H. 60 cm.

1214. *atro-sanguinea* (*Dahlia Zimapani*),

p. lood f 0.75, p. pakje f 0.20

BRACHYCOME.

De *Brachycome*'s zijn zeer schoone planten met levendig gekleurde bloemen. Men kan ze op den kouden grond zaaien in April-Mei. Wil men ze laat in bloei hebben, zoo kan men nog half Juni zaaien. Bloeitijd Juni-Sept. H. 15 cm.

1218. *ibridifolia*, blauw . p. lood f 0.75, p. pakje f 0.15

1220. " alba, wit. " " - 0.75, " " - 0.15

1222. " rosea, rose " " - 0.75, " " - 0.15

BROWALLIA.

Wanneer men deze schoone zomerbloem in Mei zaait, bloeit zij vanaf Juli, totdat het begint te vriezen. H. 15 cm.

1226. *Czerwlakowski*, blauw, p. lood f 0.50, p. pakje f 0.15

† CACALIA.

Men zaait deze omstreeks half April buiten. De bloemen zijn zeer geschikt voor bouquets. Bloeit Juni-Sept. H. 45 cm.

1232. *songhifolia*, bloedrood, p. lood f 0.50, p. pakje f 0.15

CALANDRINIA.

De *Calandrinia*'s moeten in April-Mei op de perken worden uitgezaaid, want de plantjes laten zich niet verspeuen. Bloeit Juli-Oct. H. 30 cm.

1234. *discolor* p. pakje f 0.15

De bloemen zijn violet-rose met gele meeldraden.

1236. *umbellata*, laaggroeiend p. pakje f 0.15

De bloemen dezer soort zijn donker purper-violet. Als dit plantje in vollen bloei is, ziet men slechts één schitterende kleur.

† CALENDULA.

De Goudsbloemen zijn zoo algemeen bekend, dat hieraan welnig is toe te voegen; ze worden in April gezaaid. Bloeit Juni-Sept. H. 30 cm.

1240. *officinalis fl. pl. Meteor*, p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

Oranje-geel gestreepte variëteit.

1242. *officinalis grandifl. fl. pl.*, " " - 0.15, " " - 0.05

Gewone algemeen bekende Goudsbloem met donker oranje-kleurige bloemen.

1244. *officinalis Prins van Oranje*,

p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

Donker oranje, geel gestreept.

1246. *officinalis sulph. fl. pl.*, p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

Deze heeft groote, zuiver gele, dicht gevulde bloemen.

† CALLIOPSIS.

De *Calliopsis* zaait men in April. Wil men ze vroeg in bloei hebben, zoo moet men in Maart onder glas zaaien. Het zijn zeer dankbaar bloeiende planten. Bloeitijd Juni-September.

1250. *bicolor*, geel met bruin, H. 90 cm.,

p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

1252. *bicolor hybrida fl. pl.*, in kleuren gemengd.

H. 45 cm., p. lood f 0.20, p. pakje f 0.05

Met dubbele prachtige bloemen.

† **CALLIOPSIS** (vervolg).

1254. **bicolor nana**, H. 30 cm.,
p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10
1255. **Drummondi**, met lange bloemstelen, H. 45 cm.,
p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
1256. **radiata „Goudstraal"** - 0.15

Zeer rijk en langbloeiende zomerbloem, waarvan de bloembladen in vorm gelijken op die der algemeen gezochte Cactus-dahlia's, terwijl zij goudgeel gekleurd zijn met donker purperbruinen voet. Uit het donkere hart der bloem staan de goudgele stralen in alle richtingen. De planten worden ongeveer 15—20 cm. hoog.

Zeer schoone en gemakkelijk te kweken zomerbloem.



Calliopsis radiata „Tijgerbloempje."

1258. **radiata „Tijgerbloempje"** p. pakje f 0.20

Een rijk en langbloeiende zomerbloem, waarvan de bloembladen een eigenaardig gedraaiden vorm bezitten, die eenigszins aan enkele Cactus-Dahlia's doet denken. De kleur is roodbruin, overgaande in schitterend goudgeel naar de punten, welke tevens fraai gevlekt zijn. Zij groeit circa 20 cm. hoog, terwijl de gevulde planten den geheelen Zomer door met bloemen bedekt zijn. De kultuur is zeer eenvoudig en mede door haren vroegen en rijken bloei verdient zij alle aanbeveling.

† **CAMPANULA.**

Deze lieve klokjes worden in April-Mei gezaaid en vereischen welnig bijzondere zorg. Bloeitijd Juni-Juli.

1264. **Loreyi fl. albo**, wit, H. 20 cm. . . p. pakje f 0.20
1268. „ „ **coeruleo**, blauw, H. 20 cm.,
p. pakje f 0.20

1270. **macrostyla**, met groote bekervormige bloemen,
H. 60 cm., p. pakje f 0.20

De kleur der bloemen is violet gestreept op witten grond.

1272. **speculum**, in kleuren gemengd,
H. 30 cm., p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

† **CANNABIS.**

Deze schoone bladplant groeit ongeveer 2.50 M. hoog en is zeer geschikt voor ruime groote perken. Ze wordt in den vollen grond uitgezaaid, ongeveer in het einde van April.

1278. **gigantea**, *Chineesche Reuzenhennep*,
p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

† **CARDUUS.**

De stekelige bladeren hebben een fraai wit gemarmerde oppervlakte. Wordt in April in den vollen grond uitgezaaid.

1281. **Kernerii** p. pakje f 0.20

Sierlijke 2-jarige distelvariëteit, afkomstig uit Bulgarije, van ongeveer 1½ Meter hoogte. De bladeren van zachtgroene kleur met heldere nerven zijn pl m. 40 cm. lang. De groote bloemknoppen, welke aan het einde der lange stengels verschijnen, zijn purperrood, terwijl de geopende bloemen donkerrose getint zijn.

Decoratieve plant, bijzonder aan te bevelen voor gazons of in groepen.

1282. **Marianus**, *Mariadistel*, p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

† **CENTAUREA**

Deze schoone algemeen bekende Korenbloemen kunnen in Mei op den kouden grond worden uitgezaaid en later worden uitgedund. Men kan ze ook eerder (de laatste helft van Maart) in den bak uitzaaien en ze in potjes verspenen en later uitplanten op een afstand van 25 à 30 cm. Bloeitijd Juli-October.

1288. **Cyanus**, *Korenbloem*, in gem. kleuren, H. 45 cm.,
p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10

1290. **Cyanus fl. pl.**, met dubbele bloemen in gem. kleuren,
H. 45 cm., p. lood f 0.35, p. pakje f 0.10

1292. „ **Kaiser Wilhelm**, donkerblauw, H. 45 cm.,
p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10

1294. „ **nana compacta**, laaggroeiende in vele
kleuren gem. H. 15 cm. . . p. pakje f 0.15

1296. **imperialis**, gem. kleuren - 0.25

Met langstelige schoon gevormde groote bloemen, welke kleur varieert tussehen wit, lila, rose en purperrood. H. 1 M.



Centaurea moschata rosea.

1297. **moschata rosea** p. pakje f 0.25

De bloemen dezer betrekkelijk nieuwe variëteit zijn eerst roodachtig wit met helderose meeldraden; na enkele dagen gaat de kleur in een prachtig zachtrose over. De hoogte der planten en grootte der bloemen is gelijk aan die der bekende wit- en blauwbloeiende variëteiten. De eigenschap dat de bloemen lang frisch blijven in vereeniging met de mooie zachte kleur, maakt deze soort bijzonder geschikt voor bouquets.

1300. **odorata Chamaeleon**, H. 45 cm., p. pakje f 0.35

Nieuwe grootbloemige variëteit; de kleur is zwavelgeel, iets rose getint.

1302. **odorata Margaritae**, grootbloemige, zuiver witte
verscheidenheid, H. 45 cm., p. pakje f 0.30

1304. **suaveolens**, gele welriekende korenbloem, H. 60 cm.,
p. lood f 0.75, p. pakje f 0.20

1306. ***nana compacta Victoria**, H. 15 cm.,
p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

Deze laaggroeiende blauwe variëteit is zeer schoon en bijzonder geschikt voor randen.

CENTRANTHUS.

Dit schoone 20 à 25 cm. hoog groeiende plantje vormt door de vele vertakkingen een dichte bloemenmassa. De bloempjes zijn wit of rood en zeer schoon. Men kan ze Maart-Mei buiten uitzaaïen. Bloeitijd Juli-Aug.

1310. *macrosiphon nanus*, gemengd,
p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10

† CHEIRANTHUS ANNUUS FL. PL.**VIOLIEREN.**

Voor zomerviolieren moet den grond liefst vóór den winter worden bewerkt. Men meste vooral niet met versehe mest, maar niet geheel verteerde stalmest of afval. De zomerviolieren worden in Maart in den warmen bak gezaaid, eenige malen verspeend en langzamerhand afgehard. In Mei op de perken geplant, beginnen ze reeds half Juni te bloeien.

In April zaaie men de herfst-violieren, die op dezelfde wijze worden behandeld en einde Augustus beginnen te bloeien. De winter-violieren worden half Juni gezaaid en vóór November in den kouden bak gebracht. Ze beginnen dan in November te bloeien en men heeft slechts te zorgen ze vorstvrij te houden. Gewoonlijk bevinden zich 20 à 25% enkele bloemen tussehen de Violieren. H. 30 à 45 cm.

Zomer-Violieren.

1320. **grootbl. Engische** gem., p. lood f 2.—, p. pakje f 0.25

1322. " " in afzonderlijke kleuren:

<i>Kanariegeel</i>	p. pakje f 0.30
<i>Karmijn</i>	" - 0.30
<i>Helderrood</i>	" - 0.30
<i>Donkerblauw</i>	" - 0.30
<i>Vleeschkleurig</i>	" - 0.30
<i>Wit</i>	" - 0.30

1330. **doorbl. Dresdener**, gemengd - 0.40

1331. " " *wit* - 0.45

1334. **grootbl. Pyramide**, gemengd - 0.45

1335. " " *wit* - 0.45

1338. " " **Princes May**,
lichtgeel - 0.50

1340. **dwerg-Pyramide**, gemengd - 0.50

1342. " " *donkerbloedrood* - 0.50

1346. **Victoria-Bouquet**, gemengd - 0.30

1347. " " *wit* - 0.35

Prachtige klasse, die regelmatig gevormde bloemenpyramiden voortbrengt. Zeer geschikt voor potcultuur

Herfst-Violieren.

1350. **grootbl.**, gemengde kleuren p. pakje f 0.50

1354. **Schotsche**, gemengd " " - 0.50

Winter-Violieren.

1358. **grootbl.**, gemengde kleuren p. pakje f 0.60

1362. " **Keizerin Elisabeth** - 0.45

Helder karmijnrood; is zonder twiifel een der mooiste Winter-violieren.

1363. **„Schoone van Nizza”** p. pakje f 0.45

Een in de laatste jaren ingevoerde Winter-violier, afkomstig uit het zuiden van Frankrijk. Zij bereikt in gunstige omstandigheden een hoogte van 80 cm. en bloeit zeer spoedig met een menigte welriekende, zacht rose dubbele bloemen.

1364. **Witte van Nizza**, vroegbloeiend . p. pakje - 0.40

1365. **Witte Dame** p. pakje f 0.60

Eene zeer schoone winterviolier, welke in groei veel overeenkomt met de bekende „Kaiserin Elisabeth.” De bloemen zijn echter grooter en gevelder, terwijl de kleur van het zuiverste wit is. De planten groeien circa 50 cm. hoog en zijn sierlijk vertakt, zoodat elke plant een groot pyramidaal bouquet gelijkt. Ze brengt pl.m. 60—65% gevulde bloemen voort en kan in alle opzichten de schoonste witte winterviolier worden genoemd.



Winterviolier „Witte Dame.”

1366. **dwerg-Bouquet**, gemengd p. pakje - 0.50

† CHEIRANTHUS CHEIRI,**MUURBLOEMEN.**

De muurbloemen worden gewoonlijk in Mei of Juni op den kouden grond uitgezaaid, in Juni op een nieuw bed verspeend, waar men ze laat staan tot in den herfst. Men kan ze dan in potten zetten om ze zeer vroeg in bloei te hebben, of ook buiten op de perken uitplanten 40 à 50 cm. van elkaar. Deze welriekende bloemen groeien in elken grond, mits niet al te vochtig en 't liefst aan den voet van een muur, aan welke omstandigheid zij haar naam te danken hebben. De afgesneden bloemen blijven lang goed en de knoppen ontluiken zelfs geheel, indien men slechts het water nu en dan ververscht. Bloeitijd April—Juni.

1372. **enkele vroegbloeiende Parijsche**, gem.,
H. 45 cm., p. lood f 0.35, p. pakje f 0.15

Deze bloeien reeds het eerste jaar, wanneer men ze in April buiten uitzaaït.

1374. **hooge dubbele**, gemengde kleuren,
H. 60 cm., p. pakje f 0.35

1378. **lage dubbele dwerg**, gem. kleuren,
H. 30 cm., „ „ - 0.40

CHEIRANTHUS MARITIMUS,**ZEEVIOLIEREN.**

Dit plantje groeit in bijna elken grond en onderscheidt zich door snellen groei en groote rijkbloeiendheid, zelfs in dicht aan zee gelegen tuinen, waar anders niet vele bloemen gelukken. Men zaait ze vrij dicht in April-Mei en dunt ze, zoodat de planten pl.m. 10 cm. tussehenruimte hebben. Bloeitijd Juli-Aug. H. 15 cm.

1384. **rood** p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

1386. **Crimson King**, karmozijn,
p. lood f 0.20, p. pakje f 0.05

† CHRYSANTHEMUM.

Ofschoon de eenjarige *Chrysanthemums* niet zoo algemeen gewaardeerd worden als de bekende tot dit geslacht behoorende overblijvende kamerplanten, verdienen ze toch een plaatsje in onzen bloementuin, daar ze zeer dankbaar bloeien en gemakkelijk te kweeken zijn. Men zaait ze April-Mei; de planten zijn dan einde Mei of begin Juni gereed om met een knijpe op de perken te worden gezet. Men kan ze ook in potten kweeken en om ze vroeg in bloei te hebben, kan men in September zaaien, waarna men ze op tijd verspeent en in het voorjaar uitplant. De carinatumvariëteiten moeten dan onder glas worden overwinterd. Bloeitijd Juni—October.

† **CHRYSANTHEMUM** (vervolg).

1390. **carinatum Chamæleon**, H. 60 cM.,
p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10
Bekende sehoone verseidenheid. Zeer aan te bevelen,
1392. **carinatum Dunnetti album plenum**,
H. 60 cM., p. lood f 0.40, p. pakje f 0.10
Prachtige dubbelwitte snijbloom.
1396. **carinatum aureum fl. pl.**, geel,
H. 60 cM., p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10
1398. „ **Golden Feather**, met goudgele bladeren,
H. 60 cM., p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10
1400. „ **„Stern von Thüringen,”**
p. lood f 0.40, p. pakje f 0.10
- Deze prachtige nieuwigheid bloeit den geheelen zomer tot de vorst komt, met stervormige bloemen, die zuiver wit, geel, purper of karmijnrood gekleurd zijn. H. 60 cM.
1402. **carinatum fimbriatum fl. pl.**,
H. 30 cM., p. pakje f 0.15
1403. „ **gemengd**, p. lood f 0.25, „ „ - 0.10
1404. „ **hybridum fl. pl.**, dubbele soorten in
prachtmengel. . . p. lood f 0.35, p. pakje f 0.10

*Chrysanthemum carinatum „Noordsler.”*

1405. **carinatum „Noordster”** p. pakje f 0.20

Eene reuzenbloemige eenjarige Chrysanthemum van bijzondere aanbeveling. De bloemen hebben een doorsnede van circa 9 cM., en zijn dus minstens $\frac{1}{2}$ grooter dan die der bekende carinatum-soorten. De kleur is zuiver wit, naar het midden in lichtgeel overgaand, en schoon afstekend tegen het zwarte bloemhart. De plant groeit ongeveer 50 cM. hoog; onschatbaar voor groote bouquetten.

1406. **coronarum fl. pl.**, dubbel gemengd,
H. 30 cM., p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10
1408. „ **fl. albo pl.**, dubbele witte,
p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10

1410. **coronarum luteo pl.**, dubbele gele,
p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10
1412. **inodorum plenissimum**, dubbel wit,
H. 30 cM., p. lood f 0.50, p. pakje f 0.10

CLARKIA.

De Clarkia's kunnen in April direct op de perken worden gezaaid, of eerst op een bed en in Mei uitgeplant worden. De planten moeten een tusschenruimte hebben van pl.m. 20 centimeter. Vooral de dubbele verseidenheden zijn zeer sehoon en aan te bevelen. Ook uitnemend geschikt voor kuipen of potten; bloeitijd Juni-Sept.

1416. **elegans fl. pl.**, in gemengde kleuren,
H. 45 cM., p. lood f 0.35, p. pakje f 0.10

*Clarkia elegans fl. pl. Chamois.*

1417. **elegans fl. pl. Chamois**, p. pakje f 0.20

De bloemen dezer nieuwe dubbele Clarkia zijn eerst gemiskleurig met wit, dat later in prachtvol Chamois rosa overgaat, eene nog zeldzame kleur onder de eenjarige Clarkia's.

1418. **elegans fl. pl. Purple King**, purperkleurig, H. 45 cM.,
p. lood f 0.60, p. pakje f 0.15
1420. „ **fl. pl. Salmon Queen**, zalmkleurig, H. 45 cM.,
p. lood f 0.60, p. pakje f 0.15
1422. „ **fl. pl. alba**, dubbele witte,
H. 45 cM.,
p. lood f 0.60, p. pakje f 0.15
1424. **puicheila**, enkele, in gemengde kleuren,
H. 45 cM. p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

COLLINSIA.

De Collinsia bicolor en multicolor kan men in April op de perken zaaien, ze bloeien dan Juli-Aug. Door hare vroolijke kleuren maken ze een aardig effect. Ook kunnen ze nitnuntend worden gebruikt voor potcultuur om ze voor 't venster of op een balkon te plaatsen.

- | | p.lood | p.pakje |
|---|--------|---------|
| 1430. bicolor candidissima , wit | f 0.15 | f 0.05 |
| 1434. „ tweekleurig , lila en wit . . . | - 0.15 | - 0.05 |
| 1436. multicolor | - 0.15 | - 0.05 |

† DIANTHUS.

De eenjarige *Anjelier*en zijn zeer dankbare rijkbloeiende planten. Om ze echter gedurende een groot gedeelte van den zomer in bloei te hebben, moet men ze op verschillende tijdstippen zaaien. Ze laten zich zeer gemakkelijk met een knitje verplanten, ook al zijn ze reeds op het punt om te bloeien. Door in April in den bak en in Mei buiten te zaaien en een gedeelte te verplanten en het andere niet, kan men ze lang achterein in bloei hebben.

1508. *Chinensis* fl. pl., *Dubbele Anjelier*en of *Chineesche Anjers*, in prachtsoorten gemengd,
p. lood f 0.35, p. pakje f 0.10
1510. *imperialis* fl. pl., *Keizeranjers*,
p. lood f 0.55, p. pakje f 0.15
1511. *Heddewigi giganteus*, grootbloemig, in prachtige kleuren gemengd, p. lood f 0.45, p. pakje f 0.15
1512. *Heddewigi* fl. pl., *Diadeem Anjers*, in prachtsoorten gemengd, p. lood f 0.85, p. pakje f 0.20
1514. „ *aibus*, *Koningin van Holland*, zuiver wit . . . p. lood f 0.55, p. pakje f 0.15
1515. „ *Nobilis*, „*Koningsanjelier*“
p. lood f 0.90, p. pakje f 0.20

De bloemen dezer soort zijn enkel, van schitterende kleuren in purperroode en heldere schakeeringen, eigenaardig gedraaid en gefranjeerd en dikwijls tot 10 cM. in doorsnee. De planten groeien hoog en leveren een bij uitstek geschikt bindmateriaal. De bloemen blijven afgesneden onberispelijk schoon gedurende acht dagen. Met recht de schoonste van alle enkele *Anjelier*en.

1516. *Heddewigi* fl. pl., „*Vuurbal*“ . . . p. pakje f 0.20

De groote dichtgevulde dubbele bloemen van deze nieuwe *Anjelier* hebben een schitterende scharlakenroode kleur; ze zijn zoowel geschikt voor het beplanten van bedden als voor snijbloemen.

1517. *Heddewigi*, „*De Bruid*“ p. lood f 0.55, p. pakje f 0.15

De witte bloemen hebben een purperrood midden; laag, zeer schoon.



Dianthus laciniatus punctatus (licht).

1518. *laciniatus punctatus* „*Prinzess-Nelken*,“ in lichte kleuren . . . p. pakje f 0.20

Eene enkelbloemige variëteit der *Dianthus laciniatus*-klasse, met lichte bloemen, welke den bloemenliefhebber eene rijke afwisseling leveren, daar ze als met puntjes en streepjes overdekt zijn.

1519. *laciniatus punctatus* „*Prinzess-Nelken*,“ (donker) p. pakje f 0.20

In tegenstelling met de voorgaande, zijn de bloemen dezer variëteit bijna alle donker van kleur, n.l. purperviolet, bloedrood, etc. daarbij sterk gevlekt en gestippeld en licht tot zelfs wit gerand; zeer aanbevelenswaardig.

1520. *laciniatus* fl. pl., in de prachtigste kleuren gemengd . . . p. lood f 0.85, p. pakje f 0.20

† DIMORPHOTHECA.

De *Dimorphotheca*'s zijn zeer rijk- en langbloeiende zomerbloemen. In den kouden bak gezaaid en daarna op een zonnige plaats uitgeplant, ontwikkelen de planten zich zeer snel en zullen na weinige weken volop bloeien.

Voor groepen, zoowel als alleenstaande plant verdienen zij alle aanbeveling.



Dimorphotheca aurantiaca.

1522. *aurantiaca* . . . p. pakje f 0.25

Zeldzaam schoone Nieuwigheid, afkomstig uit Zuid-Afrika, welke sterk vertakte bossige planten vormt, die ongeveer 30 cM. hoog en 40 à 50 cM. breed zijn. De op *Chrysanthemums* gelijkende bloemen, die geheel geopend eene doorsnede hebben van 7 à 8 cM., komen flink nit boven het heldergroene loof. De kleur der bloemen is donker-oranje met atlasglans, fraai afstekende bij het donkerbruine, zwartgezoomde hart.

1523. *aurantiaca hybrida* . . . p. pakje f 0.20

Nieuwste hybriden in verschillende prachtige kleuren.

1524. *aurantiaca hybrida* fl. pl. . . . p. pakje - 0.50

Halfdubbele- en dubbelbloeiende variëteiten der voor enkele jaren ingevoerde, zeer gunstig hekende hybriden der *Dimorphotheca aurantiaca*. Ongeveer 50—60% der zaailingen bloeien dubbel en halfdubbel, terwijl de kleuren varieren van wit tot helder- en donkergeel, van zalmkleurig tot oranje.

1525. *sinuata* . . . p. pakje f 0.40

Een even dankbaar bloeiende en gemakkelijk te kweeken variëteit als de bekende *Dimorphotheca aurantiaca*. De bloemen, die een middellijn van 6½—8 cM. hebben, zijn van een zeldzame licht of geelachtige gamskleur met atlasglans en hebben een blauwachtig hart; de achterzijde der bloembladeren is roodachtig purper gestreept. Hoogte der planten 30—35 cM.

ERODIUM.

Aardig plantje, dat meestal dient voor versiering van rotsen en het best op steenachtige plaatsen groeit. Men zaait in April of Mei en verspeet de plantjes op 40 à 50 cM. afstand. Bloeit in Juni-Juli met schoone violetkleurige bloemen. H. 15 cM.

1526. *gruinum* . . . p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

† ESCHSCHOLTZIA.

*Eschscholtzia.*

Zeer gemakkelijk te kweken en weinig eischende Zomerbloem, die liever niet moet worden verplant, maar direct op de perken uitgezaaid in April. Ze moeten voldoende worden uitgedund en komen een volgend jaargemakkelijk weer op.

1527. *aurantiaca*, donker oranje geel,
p. lood f 0.20, p. pakje f 0.05
1528. *californica*, helderheel, „ „ - 0.20, „ „ - 0.05
1529. „ *alba*, wit, „ „ - 0.20, „ „ - 0.05
1530. „ *Karmijnkoning*, nieuw,
p. lood f 0.50, „ „ - 0.15
1532. *Douglasii* „ „ - 0.30, „ „ - 0.10
- Uit Californië ingevoerde vroegbloeiende variëteit. De bloemen hebben eene zuivere goudgele kleur met een weinig donkerder hart; het loof is grijsgroen en zeer fijn.
1534. *hybrida Mandarin*, van binnen oranje, van buiten rood p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10
1536. *maritima*, heldergeel met donker-oranje vlekken
p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10
1538. *gemengd* „ „ - 0.30, „ „ - 0.10

† GAILLARDIA.

De bloemen dezer plant komen voor in alle levendige nuances van geel en bruin. Zij zijn uitnemend geschikt voor bouquets. Ze kunnen einde April buiten worden uitgezaaid, doch in den bak gezaaid, beginnen ze reeds in Juni te bloeien.

1550. *Amblyodon*, met schoone donkerroode bloemen,
H. 60 cM., p. lood f 0.35, p. pakje f 0.10
1556. *picta Lorenziana fl. pl.*, in gem. kleuren, H. 45 cM.,
p. lood f 0.35, p. pakje f 0.10
1558. „ *gemengd* „ „ - 0.30, „ „ - 0.10

† GAURA.

De lange bloemtrossen zijn met zuiver witte bloemen bezet; zeer geschikt voor groote perken en als snijbloem.

1560. *Lindheimeri* . . . p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10

GILIA.

De bloemen van dit mildbloeiende plantje zijn geel, purperachtig en violet gekleurd. Men zaait in April en dunt de plantjes uit, zoodat ze 10 à 12 cM. tusschenruimte hebben. Bloeitijd Juli-Aug. H. 30 cM.

1562. *tricolor nana compacta*, p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

GLAUCIUM.

In Augustus uitgezaaid, bloeit ze reeds in Juni; men kan ze ook in April-Mei zaaien, doch dan bloeien ze later. H. 65 cM.

1563. *flavum tricolor* p. pakje f 0.15

Eene uit Klein-Azië ingevoerde variëteit met grijsgroen loof en schitterend oranjerode bloemen, die eene doorsnede hebben van 8—10 cM.

† GODETIA.

De Godetia's laten zich zeer gemakkelijk kweken. Men zaait ze begin April op een bed en zoodra de plantjes sterk genoeg zijn, worden ze uitgeplant op de perken met een tusschenruimte van 40 cM. Nog beter is het om ze in 't laatst van September te zaaien; men verplant ze zoodra mogelijk op een warm plekje in den tuin waar ze overwinterd worden. In 't voorjaar worden ze dan met kluitjes op de perken gezet. Bloeitijd Juni-Sept.

1564. *Bijou*, H. 15 cM. . . p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

Een der laagst groeiende Godetia's. Deze is zeer rijkbloeiend en de bloemen zijn wit met scharlakenroode vlekken.

*Godetia Duchess of Albany.*

1566. *Duchess of Albany*, H. 30 cM.,
p. lood f 0.35, p. pakje f 0.10
- Algemeen bekende grootbloemige witte verscheidenheid.
1568. *Perle Blanche*, H. 20 cM.,
p. lood f 0.40, p. pakje f 0.15
- Laaggroeiende vorm van de voorgaande, eveneens met witte bloemen
1570. *Lady Albemarle*, H. 30 cM.,
p. lood f 0.35, p. pakje f 0.10
- Deze is zeer rijkbloeiend. Als de plant in vollen bloei is, ziet men niets dan groote helderroode bloemen.
1572. *Prins Hendrik*, zacht rosa met groote helderroode vlekken, p. lood f 0.35, p. pakje f 0.10
1574. *Mandarin*, zacht geel, H. 30 cM.,
p. lood f 0.35, „ „ - 0.10
1575. *rosea grandiflora fl. pl.*, dubbel grootbl. rose,
H. 30 cM., p. lood f 0.55, p. pakje f 0.15
1576. *The Bride*, zuiver wit, met hoog rood afgezet,
H. 45 cM., p. lood f 0.35, p. pakje f 0.10
1578. *gemengd* in schoone lage soorten,
p. lood f 0.35, „ „ - 0.10
1579. *gemengd* in schoone hoge soorten, .
p. lood f 0.30, „ „ - 0.10

† GYPSOPHILA.

Dit is een der schoonste, fijnste bloemen voor bouquets. De fijne lichtroze bloempjes zijn op draadvormige stengels gezeten. Ze kunnen ook evenals lumortellen worden gedroogd. Men kan ze in April op den kouden grond uitzaaien. Bloeitijd Juni-Aug. H. 45 cM.

1580. *elegans*, Gipskruid, p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

† **HELIANTHUS.**

De Zonnebloemen vereischen uiterst weinig zorg. Men zaait in April-Mei en men kan ze al dan niet verplanten. Ze moeten echter flink ruimte hebben en voor den wind van een stok worden voorzien. In Hongarije worden de Zonnebloemen op groote schaal gekweekt voor oliebereiding en voor kippenvoer. Bloeitijd Juni-Oct.

1584. **annuus fl. pl.**, gewone dubbele Zonnebloem,
H. 120 cM., *p. lood* f 0.20, *p. pakje* f 0.10
1586. „ **Primrose Coloured**, heldergeel,
H. 120 cM., *p. lood* f 0.20, *p. pakje* f 0.10
1588. **cucumerifolius**, H. 120 cM.,
p. lood f 0.25, *p. pakje* f 0.10

Een der schoonste van alle zonnebloemen voor bouquetten; zij bloeit met talloze goudgele bloemen tot laat in den herfst.

1589. **cucumerifolius Diadeem**,
p. lood f 0.30, *p. pakje* f 0.10
Licht citroengeel met zwart midden; grootbloemig.



Helianthus cucumerifolius „Orion."

1590. **cucumerifolius „Orion"**, *p. lood* f 0.30, *p. pakje* f 0.10

Deze éénjarige Zonnebloem is gewonnen uit de bekende variëteit „Stella" en heeft bloemen, die door hare gedraaide bloembladeren eenigszins aan Cactus-Dahlia's doen denken. Voor bouquetwerk is deze soort uitnemend geschikt. H. 120 cM.

1592. **cucumerifolius Stella**, H. 90 cM.
p. lood f 0.30, *p. pakje* f 0.10
Bekende grootbloemige verscheidenheid.

1594. **macrophyllus giganteus, Reuzen-Zonnebloem**.
H. 240 cM., *p. lood* f 0.20, *p. pakje* f 0.10

1596. **nanus fol. var.**, H. 90 cM., *p. lood* f 0.25, *p. pakje* - 0.10
Lage, bontbladerige variëteit.

IBERIS.

Deze planten kunnen in April op een bed worden gezaaid om later op de perken te worden uitgeplant met 30 cM. tusschenruimte. Men krijgt echter mooier en rijkbloeiende planten, wanneer men half September zaait en in den kouden bak overwintert, om ze in April op de perken uit te planten. Bloeitijd Juli-Sept. H. 30 cM.

1600. **amara**, wit . . . *p. lood* f 0.15, *p. pakje* f 0.05
1602. **coronaria Empress**, zuiver wit,
p. lood f 0.30, „ „ - 0.10

1604. „ **Tom Thumb**, „ „ - 0.25, „ „ - 0.10
Eene zeer lage, grootbloemige variëteit met zuiverwitte bloemen.

1606. **umbellata**, in gemengde kleuren,
p. lood f 0.25, *p. pakje* f 0.10

1608. „ **carminea**, karmijnrood,
p. lood f 0.40, „ „ „ 0.15

1610. „ **Rose Cardinal** . . . „ „ „ 0.30
Zeer schoon, helder rose karmijn.

IMPATIENS BALSAMINA, (Balsaminen).

De Balsaminen, die genoeg in onze tuinen bekend zijn, worden gewoonlijk in Mei op de perken gezaaid en zoodanig uitgedund, dat ze pl. m. 30 cM. tusschenruimte hebben. Ze laten zich ook gemakkelijk verplanten. Bloeitijd Juli-Sept.

1614. **Dwerg**, dubbele, in vele kleuren gemengd,
H. 20 cM., *p. lood* f 0.40, *p. pakje* f 0.10
1616. **Rozen**, dubbele, in vele kleuren gemengd,
H. 45 cM., *p. lood* f 0.50, *p. pakje* f 0.15
1618. **camellia**, dubbele, in vele kleuren gemengd,
H. 45 cM., *p. lood* f 0.50, *p. pakje* f 0.15
1620. **enkele en halfdubbele**, in vele kleuren gemengd,
H. 45 cM., *p. lood* f 0.30, *p. pakje* f 0.10

KOCHIA.

Zeer snelgroeijende bladplant, welke in volkomen wasdom veel op een Cypres gelijkt, waarom men deze plant ook wel zomercypres noemt. Zij heeft fijn loof van eene frisch-groene kleur en is bovendien in den nazomer overdekt met talloze bloedroode bloempjes, terwijl dan de geheele plant een bloedroode tint aanneemt. Ook is zij zeer geschikt voor potcultuur en leent zich daardoor uitstekend voor versieren van vestibules, balcon, of waranda's. Zij wordt in Maart onder glas gezaaid en verlangt veel zon en een ruime standplaats.



Kochia trichophylla.

1622. **trichophylla** *p. pakje* f 0.10

LATHYRUS ODORATUS CUPIDO.

Deze laaggroeijende soort Lathyrus is voor eenige jaren uit Amerika ingevoerd en heeft overal veel opgang gemaakt. Ze is buitengewoon rijkbloeiend en kan in April buiten worden uitgezaaid. Bloeitijd Juni-Aug. Hoogte 20 cM.

1626. **wit** *p. lood* f 0.30, *p. pakje* f 0.15
1628. **Apple Blossom** . „ „ - 0.30, „ „ - 0.15
1630. **gemengd** „ „ - 0.25, „ „ - 0.10
Voor andere Lathyrussoorten, zie onder „Klimplanten."

LEPTOSIPHON.

Dit schoone laaggroeiende plantje is zeer rijkbloeiend. Een perk er van ziet er in den bloeitijd uit als een bloemtapijt. De bloemen komen voor in verschillende nuances van geel, rood, karmijnrood, enz. Men zaait op de perken in April en zorgt er voor op tijd uit te dunnen, daar de planten pl. m. 15 cM. tusschenruimte moeten hebben. Bloeitijd Juli-Sept. Hoogte 15 cM.

1632. **hybridus**, in gemengde kleuren,
p. lood f 0.35, *p. pakje* f 0.10

LEPTOSYNE.

Deze is een der snelst groeiende zomerbloemen. Onder glas bloeit zij reeds binnen 2 maanden nadat zij gezaaid is. De eenvoudigste kweekwijze is echter om ze buiten uit te zaaien begin Mei. De bloemen zijn helder goudgeel. Bloeitijd Aug.-Sept.

1634. *maritima*, H. 30 cm. p. pakje f 0.15

1636. *Stillmanni*, „ 60 „ „ „ - 0.25

Met fijn ingesneden bladren en zeer schoone, op lange stelen gezeten goudgele bloemen.

† LINARIA.

Schoon voor bouquets. De bloemen zijn geel en bronsachtig violet gekleurd. Men zaait half April en plant de plantjes in boschjes bij elkaar op de perken met een tussche ruimte van pl. m. 25 cm. Nog beter is het om in September te zaaien en onder glas te overwinteren.

Bloeitijd Juli-Sept. Hoogte 30 cm.

1642. *maroccana hybrida*, gemengd,
p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10

1643. „ *alba* „ „ - 0.10

Witte variëteit der voorgaande.

1644. *maroccana „Excelsior”* „ „ - 0.10

Onder deze zeer gezochte, dankbaar bloeiende zomerbloem vindt men alle mogelijke nuances van donkerviolet tot lichtblauw, van donker-karmijn tot zachtrose; terwijl ook zachtgeel wordt aangetroffen. Daar de maroccanasoorten zich zeer gemakkelijk laten kweken, is 't een plant die een ieder voldoen zal en ook op elken grond met succes kan worden uitgezaaid.

Ze laten zich ook tijdens den bloei zeer goed in potten overplaatsen.

LINUM.

De schitterend roode kleur maakt dit plantje zeer geschikt voor bloemperken. Men zaait begin Mei en dunt zoodanig, dat de plantjes 20 cm. van elkaar verwijderd komen te staan.

Bloeitijd Juli-Sept. Hoogte 15 cm.

1646. *grandiflorum*, rood Vlas, p. lood f 0.20, p. pakje f 0.05

* LOBELIA.

De Lobelia's zijn genoeg bekend, zoodat elke aanbeveling overbodig geacht kan worden. Voor randen en mozaïekperken vormen zij onmisbaar materieel. Men zaait begin April in den warmen bak en verspeend ze eveneens onder glas en plant ze einde Mei op de perken. Om voller boschjes te krijgen plante men liefst eenige plantjes bij elkaar. Men kan ze ook nog in Mei op een warm plekje buiten uitzaaïen, doeli ze beginnen dan natuurlijk later te bloeien.

Bloeitijd Juli-Oct. Hoogte 15 cm.

1660. *erlnus Kaiser Wilhelm*, helder blauw,
p. lood f 1.50, p. pakje f 0.15

1662. „ *Prima Donna compacta*, donker rood,
p. pakje f 0.15

1664. „ *Crystal Palace compacta*, blauw, de donkerste van alle p. pakje f 0.20

1666. „ *Goldelse*, met goudgeel blad „ „ - 0.20

1668. „ *White Gem*, de schoonste witte,
p. pakje - 0.20

1670. „ *pumila splendens* „ „ - 0.20


Zeer schoone laaggroeiende variëteit, donker purper violet gekleurd, met zuiver wit hart.

1672. *hybrida Saphir* p. pakje f 0.20

(Zie afb. hiernevens.)

De bloemen van deze nieuwe Lobelia zijn van een prachtig diep blauwe kleur, welke te meer tot haar recht komt, door het scherp geteekende, groote, zuilverwitte oog, dat een derde der bloemen inneemt. Deze zijn 2 cm. in doorsnede en verschijnen aan ranken die circa 60 cm. lang worden en geheel met bloemen bezet zijn.

Een in pot gekweekte, volop bloeiende plant, is een sieraad voor balkon en bloementafel. In Januari uitgezaaid, bloeien de planten van einde Mei tot den herfst. Zaait men in September, zoo krijgt men bijzonder sterke planten, die reeds in April beginnen te bloeien.



Lobelia hybrida Saphir.

† LUPINUS.

De meeste Lupinen-soorten worden half April buiten uitgezaaid. Ze kunnen niet tegen verplanten. Alleen L. Hartwegi, die uit Mexico is ingevoerd en niet goed tegen ongunstig weer kan, moet men bij verkiezing in kleine potjes uitzaaïen onder glas en voorzichtig met kluit verplanten. Eene eigenaardigheid der Lupinen is, dat ze 's avonds de bladeren dichtvouwen.

1678. *nanus albo-coccineus*. Bloeitijd Juni-Juli.

H. 30 cm., p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10

Laaggroeiend met van wit in karmijnrood overgaande bloemen.

1680. *Cruikshanksi*. Bloeitijd Juli-Oct., H. 1 M.,

p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10

Met groote blauwe welriekende bloemtrossen.

1682. *Hartwegi*, gemengd, H. 60 cm.,

Bloeitijd Juli-Oct., p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

1684. *hybridus fl. pl. President Cleveland*, met dubbele driekl. bloemen. Bloeitijd Juni-Aug. H. 60 cm.

p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10

1686. *hirsutus*, gemengd „ „ - 0.25, „ „ - 0.10

† MALOPE.

Deze moet in Mei buiten worden uitgezaaid en vereischt zeer weinig zorg. Bloeitijd Juli-Aug. H. 75 cm.

1690. *grandiflora purpurea*, p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

Met groote, rose, purperrood gevlekte bloemen.

1692. *grandiflora*, gemengd, p. lood f 0.15, „ „ - 0.05

* MATRICARIA.

De Matricaria's of dubbele Kamillen moet men in Maart of April onder glas uitzaaïen en in Mei buiten uitplanten. Ze worden veelal voor randen om perken gebruikt. Bloeitijd Juli-Oct.

1698. *alba plenissima*, met dubbele zuiverwitte bloemen.

H. 45 cm., p. lood f 0.40, p. pakje f 0.15

1700. *exima Goldball*, H. 30 cm. „ „ - 0.25

Met talloze goudgele bloempjes, zeer geschikt voor randen.

MESEMBRIANTHEMUM.

De Mesembrianthemums kunnen einde Mei buiten worden gezaaid; men geve de planten een tusschenruimte van 20 à 25 cM., door op tijd uit te dunnen. Wanneer men ze in Maart in den warmen bak zaait, later verspeent en in Mei uitplant bloeien ze vroeger. H. 15 cM.

1706. **crystallinum**, *Ijskruid*. Bloeitijd Juni-Juli,
p. lood f 0.35, p. pakje f 0.10

Eigenaardige bladplant, die geheel bedekt is met kristalachtige blaasjes, waardoor ze er als bedekt met ijs uitziet. Ze wordt veel gebruikt als hangplant in potten.

1708. **tricolor**, Bloeitijd Juni-Sept.,
p. lood f 0.40, p. pakje f 0.10

De schoone rose bloemen openen zich alleen volkomen in de volle zon.

1710. **tricolor album**, wit. Bloeitijd Juni-Sept.,
p. lood f 0.40, p. pakje f 0.10

MIMULUS.

De Mimulus-soorten worden in den warmen bak in Maart uitgezaaid onder glas verspeend en in Mei buiten uitgeplant. Daar het zaad zeer fijn is moet men het niet met aarde bedekken, doch eenvoudig aandrukken en een weinig begieten. Zoodra mogelijk moeten de plantjes worden verspeend. Door hare levendige kleuren zijn deze planten zeer gezocht ook voor potcultuur. Bloeitijd Juni-Sept.

1714. **cupreus**, koperkl. oranje, H. 45 cM., p. pakje f 0.20
1718. **hybridus grandiflorus** Feuerkönig, vuurrood met geel, purper gevlekt. H. 30 cM., p. pakje f 0.25
1720. **moschatus compactus**, Muskusplant,
H. 15 cM., p. pakje f 0.25
1722. **tigrinus**, met schoone gelijgerde bloemen,
H. 30 cM., p. pakje f 0.25

MIRABILIS.

Deze planten hebben zeer opvallende bloemen in allerlei kleuren en nuances. Ze worden in April in den warmen bak uitgezaaid en in Mei op de perken geplant. Men kan ook in Mei buiten uitzaaën, doch dan bloeien ze later. De knollen die zij vormen kunnen op dezelfde wijze als Dahlia's worden overwinterd en des voorjaars weer worden uitgeplant. Bloeitijd Juli-Aug.

1724. **Jalapa**, *Nachtschoonen* in vele kleuren gemengd,
H. 60 cM., p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
1726. „ **Tom Thumb**, zeer laaggroeiend, in vele kleuren gemengd. H. 30 cM., p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

† NEMESIA.

De schoone groote bloemen dezer uit Engeland ingevoerde plant verschijnen in verschillende kleurschakeeringen van wit en geel tot oranje en karmijnrood. De plant moet echter met eenige zorg worden behandeld en in Maart onder glas worden uitgezaaid. Bloeitijd Juli-Aug.


1730. **strumosa Suttonii**, gem., H. 30 cM., p. pakje f 0.30
1732. „ „ **compacta nana**,
H. 20 cM., p. pakje f 0.25

Laaggroeiende, zeer rijkbloeiende variëteit.

NEMOPHILA.

Door hare zoo frissche en teere kleuren zijn deze planten zeer aan te bevelen voor vroege perken. In den bloeitijd zijn ze als met een tapijt van bloemen overdekt. Ze worden in Maart of April op de perken gezaaid en bij het uitdunnen zorgt men dat de planten 15 à 20 cM. tusschenruimte behouden. Bloeitijd Juni-Aug. H. 20 cM.

1736. **atomaria Holborn Blue Bell**, donkerblauw,
p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10
1738. **discoidalis**, zwartbruin met witten rand,
p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10
1740. **insignis**, prachtig hemelsblauw,
p. lood f 0.20, p. pakje f 0.05

*Nemophila maculata.*

1742. **maculata**, wit met donkerviolette vlekken,
p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
1744. gemengd „ „ - 0.15, „ „ - 0.05

NICOTIANA.

De verschillende Siertabak-soorten worden liefst in den warmen bak uitgezaaid en niet vóór begin Juni uitgeplant. N.-affinis kan ook in Mei buiten worden gezaaid, doch bloeit dan wat later. Bloeitijd Juni-Aug.

1746. **affinis**, witbloeiende Siertabak, H. 75 cM.,
p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10
De bloemen dezer soort zijn zeer welriekend.
1748. **colossea**, *Reuzentabak*, H. 240 cM., p. pakje f 0.50
1750. **macrophylla gigantea**, „ 120 „ „ „ - 0.10
De beide laatste soorten zijn bladplanten en maken als zoodanig in groepen bij elkaar geplant een verrassend effect.

*Nicotiana glauca.*

NICOTIANA (vervolg).

1751. *Sanderæ* p. pakje f 0.15
(Zie afbeelding blz. 26.)

Eene zeer schoone variëteit van de eenjarige Tabak. De plant brengt een groot aantal bloemen voort, die karmijnrose gekleurd zijn en een doorsnede hebben van 5 à 6 cM. In tegenstelling met de *N. affinis*, die hare bloemen overdag gesloten houdt, zijn de bloemen dezer soort den geheelen dag geopend. Zij voldoet in alle opzichten zoowel alleenstaand als in groepen. Hoogte 70 cM.

1752. *Sanderæ hybriden* p. pakje f 0.15

Door onderlinge kruisingen en bevruchtungen zijn uit de vroeger ingevoerde *Nicotiana Sanderæ* variëteiten ontstaan, die thans in de volgende kleuren voorkomen: purper, wit, rose, donker- en lichtrood, karmijnrood, zalmkleurigrood en donkerblauw.

1754. *sylvestris* p. pakje f 0.10

Zeer schoon voor alleenstaande plant, maar toch maakt deze aan groepen het mooiste effect. Ze groeit 8 voet hoog en bloeit met zuiver witte, lange, eenigszins neerhangende bloemen.

† NIGELLA.

Dit plantje is zoo algemeen bekend, dat elke beschrijving overbodig kan geacht worden. Men zaait buiten half April. Bloeitijd Juni-Aug. Hoogte 30 cM.

1756. *damascena*, *Juffertje in 't groen*,
p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

1757. " *Miss Jekyll*, nieuwe variëteit met
hemelsblauwe bloemen p. pakje f 0.10

NYCTERINIA.

Laaggroeiend plantje, dat in Maart onder glas moet worden gezaaid. Bloeitijd Juni-Sept. H. 15 cM.

1760. *selaginoides*, zeer rijkbloeiend en welriekend,
p. lood f 0.60, p. pakje f 0.15

De kleur der bloemen gaat van zuiverwit over in licht rose of violet; in het midden oranjevlekt.

† OENOTHERA.

Deze plant kan zich zeer forsch ontwikkelen. Men zaait in Maart-April in den kouden bak en plant in Mei uit op onderlingen afstand van 75 cM. Men kan ook einde April buiten uitzaaian.

De bloemen hebben een fijnen geur en blijven afgesneden, zeer lang goed terwijl de knoppen zich nog openen. Eene eigenaardigheid van deze plant is nog, dat de bloemen zich eerst geheel openen in den namiddag. Bloeitijd Juli-Oet.

1764. *Lamarckiana*, H. 90 cM., p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

1766. *rosea* " " - 0.15

* OXALIS.

De *Oxalis*-soorten zijn zeer dankbaar bloeiende plantjes, die veel voor randen worden gebruikt en ook geschikt zijn voor potcultuur. Men kan ze einde April of in Mei buiten uitzaaian en zorgt bij het uitdunnen pl. m. 15 cM. tusschenruimte te behouden.

Bloeitijd Juli-Sept. H. 15 cM.

1770. *validiviana*, geel p. pakje f 0.15

1772. *tropaeioides*, bruinbladerig met gele bloemen,
p. pakje f 0.20

† PAPAVER.

De Papavers behooren tot de meest bekende en beminde zomerbloemen. De bloemen komen voor in allerlei kleurnuances. Ze laten zich zeer gemakkelijk kweken; men zaait ze half April op den kouden grond en zorgt voor behoorlijk op tijd uitdunnen. Ze kunnen niet tegen verplanten.

Bloeitijd Juli-Sept.

1774. *Danebrog*, scharlakenrood met zilverwitte vlekken,
H. 45 cM., p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

1776. *glaucum* (*Tulpenpapaver*),
p. lood f 0.60, p. pakje f 0.15

Zuiver roodbloeiende Papaver, welke bij voorkeur in het najaar moet worden uitgezaaid. Bloeit Juli-Aug. H. 30 cM.

1780. *Murselli fl. pl.*, wit met rood gesprenkeld,
p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

1782. " " " *The Micado*, dubb. wit m. karmijn
gestr. bloemen, H. 60 cM., p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

1784. *Murselli fl. pl. splendens*, schitterend rose met wit,
p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

1788. *paeoniflorum fl. pl.*, gemengd, H. 60 cM.,
p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

1789. " " " *„Admiraal”* " " - 0.20, " " - 0.05

De witte bloembladen dezer nieuwe, enkele, grootbloemige Papavers zijn omzoomd met een 2 cM. breeden rand van schitterend scharlakenroode kleur. Deze kleuren zijn sekerp begrensd en vormen dus een schoon contrast. Zeer geschikt voor groote groepen.

1792. *Rhoeas Shirley*, enkele, in gemengde kleuren,
H. 60 cM., p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10

1793. *somniferum fl. pl.*, in kleuren gemengd,
H. 90 cM., p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

1794. *somniferum nanum fl. pl. Cardinale*, vuurrood,
p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10

1795. " " *fl. pl. White Swan*, zuiverwit,
p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10

1796. " " *fl. pl.*, in kleuren gemengd,
H. 45 cM., p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

1797. *umbrosum*, scharlakenrood met zwarte vlekken,
p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05



Papaver Virginia.

1798. *Virginia* p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

Deze éénjarige enkelbloemige Papaver heeft groote witte bloemen, welke zachtrose gerand en gefranjeed zijn. Voor vaasbouquetten is zij zeer aanbevelenswaardig, daar de bloemen zich, afgesneden, betrekkelijk lang goed houden.

*** PERILLA.**

De Perilla's kunnen onder de beste sierbladplanten worden gerekend en worden dikwijls gebruikt voor randen om hooggroeiende bloemperken, als b.v. Canna's, Dahlia's enz. Ze maken dan een zeer schoon effect. Men zaait ze einde Maart in den warmen bak, verspeent ze onder glas, terwijl ze dan in Mei kunnen worden uitgeplant.

1799. *nankinensis*, bekende bruinbladerige sierplant, H. 45 cM.,
p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10
1800. *nankinensis macrophylla crispacompacta*, met groote sterk gekrulde bladeren, H. 30 cM.,
p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

PETUNIA.

De Petunia's kunnen zonder twijfel tot de schoonst-bloeiende planten worden gerekend, dank zij de groote verscheidenheid en de meest schitterende kleuren en vormen harer bloemen. Zij bloeien den geheelen zomer aanhoudend door. Men kan ze voor allerlei doeleinden gebruiken, zooals voor perken, balsems, groote tuinvazen, versiering van oude muren en ruinen enz. en vooral wat betreft de grootbloemige en dubbele soorten voor potcultuur.

Daar de kweekwijze doodeenvoudig is, behoeft dit niemand af te schrikken om ze te zaaien. In Maart of April zaait men in een lauw-warmen bak in potten of zaaipannen gevuld met lichte tuingrond. Men moet ze later onder glas verspenen en na eenige weken uitplanten, hetzij in potten, hetzij op den kouden grond zoodra het weer dit toelaat. Op de perken moet men ze niet dichter planten dan 50 cM. Nog valt bij het zaaien op te merken, dat de zeer fijne zaden bijna of in 't geheel niet met aarde mogen worden bedekt. Indien men geen bak te zijner beschikking heeft, kan men ook in potten in de kamer zaaien, om ze, zoodra de plantjes sterk genoeg zijn, te verplanten. Bij deze planten, vooral bij de dubbele, valt nog op te merken, dat men niet zooals dit dikwijls geschiedt bij het verspenen of verplanten de mooiste en zwaarste planten uitzoekt, daar deze meesttijds bloemen van mindere kwaliteit voortbrengen. Men kan van de mooiste soorten ook planten overwinteren in kamer of serre en dan in 't voorjaar stekken. Bloeitijd juli-Oct. H. 45 cM.

1804. *hybrida*, gewone in schoone kleuren gemengd,
p. lood f 1.—, p. pakje f 0.15
1808. „ *grandiflora*, grootbloemige prachtsoorten
gemengd . . p. pakje f 0.75
1810. „ „ *alba*, zuiverwit „ „ - 0.50
1812. „ „ *rosea*, rose „ „ - 0.50



Petunia hybr. grandifl. fimbriata.

1816. *hybrida grandiflora fimbriata*, gekartelde in de
schoonste grootbloemige soorten, p. pakje f 0.90



Petunia hybr. grandiflora fimbriata nana.

1817. *hybrida grandifl. fimbriata nana*, p. pakje f 0.90

Bij de toenemende vraag naar Petunia's deed zich meer en meer de behoefte aan een dwergsoort met gefranjeerde bloemen gevoelen. De planten dezer nieuwe klasse nu worden slechts pl.m. 20 cM. hoog, vertakken zich rijk vanaf den bodem, blijven echter goed compact, zoodat zich kleine bossen vormen, die niet behoeven opgebonden. De talrijke bloemen verheffen zich vrij boven het loof, terwijl ze in alle kleuren, welke men bij de Petunia's aantreft, voorkomen.

1820. *hybrida nana compacta*, prachtige lage Petunia,
-gemengd p. pakje f 0.25
1824. *hybrida grandiflora fl. pl.*, dubbel grootbl. pracht-
soorten gem., p. pakje f 0.80
1826. „ „ *fimbriata fl. pl.*, dubbele ge-
kartelde soorten gemengd, p. pakje f 1.—

*** PHACELIA.**

Zeer schoon plantje met satijnblauwe klokvorinige bloemen; ook uitmendend geschikt voor randen. Men zaait in April-Mei op de perken en geve bij het uitdunnen de plantjes een tusschenruimte van circa 25 cM. Bloeitijd juli-Sept. H. 30 cM.

1828. *campanularia* p. pakje f 0.25
1830. *tanacetifolia* . . p. lood f 0.15, „ „ - 0.05
- Prachtig bijenvoeder-gewas.

† PHLOX DRUMMONDI.

De *Phlox Drummondii* kan zonder twijfel tot de schoonste en dankbaarste zomerbloemen worden gerekend. Door het groote aantal variëteiten, dat thans bestaat, maar waaruit ik echter alleen de beste en meest uiteenlopende heb gekozen, kan men met deze planten de meest kleurrijke perken maken. De kweekwijze is zeer eenvoudig. Men kan ze zaaien op den kouden grond in April-Mei en bij het uitdunnen de planten een tusschenruimte van pl.m. 15 cM. laten behouden. Ook zaait men ze in Maart-April in den kouden bak; zoodra de planten eenige blaadjes hebben, kan men ze op de perken zetten en ze nog wat meer ruimte geven, b.v. 25 eentim. Om laat in het najaar nog Phloxbloemen te kunnen snijden voor bouquets, zaait men ook nog in 't begin van Juni. Bloeitijd juli-Oct. H. 45 cM., de lage soorten 20 cM.

1832. in schoone kleuren gemengd,
p. lood f 0.75, p. pakje f 0.15
1834. *cuspidata*, met spits toeloopende bloembladen in
schoone kleuren gemengd. . . p. pakje f 0.25
1836. *fimbriata*, met franjeachtige bloembladeren in
schoone kleuren gemengd. . . p. pakje f 0.25
1838. *grandiflora*, grootbloemige prachtsoorten gemengd,
p. lood f 0.80, p. pakje f 0.20
1840. „ *alba*, zuiver wit . . . „ „ - 0.25
1842. „ *atro-purpurea* . . . „ „ - 0.25

*Reseda odorata grandiflora* witte Goliath.**RICINUS.**

Voor groote perken zijn deze reusachtige snelgroeijende bladplanten ten zeerste aan te bevelen. Ze hebben een eenigszins tropisch voorkomen; wil men ze goed tot ontwikkeling zien, zoo moet men den grond flink mesten. Men zaait de pitten half Mei op den kouden grond.

1910. *borboniensis arboreus*, *Wonderboom*, H. 120 cm.,
p. lood f 0.30, p. pakje f 0.15

1912. *Gibsoni* „ „ - 0.30, „ „ - 0.15

Deze variëteit, die tot 2 Meter hoog kan groeien, heeft prachtige donkerroode bladeren met metaalachtigen glans.

1914. *sanguineus* . . . p. lood f 0.30, p. pakje f 0.15
Groeit tot 2 Meter hoog en heeft bloedroode vruchten.

1916. *Zanzibariensis*, gemengd, H. 150 cm.,
p. lood f 0.30, p. pakje f 0.15

† SALPIGLOSSIS.


Deze planten hebben zeer schoone, grillig gekleurde bloemen; zij laten zich niet gemakkelijk verplanten en worden begin Mei op een warm plekje uitgezaaid. Bloeitijd Juli-Sept.

1920. *variabilis grandiflora*, in vele kleuren gemengd,
H. 75 cm., p. lood f 1.40, p. pakje f 0.25

1922. „ *nana*, lage in vele kleuren gemengd,
H. 30 cm., p. lood f 1.40, p. pakje f 0.25

1924. „ *superbissima* „ „ - 0.30

Eene variëteit van de bekende *Salpiglossis variabilis*. De kleur dezer nieuwe Keizer *Salpiglossen* variëert van rosa tot donkerscharlaken, terwijl ook helderblauw en goudgeel wordt aangetroffen.

*Salpiglossis variabilis*.**† SALVIA.**

De *Salvia*'s kunnen in het voorjaar in kas of bak gezaaid worden, om in Mei buiten te worden uitgeplant. Ze bloeien het eerste jaar uit zaad van Juli tot het gaat vriezen; het zijn half vaste planten.

1926. *coccinia* p. lood f 0.40, p. pakje f 0.15
Groeit ongeveer 30 cm. hoog en heeft schoone vuurroode bloemen.

*** SANVITALIA.**

Dit plantje is zeer geschikt voor randen. Men zaait in April in den bak, verspeent onder glas en verplant ze in Mei met een tussenruimte van pl.m. 40 cm. Bloeitijd Juli-Sept. H. 55 cm.

1930. *procumbens plenissima compacta*, p. pakje f 0.15
Met schoone dubbele zwart met geel gekleurde bloemen.

SAPONARIA.

Kruipend plantje, dat zeer rijk bloeit. Men zaait op den kouden grond in Maart of April. Bloeitijd Juli-Oct. Hoog 15 cm.

1934. *multiflora*, rose . . p. lood f 0.20, p. pakje f 0.05

1936. „ *alba*, wit „ „ - 0.25, „ „ - 0.05

1938. „ *Scarlet Queen*, scharlakenrood,
p. lood f 0.30, p. pakje - 0.10

† SCABIOSA.

De *Scabiosa*'s laten zich uiterst gemakkelijk kweken. Men zaait ze in April-Mei, hetzij direct op de perken of eerst op een bed om ze later uit te planten. Ze hebben dit voordeel, dat het verplanten zonder eenig nadeel kan geschieden, en men kan daarmede zelfs wachten tot dat de eerste bloemen verschijnen. Een paar malen flink begieten is voldoende om de planten te laten doorgroeien. Men geeft ze een tussenruimte van 40 cm. Bloeitijd Juli-Oct.

1942. *candidissima plena*, H. 60 cm.,
p. lood f 0.50, p. pakje f 0.10

Dubbele witte bloemen, extra mooi voor bouquets.


1946. *atropurpurea major grandiflora fl. pl.*, met zeer groote en dubbele bloemen, in vele kleuren gem.,
H. 60 cm., p. lood f 0.40, p. pakje f 0.10

1948. *atropurpurea nana fl. pl.*, laag in vele kleuren gemengd, H. 30 cm., p. lood f 0.40, p. pakje f 0.10

1950. *atropurpurea nana plena*, zwartbruin, H. 30 cm.,
p. lood f 0.40, p. pakje f 0.10

† SCHIZANTHUS.

Deze planten hebben zeer eigenaardig gevormde en fraai gekleurde bloemen, die eenigszins aan vlinders doen denken, waardoor ze zeer gezocht zijn voor bouquets. Men zaait in April-Mei op den kouden grond. Ook kan men ze met succes in potten kweken. Bloeitijd Juli-Oct.



Schizanthus hybridus grandiflorus.

1952. **hybridus grandiflorus** *p. pakje f 0.20*

Eene in de laatste jaren ingevoerde prachtige variëteit die zowel voor potcultuur als voor perken geschikt is. De plm. 30 cm. hooge, pyramidaal gevormde planten zijn overdekt met een menigte in alle denkbare kleuren voorkomende op Orchideeën gelijke bloemen.

1954. **pinnatus Tom Thumb**, laaggr., in gem. kleuren, H. 30 cm., *p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10*

* SENECIO.

Uitmuntend plantje voor randen, dat bijna op elke grond groeit. Men zaait in April-Mei op den kouden grond en geve bij het verplanten minstens 40 à 50 cm. tusschenruimte, waardoor de planten zich beter zullen ontwikkelen dan wanneer ze te dicht staan. De afgesneden bloemen blijven in water zeer lang goed. De bloemen komen voor in de meest verschillende nuances van rose, lila, violet, rood tot wit. Bloeitijd Juli-Oct. H. 20 cm.

1964. **elegans nanus plenissimus**, in vele kleuren gem., *p. pakje f 0.20*

1966. " **plenissimus**, in kleuren gemengd, *p. pakje f 0.20*

1968. " **pomponicus fl. pl.**, in gemengde kleuren, *p. pakje f 0.20*

Allerliefste variëteit met dubbele kleine ronde bloemen.

SILENE.

Daar de *Silene's* tot de vroegstbloeiende planten behooren, worden ze veelvuldig gebruikt voor het beplanten van voorjaarsperken, waarvoor ze door den grooten rijkdom van bloemen uitnemend geschikt zijn. Als een perk hiervan in vollen bloei is, ziet men letterlijk niets dan bloemen. Ofschoon men ze ook wel in 't voorjaar kan zaaien, en ze dan natuurlijk later bloeien, voldoet najaarszaaiing het best. Men zaait einde Juli of Augustus, verspeent de plantjes op 15 cm. afstand en plant ze begin October op de perken met een tusschenruimte van 30 cm. Men moet ze met dennentakken of ander licht materiaal voor strenge vorst dekken. Bloeitijd Mei of Juli

1972. **pendula compacta**, rood, H. 15 cm., *p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10*
 1974. " " **alba**, wit, H. 15 cm., *p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10*
 1976. " " **fl. pl. dubbel rose**, H. 15 cm., *p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10*
 1980. " " **fl. pl. Perzikbloesem**, zeer compact en extra dubbel, *p. pakje f 0.15*
 1982. " **Bonnetti**, donker purperrood, H. 30 cm., *p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05*
 1984. " **ruberrima**, donkerrood, H. 30 cm., *p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05*

† STATICE.

De bloemen dezer fraaie planten zijn zeer schoon voor bouquets. Wanneer men de bloestengels afsnijdt en op eene droge plaats onderstboven ophangt totdat ze droog zijn, blijven ze zeer lang goed en zullen de bloemen hare natuurlijke kleur behouden, evenals de inwortellen. Zij wordt begin Mei buiten gezaaid. Bloeitijd Juli-Sept. H. 45 cm.

1990. **sinuata**, blauw . . . *p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10*

1992. **superba fl. alba**, zuiver wit, *p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10*

1994. **Suworowi**, met lange zeer ijle helderroze bloemtrossen *p. pakje f 0.25*

† TAGETES.

De *Afrikanen* zijn zeer algemeen bekende zomerbloemen, doch daarom niet minder in waarde voor den bloemenliefhebber. Ze vereischen bijzonder weinig zorg en de afgesneden bloemen blijven lang frisch. De planten laten zich zelfs wanneer ze reeds volop in knop zijn nog met succes verplanten. Men zaait ze einde April op een warm bed en verspeent ze op tijd, om ze einde Mei of tegen den tijd dat ze beginnen te bloeien, met kluitjes op de perken te zetten. De hooge soorten geven men 50 cm., de lage 30 cm., tusschenruimte. Na het planten moet men flink aangieten. Bloeitijd Juli-Sept.

1996. **erecta aurantiaca plena**, hooge Afrikaan, met oranje bloem, H. 75 cm., *p. lood f 0.35, p. pakje f 0.10*

1998. " **Eldorado**, hooge Afrikaan, met enorm groote oranje bl., H. 1 M., *p. lood f 0.35, p. pakje f 0.10*

2000. " **fl. pl.**, hooge dubbele Afrikaan, in gemengde kleuren . . . *p. lood f 0.35, p. pakje f 0.10*

2001. **halfhooge Fransche hybriden**, in prachtige soorten gemengd, *p. lood f 0.60, p. pakje f 0.15*

2002. **patula nana fl. pl. Electrisch licht**, H. 45 cm., *p. lood f 0.60, p. pakje f 0.15*

Zwavelgeel met bruine streepen.

2003. **patula nana Goudrand**, enkele, purperbruin met goudgeelen rand, *p. lood f 0.40, p. pakje f 0.10*

2004. " " **Legioen d'Honneur**, lage enkelbloemige Afrikaan, geel met bruine vlekken, H. 30 cm., *p. lood f 0.40, p. pakje f 0.10*

2006. " " **fl. pl.**, lage Afrikaan, in gem. kleuren, H. 30 cm., *p. lood f 0.35, p. pakje f 0.10*

2008. **signata pumila**, zeer laag, rijkbloeiend met schoon geteekend oranje en bruingekleurde bloemen, H. 20 cm. . . . *p. lood f 0.60, p. pakje f 0.15*

TROPAEOLUM (lage Oost-Ind. Kers).

De laaggroeiende *Oost-Ind. Kers* kan begin Mei worden gezaaid op den kouden grond. Bloeitijd Juli-Oct. H. 30 cm.

2012. **majus nanum**, lage Oost-Ind. Kers, in kleuren gemengd, *p. lood f 0.10, p. pakje f 0.05*

2014. " " **Aurora**, donkergeel met bruine vlekken, *p. lood f 0.10, p. pakje f 0.05*

2016. " " **Empress of India**, met donkere bladeren en scharlakenroode bloemen, *p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10*

2018. " " **King Theodore**, zwartrood, *p. lood f 0.10, p. pakje f 0.05*

TROPEOLUM. (Lage Oost-Ind. Kers) vervolg.

2020. *majus nanum* Pearl, geelachtig wit,
p. lood f 0.10, p. pakje f 0.05
2021. " " **King of Tom Thumbs**, vurig schar-
laken met donker blad,
p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10
2022. " " **Spencer**, in prachtige kleuren gem.,
p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10

† **VERBENA.**

De *Verbena's* met haar schitterend gekleurde bloemen, die den geelen zomer doorbloeien, leenen zich bij uitstek voor bloeiende perken. Men zaait einde Maart in den bak, verspeent de jonge plantjes onder glas, hetzij eenvoudig in den bak of in potjes en plant ze half Mei op de perken met een tusschenruimte van 30 cm. De laaggroeiende verscheidenheden kan men iets dichter planten. Wanneer men begin Mei op den knuden grond zaait, zullen de planten in den nazomer bloeien. Bloeitijd Juni-Sept. H. 30 cm.

2024. *hybrida*, in vele kleuren gemengd,
p. lood f 0.65, p. pakje f 0.15
2026. " **coccinla**, in roode variëteiten,
p. pakje f 0.25
2028. " **grandiflora**, in grootbl. prachtsorten gem.,
p. lood f 0.65, p. pakje f 0.15
2030. " **aurikelbloemige**, schoone variëteiten, met
wit oog p. pakje f 0.25
2032. " **candilissima**, zuiver wit " " - 0.25
2034. " **Defiance**, scharlakenrood " " - 0.30
2036. " **grandiflora Mammuth**, in kleuren gem.,
p. pakje f 0.30
2037. " **Purpermantel**, donkerpurper met wit,
p. pakje f 0.25
2038. " **compacta**, laaggr. in vele prachtsorten
gemengd p. pakje f 0.25

VIOLA TRICOLOR MAXIMA.

De beste tijd van zaaien voor de grootbloemige Viooltjes is einde Juli in den vollen grond. Zoodra de planten eenige blaadjes hebben, verspeent men ze in goeden grond op een afstand van 10 centimeter om ze later, b.v. in de laatste helft van October, met een kluitje op de perken te zetten, na deze eerst flink te hebben bemest. Men plant ze dan op 30 centim. afstand van elkaar. Bij strenge koude is het goed ze niet eenige rugte of dennentakken licht te bedekken. Op deze wijze behandeld zullen de bloemen hare volkomen grootte bereiken. Men kan ze ook in 't voorjaar zaaien, naar de bloemen worden dan veel kleiner. Bloeitijd Maart-Juli. H. 15 cm.

2044. *Grootbloemige Engelsche Pensées* of *Viooltjes* in vele
kleuren gemengd, p. lood f 0.75, p. pakje f 0.15
2046. *alba pura* (Schneewittchen), zuiver wit,
p. lood f 1.20, p. pakje - 0.20
2048. **cardinal**, prachtige bruinroode kleur,
p. lood f 1.20, p. pakje - 0.20
2050. **Feuerkönig**, zeer schoon geel met purperkleurig
en bruin oog . . . p. lood f 1.20, p. pakje f 0.20
2051. **Kaiser Friedrich**, zeer donker met gelen rand,
p. lood f 1.20, p. pakje f 0.20
2052. **Kaiser Wilhelm**, donker blauw met purperviolet
oog p. lood f 1.20, p. pakje f 0.20
2054. **Lord Beaconsfield**, purperviolet, bovenste bloem-
bladeren wit . . . p. lood f 1.20, p. pakje f 0.20
2055. **Météor**, donkerbruinrood, prachtig
p. lood f 1.20, " " - 0.20
2056. **nigra Dr. Faust**, zwart, p. lood f 1.20, " " - 0.20
2058. **Bugnot's prachtsorten**, in vele nuances met
grootte vlekken . p. lood f 2.50, p. pakje f 0.40
2060. **Cassler's grootbloemige drie- en vijf-vlekkige prachtsorten**,
gemengd p. lood f 2.—, p. pakje f 0.35
2062. **Odier**, schoone vijf-vlekkige Fransche Pensées in
vele nuances . . p. lood f 2.50, p. pakje f 0.40
2063. **Pauwenoo**, lichtblauw met oog en witten rand,
p. lood f 1.20, p. pakje f 0.20
2064. **Trimardeau, Reuzenpensées**, gemengd,
p. lood f 1.—, p. pakje f 0.20

Uit Frankrijk ingevoerde pensées, welke zich kenmerken door gedrongen groeiwijze en buitengewoon groote bloemen, die meestal met groote vlekken zijn geteekend en in verschillende kleuren voorkomen. De bloemen hebben een middellijn van 7 à 10 cm.

2066. **Trimardeau Adonis**, helderblauw met wit hart,
p. lood f 1.50, p. pakje f 0.30

2068. **Trimardeau atro-purpurea**, donkerpurperrood,
p. lood f 1.50, p. pakje f 0.30
2070. " **candilissima**, zuiver wit,
p. lood f 1.75, p. pakje f 0.35
2072. " **Goldelse**, goudgeel,
p. lood f 1.50, p. pakje f 0.30

VISCARIA.

Dit laaggroeiende plantje kan buiten worden uitgezaaid. Bloeitijd Juni-Augustus. H. 30 cm.

2076. **cardinalis**, magentarood, p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10
2078. **oculata candida**, zuiver wit,
p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10
2080. " in kleuren gem., " " - 0.25, " " - 0.10

WHITLAVIA.

Men zaait deze plantjes begin Mei op de perken. De aardige helder-gekleurde klokvormige bloempjes verschijnen reeds zeer vroeg en in grooten getale. Bloeitijd Juni-Augustus. Hoogte 30 cm.

2084. **grandiflora**, vroegbloeiend met schoone blauwe
bloemen, p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10
2086. " **alba**, zuiver wit, p. lood f 0.25, p. p. f 0.10
2088. **gloxinoides**, wit met blauwgevekte klokjes,
p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10

† **ZINNIA.**

De *Zinnia's* behoorlen tot de meest bekende zomerbloemen. Men zaait ze op een warm plekje in den tuin omstreeks half April en zoodra de planten eenige blaadjes hebben, verspeent men ze, hetzij direct op de perken of nog beter eerst op een bed om ze later met een kluitje te verplanten. Men geve de planten 40 à 50 centimeter tusschenruimte. Bloeitijd Juli-October.

2090. **elegans**, enkele en halfdubbele gemengd,
p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

*Zinnia elegans fl. pl.*

2096. **elegans fl. pl.**, dubbele in vele kleuren gemengd,
H. 60 cm., p. lood f 0.35, p. pakje f 0.10
2098. " **fl. pl. „Roodkapje,”** vuurrood, prachtig
gevormd, p. lood f 0.60, p. pakje f 0.20
2100. " **grandiflora robusta fl. pl.**, reuzenbloemige
gemengd, p. lood f 0.45, p. pakje f 0.15
2102. " **fl. pl. Tom Thumb**, Dwerg *Zinnia's* in
prachtsorten gemengd, H. 30 cm.,
p. lood f 0.60, p. pakje f 0.20
2104. **Haageana fl. pl.**, dubbele gele variëteit,
p. pakje f 0.20
2106. **elegans striata fl. pl.**, gestreepte gemengd,
p. lood f 0.60, p. pakje f 0.20

ZADEN VAN KLIMPLANTEN.

Bloeitijd Juli—October.

ARISTOLOCHIA.

Prachtige klimplant, die in den bak wordt uitgezaaid en sterk groeit. Meestal bloeit ze reeds het eerste jaar.

2112. *elegans*. p. pakje f 0.20
 Zeer rijkbloeiend met bruine en gele bloemen.

CLITORIA.

De Clitoria is een prachtige rijkbloeiende klimplant. Ze wordt in den bak uitgezaaid.

2118. *ternatea fl. pl.* p. pakje f 0.20

COBAEA.

Voor bedekking van muren wordt deze snelgroeiende plant met succes gebruikt. De groote klokvormige bloemen zijn eerst groen doch kleuren zich spoedig prachtig violetblauw. Men zaait begin April in den bak.

2122. *scandens*. p. pakje f 0.25

ECCREMOCARPUS (CALAMPELIS).

In Maart in den warmen bak uitgezaaid en daarna verspeend worden de plantjes begin Mei buiten geplant. Het is een der schoonste klimplanten met talloze oranje-kleurige bloemen en zeer geschikt voor bedekking van muren en schuttingen.



Calampelis scaber aurea.

2126. *scaber*. p. pakje f 0.15
 2127. " *aurea* " " - 0.20
 Variëteit der voorgaande met schitterend goudgele bloemen.

HUMULUS.

Deze plant groeit snel en zeer hoog, is goed bestand tegen het weder en daardoor vooral geschikt tot het bedekken van prieltjes, welke op open plaatsen zijn gelegen. Men zaait in April op den kouden grond.

2130. *japonicus*, *Japansche Hop*, p. lood f 0.35, p. pakje f 0.15
 2132. " *fol. var.* - 0.35, " " - 0.15
 Met witbonte zilverschadige bladeren. Maakt een prachtig effect.

IPOMAEA.

Deze plant wordt ook wel klimmende *Convolvulus* genoemd en is bijzonder geschikt voor balkons. Zij is zeer gemakkelijk te kweken en wordt voor dat doeleinde in April in groote potten of zinken bakken met aarde gezaaid.

2140. *purpurea*, in gemengde kleuren,
 p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
 2142. " *fl. pl.*, gemengd,
 p. lood - 0.25, " " - 0.10
 Dubbele variëteit der voorgaande.


† LATHYRUS ODORATUS.

Deze welriekende erwten kunnen evenals de doperwten worden gekweekt en half April bij erwtenrij of gaasdraad worden gezaaid. Ze hebben gaarne veel zon, doch vereischen verder niet de minste zorg. Zeer schoon voor bouquets.
 Ook andere, niet in deze Catalogus genoemde soorten, zullen op verlangen gaarne geleverd worden.

ECKFORDS HYBRIDEN, grootbloemige.

2143. *Agnes Eckford*, rose, p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10
 2144. *Amerika*, bloedrood gestreept op witten grond,
 p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10
 2145. *Aurora*, wit, oranje gestr., " " - 0.20, " " - 0.10
 2146. *Black Knight*, donker kastanjebruin,
 p. lood f 0.20, " " - 0.10
 2147. *Bolton's Pink*, schitterend zalmkleurig rose,
 p. lood f 0.20, p. pakje - 0.10
 2148. *Coccolnea*, prachtig kersrood,
 p. lood - 0.20, " " - 0.10
 2149. *Dainty*, wit met rose; langstelig,
 p. lood f 0.20, " " - 0.10
 2150. *Dorothy Eckford*, grootbloemig zuiver wit,
 p. lood f 0.20, p. pakje - 0.10
 2151. *Flora Norton*, zuiver lichtblauw,
 p. lood f 0.20, " " - 0.10
 2152. *Golden rose*, lichtgeel, rosa gestreept,
 p. lood f 0.20, p. pakje - 0.10
 2153. *Henry Eckford*, prachtig oranje rose,
 p. lood f 0.20, " " - 0.10
 2154. *Jeannie Gordon*, rose op lichtgelen grond,
 helder rose geaderd, p. lood f 0.20, p. pakje - 0.10
 2155. *King Edward VII*, helderrood, grootbloemig,
 p. lood f 0.20, p. pakje - 0.10
 2156. *Loveley*, prachtig rosa-scharlaken, groot-
 bloemig p. lood f 0.20, p. pakje - 0.10

† **LATHYRUS ODORATUS**,
Eckfords hybriden (vervolg).



Lathyrus odoratus Mont Blanc.

2157. **Mont Blanc** . . . *p. lood* f 0.20, *p. pakje* f 0.10
Prachtige, zeer vroeg bloeiende variëteit met groote zuiver witte bloemen.
2158. **Mrs. Geo. Higginson Jr.**, licht hemelsblauw, prachtige lichtblauwe nuance, *p. lood* f 0.20, *p. pakje* f 0.10
2159. **Salopian**, met goed gevormde groote bloemen van een schitterend karmozijn roode kleur, *p. lood* f 0.20, *p. pakje* - 0.10
2162. **Eckfords hybriden**, in vele kleuren gemengd, *p. ons* f 0.75, *p. lood* f 0.10, *p. pakje* - 0.05

2163. **PRÆCOX**, in schoone kleuren gemengd, *p. ons* f 2.—, *p. lood* f 0.30, *p. pakje* - 0.15

De *Lathyrus praeox* is zeer geschikt om te vervroegen. In het voorjaar op den kouden grond gezaaid, bloeien ze ook aanmerkelijk vroeger dan de andere variëteiten.

† **LATHYRUS ODORATUS**,
SPENCER TYPEN.

Nieuwe *Lathyrus*-klasse, welke zich onderscheidt door bijzonder groote breedte, gegolfde bloemen.

2164. **Asta Ohn**, lilarosa . . *p. lood* f 0.40, *p. pakje* f 0.20
2165. **Countess Spencer**, brillant scharlaken rosa; zeer langstelig . . *p. lood* f 0.40, *p. pakje* - 0.20
2166. **Etta Dyke**, wit . . „ „ - 0.50, „ „ - 0.25
2167. **Florence Nichtingale**, lavendelblauw, *p. lood* f 0.40, *p. pakje* f 0.20
2168. **Helen Lewis**, zalmkleurig oranje, *p. lood* f 0.30, „ „ - 0.15
2169. **Hercules**, brillant rosa, „ „ - 0.60, „ „ - 0.30

2170. **John Ingman**, helder karmozijnrosa, *p. lood* f 0.40, *p. pakje* f 0.20
2171. **Margaret Atlee**, zacht rosa, *p. lood* - 0.60, „ „ - 0.30
2172. **Maud Holmes**, karmozijn, *p. lood* - 0.40, „ „ - 0.20
2173. **Mrs. Cuthbertson**, rosa en wit, *p. lood* f 0.50, „ „ - 0.25
2174. **Thomas Stevenson**, oranje scharlaken, *p. lood* f 0.40, *p. pakje* - 0.20
2175. **Spencer Typen**, prachtmengsel, *p. ons* f 2.25, *p. lood* f 0.30, *p. pakje* - 0.15

MAURANDIA.

Deze sierlijke klimplant verlangt buiten een warm plaatsje tegen een muur op het zuiden. Ook wordt zij veel in potten gekweekt aan een hekje of eenige stokjes te zamen gebonden. Met moet in Maart in den bak uitzaaïen.

2176. In schoone soorten gemengd . . *p. pakje* f 0.30

MINA.

De bloemen dezer schoone klimplant zijn eerst hoog rood, welke kleur bij het ontkiemen in oranjegeel en later in geelachtig wit overgaat. Deze moet eveneens onder glas worden gezaaid.

2177. **lobata** *p. pakje* f 0.30

PASSIFLORA.

Deze algemeen bekende Passiebloem moet worden uitgezaaid in den bak. Ze vereischt niet heel veel zorg, wanneer men slechts niet te schralen grond neemt.

2178. **coerulea** *p. pakje* f 0.25
Zeer rijkbloeiend met lichtblauwe bloemen.

THUNBERGIA.

Deze plant wordt bijna uitsluitend als hangplant in potten gekweekt. De heldergekleurde bloemen hebben van binnen een zwarten vlek. Zij wordt in den bak gezaaid.

2182. **alata**, in gemengde kleuren . . . *p. pakje* f 0.20

TROPAEOLUM (Klimmende Oost-Ind. kers).

De *Oost-Ind. kers* wordt einde April buiten gezaaid. Nog beter is het om onder glas te zaaien en in Mei buiten te planten.

2190. **majus**, in vele kleuren gemengd, *p. ons* f 0.50, *p. lood* f 0.10, *p. pakje* f 0.05
2192. „ **Chamaeleon** „ „ - 0.20, „ „ - 0.10
Deze brengt aan één tak bloemen van verschillende kleuren voort.
2194. **majus**, **Prins Hendrik**, zeer schoon, *p. lood* f 0.20, *p. pakje* f 0.10
2196. **lobblanum**, in vele kleuren gemengd, *p. lood* f 0.10, *p. pakje* f 0.05
2198. „ **hederæfolium**, (*klimopbladerig*), *p. lood* f 0.20, *p. pakje* f 0.10

Zeer schoone variëteit met bladeren van een donkere metaalkleur, die een eigenaardig contrast vormen met de scharlakenroode bloemen, die in groote menigte zich vertoonen. Ze komt goed op uit zaad. Zeer geschikt voor plantenhangars, potten enz.

2199. **lobblanum Kouingin hybriden**, bontbladerige variëteiten in prachtmengsel, *p. lood* f 0.20, *p. pakje* f 0.10

2200. „ **Margarite**, „ „ - 0.20, „ „ - 0.10
Van binnen heldergeel, bloedrood gevlekt en gestreept. Het loof is donker met blauwachtige tint.

2202. **peregrinum (canariëse)**, *p. lood* f 0.25, *p. pakje* f 0.10
Zeer fraaie, snelgroeïende klimplant met kanariegele bloemen.

SIERKALABASSEN.

Wat de kweekwijze der Sierkalabassen betreft, verwijs ik naar hetgeen op bladz. 7 over de Pompoenen is gezegd.

2204. groote soorten gem., *p. lood* f 0.30, *p. pakje* f 0.15
2206. kleine „ „ „ „ - 0.30, „ „ - 0.15

2298. *elegans*. *p. lood* f 0.30, *p. pakje* f 0.10

HORDEUM.

De sierlijke aren, voorzien van zeer lange en fijne haren, zijn bijzonder geschikt voor bouquetten. H. 45 cM.

2314. *jubatum* p. pakje f 0.15

LAGURUS.

Zoals de naam dit aanduidt, doen de wollige pluimen veel aan den staart van een langoor denken.

2318. *ovatus*, *Hazestaart* p. pakje f 0.15

STIPA.

Bekende soort met fijne aren, die van lange haren voorzien zijn.

2338. *pennata*, *Vedergras*, H. 45 cM. . . p. pakje f 0.25

ZEA.

2342. *gracillima variegata*, *bonte Maïs*, H. 90 cM.,
p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10

Zaden van Potplanten.

Deze zaden moeten over 't algemeen met meer zorg worden behandeld dan de zomerbloemen. Vooral bij het zaaien moet men de vereischte regelmatige temperatuur geven, voor gelijkmatige vochtigheid zorgen, oppassen door doelmatige luchtverversing dat zich geen schimmel of zwamziekten vertoonen, enz. Men zaai vooral niet te dik, drukke daarna den grond voorzichtig met een plankje aan, en dekke de zaden met een weinig zeer fijn gezeefde bladaarde, vermengd met een even groote hoeveelheid scherpzand. De zeer fijne zaden, als *Begonia*, *Gloxinia*, enz., mogen niet, of althans niet noemenswaard, met aarde worden bedekt. In 't algemeen bedekke men de zaden met een laagje aarde, dat niet dikker mag zijn dan de dikte van 't zaad.

Hardbastige zaden, als *Canna*, *Acacia* enz., kunnen met een vijl een weinig worden aangevijld, zorgdragende de kiem niet te beschadigen, om een spoedige ontkieming te bevorderen. Ook kan men tot dat doeleinde de zaden een paar dagen weken in één procents chlooroplossing in water.

De pot of zaaipan waarin gezaaid is, wordt met een glasruit bedekt om spoedig uitdrogen te voorkomen. Zoodra de jonge plantjes opkomen, verspene men ze en herhale dit nog eenige malen, waardoor ze een sterk wortelgestel zullen krijgen.

ABUTILON.

De Abutilons kunnen des zomers buiten worden geplaatst. Het zijn ongemeen schoone planten met fraaie bonte bladeren en klokvormige bloemen. Ze zijn overblijvend. H. 30 cM.

2346. *hybridum*, in de schoonste laaggroeiende rijk-bloeiende soorten, gem. p. pakje f 0.50

ACACIA.

Schoone koude-kas-planten, die door sierlijk loof en schoone, somtijds zeer welriekende bloemen, alle aanbeveling verdienen. Zij bloeien meest in den winter en in 't voorjaar.

2352. *lophanta speciosa nana compacta*, H. 45 cM.,
p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

Met prachtige fijne bladeren, die een allerschoonst effect maken; zeer geschikt voor waranda's en serres.

2356. *gemengd*, in vele soorten, p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

ASPARAGUS.

Deze bekende sierlijke planten worden gezaaid in de warme kas en daar ze zeer langzaam ontkiemen, moet er wel op gelet worden dat de aarde waarin men gezaaid heeft frisch blijft; ze kunnen zeer goed tegen de kamerlucht en leveren met hun fijn varenachtig groen een prachtig materiaal voor het versieren van tafels, enz.

2368. *plumosus nanus* p. 25 zaden f 0.50

Met het prachtigste vederachtige groen.

2372. *Sprengeri* „ 25 „ - 0.20

BEGONIA.

De *Begonia's* moeten begin Maart in den warmen bak worden gezaaid. Daar de kiemplantjes licht door een schimmelziekte worden aangetast, moet men zorgen voor lichte bladaarde om in te zaaien en goed gedraineerde vlakke zaaipannen. De fijne zaden moeten een weinig worden aangedrukt, doch niet met aarde worden bedekt. Men bedekke de pannen met een glasruit. Zoodra mogelijk verspene men de kleine plantjes, dat zeer voorzichtig moet geschieden, en herhale dit nog een maal of drie. Langzamerhand gewent men ze tevens aan een koelere temperatuur. Op deze wijze zullen de plantjes hetzelfde jaar nog in juli in bloei komen. Voor knollen zie Afd. II.

2390. *hybrida gigantea*, enkele grootbloemige knolbegonias gemengd . p. pakje f 0.35

2394. „ „ dubbele grootbl. „ „ - 0.60

2400. *Rex*, *Bladbegonia's* in de schoonste soorten gemengd p. pakje f 0.60

2402. *semperflorens*, gemengd „ „ - 0.20

2404. *semperflorens grand. atropurpurea* (*Vernon*),
p. pakje f 0.30

Prachtige met helderoranje getinte karmijnroode bloemen en donkerbronsgekleurde bladeren.

2405. *semperflorens Erfordia* p. pakje f 0.40

2406. „ „ *compacta alba* „ „ - 0.25

Laaggroeiend; prachtig voor randen. Heldere witte bloemen.

2409. *semperflorens Luminosa* p. pakje f 0.50

Deze soort komt veel overeen met *Begonia Vernon*, maar de plant is lossier gevormd.

2410. *Schmidtii*, dankbare winterbloeiër, p. pakje f 0.40

CALCEOLARIA.

De *Calceolaria's* behooren tot de schoonste potplanten. De bloemen komen voor in de meest verschillende en grilligste kleuren. Men zaai van af Juni tot Augustus op dezelfde wijze als de Knolbegonia's en overwinter de plantjes in den kouden vorstvrijen bak. In 't voorjaar kan men ze een weinig warmte geven om ze in Maart reeds in bloei te hebben. Men bescherm de planten voor sterke zonnestralen en houde ze goed vochtig.

2420. *hybrida grandiflora*, getijgerde, eenkleurige en gevlekte grootbloemige prachtsoorten gemengd, H. 30 cM. p. pakje f 0.50

2422. *hybrida nana*, in de schoonste dwergachtige soorten gemengd, H. 15 cM. . . p. pakje f 0.65

2424. *rugosa*, H. 30 cM. „ „ - 0.70
Struikachtige soort met kleinere bloemen, zeer rijkbloeiend en geschikt voor perken.

2426. *rugosa nana*, laaggroeiend, H. 20 cM., p. pakje f 0.50

CANNA.

Men zaai de *Canna's* in den warmen bak; voor de behandeling der zaden leze men onder het hoofd der rubriek „Potplanten." Men zaai in Februari-April en houde de plantjes tot einde Mei onder glas. Bloeitijd Juli-Oct.

2430. *indica*, bruinbladerige soorten gemengd, H. 150 cM.,
p. pakje f 0.20

2432. „ „ *Crozy*, grootbloemige prachtsoorten gem.,
H. 90 cM., p. pakje f 0.25

CELOSIA.

De *Hanekammen* worden half Maart in den warmen bak gezaaid, een paar malen onder glas verspeend en langzamerhand afgehard, waarna men ze in Mei op de perken zet. Men kan ze ook in potten kweken en als ze bloeien in de kamer zetten. Bloeitijd Juni-Aug.

2436. *cristata nana*, lage *Hanekammen* in schoone soorten gemengd, H. 15 cM. . . p. pakje f 0.25
2437. *cristata nana* *Empress*, zeer laag met donker blad en purperroode bloemen . . p. pakje f 0.40
2438. *cristata nana* *coccinea*, lage met vuurroode bloemen, p. pakje f 0.35
2440. *plumosa pyramidalis*, vederachtige *Hanekam* in kleuren gemengd, H. 45 cM . . p. pakje f 0.15

CENTAUREA.

Deze zilverwitte bladplant is onmisbaar voor mozaïekperken. Men zaait haar hetzij in Juli-Aug. of wel in Febr.-Maart onder glas; de plantjes worden in potjes verspeend en in Mei uitgeplant. In het eerste geval moeten ze natuurlijk in den bak worden overwinterd.



Centaurea candidissima.

2444. *candidissima* p. pakje f 0.30

CHRYSANTHEMUM.

De *Chrysanthen* kan men tegenwoordig tot de modebloemen rekenen en daar zij niet alleen bloeien in een jaargetijde dat de bloemen schaarsch zijn, maar ook zulke prachtige bloemen in de meest verschillende kleuren en vormen opleveren, verdienen zij deze aandacht ook ten volle. Ze worden begin Maart in den warmen bak uitgezaaid, op tijd verspeend, in potten geplant en in den zomer op een beschut plekje buiten gezet met de potten in den grond. Om schoone goed-gevulde planten te krijgen, moet men ze op tijd innipen en aan elke stengel behoude men slechts één bloemknop, terwijl men de zijknoppen zorgvuldig verwijdert. In den herfst plaatse men ze in den kouden bak of in de kamer, waar de bloemen spoedig zullen ontkiemen.

2448. *frutescens*, witte *Magariet*. Bloeitijd April-Nov. H. 30 cM., p. pakje f 0.10
2450. *indicum* fl. pl Bloeitijd Oct.-Dec., H. 90 cM., p. pakje f 0.40
- Grootbloemige dubbele *Chrysanthemums* in prachtsoorten gemengd.
2452. *japonicum* fl. pl. Bloeitijd Oct.-Dec., H. 90 cM., p. pakje f 0.40
- Prachtige *Japansche Chrysanthemums* in soorten gemengd.

CINERARIA.

Deze worden in Juni gezaaid in den kouden bak, eenige malen verspeend en in den kouden bak vorstvrij overwinterd. Ze moeten voor scherpe zonnestralen worden beschermd en tamelijk vochtig worden gehouden. Bloeitijd Februari-Mei.



Cineraria hybrida.

2456. *hybrida grandiflora*, grootbloemige prachtsoorten gemengd, H. 30 cM. . . p. pakje f 0.50
2457. „ *hemelsblauw* „ „ - 0.75
2458. „ *grandiflora nana*, grootbloemige dwergsoorten gem., H. 20 cM., p. pakje f 0.60
2459. „ *grandiflora* *Matador*, helder scharlakenrood p. pakje f 1.—
2462. *maritima candidissima* „ „ - 0.10
- Met zilverwit blad, prachtige variëteit.
2465. *radiata hybrida* „ „ - 0.35
- De stervormige bloemen dezer nieuwe *Cineraria* zijn over het algemeen zachter van kleur en bereiken grootere afmetingen dan die van de variëteit *C. stellata*, bovendien hebben zij veel meer weerstandsvermogen, waardoor ze ook als snijbloemen gebruikt kunnen worden. Bizarde schoone potplant.

GLIANTHUS.

De prachtige groote bloemen zitten in trossen van 4 à 6 bij elkaar en hebben eene helderscharlakenroode kleur met een groote zwarte vlek. Men zaait ze Februari-Maart in den warmen bak en verspeend de jonge plantjes zoodra ze opkomen in goed gedraineerde potten. Bij het gieten moet men vooral oppassen de bladeren niet nat te maken. De planten hebben behoefte aan veel licht, lucht en warmte en zijn bang voor veel vochtigheid. Bloeitijd Mei-Juni.

2468. *Dampieri*. p. pakje f 0.50

COLEUS.

De *Coleus*soorten bezitten prachtig gekleurd loof en maken daardoor een zeldzaam mooi effect; ze zijn zeer gemakkelijk uit zaad te kweken.

2474. *hybridus*, prachtige soorten gemengd, H. 60 cM., p. pakje f 0.30

CYCLAMEN.

De *Cyclamen* worden zoo vroegtijdig mogelijk in den warmen bak gezaaid, verspeend en na eenigen tijd de jonge plantjes in potten gezet. In den kouden bak groeien ze het best; men zette ze zoo dicht mogelijk bij het glas, want de planten hebben veel behoefte aan licht en lucht. Bloeit December-April.

2480. „*Papillo*“ *hybridum*, gemengd, p. 25 zaden f 0.60
- De bloembladeren dezer soort zijn aan den buitenrand sierlijk gekruld en getakt. De bloemen zijn schitterend van kleur en dus zeer geschikt voor bouquetten.
2482. *persicum giganteum*, reuzenbloemige prachtsoorten gemengd, H. 15 cM. . . p. 25 zaden f 0.35

CYCLAMEN (vervolg).2483. **Mont-blanc**, zuiverwit . . . p. 25 zaden f 0.352484. **persicum giganteum sanguineum**, H. 30 cM.,
p. 25 zaden f 0.45

De kleur is van het schitterendste donkerrood; zeer schoon.

*Cyclamen persicum giganteum marginatum „Victoria."*2486. **persicum giganteum marginatum Victoria**,
p. 25 zaden f 0.65

Van de Cyclamen, die ontegenzeggelijk tot de schoonste winterbloemen kunnen gerekend worden, werden in de laatste jaren verscheidene nieuwe variëtelten aangeboden. Toch geloof ik, dat deze nieuwigheid alle andere invoeringen overtreft in vorm en kleur der bloemen. Zij is van een krachtigen groei, terwijl de fraai gekleurde bloemen, die in grooten getale verschijnen, sierlijk gefranjeerd zijn. De kleur van het bloemenhart is steeds gelijk aan die van den schoon gekartelden rand der bloembladeren.

DRACAENA (CORDYLINE).

Bekende bladplant. Hoogte 60 cM.

2488. **indivisa** p. pakje f 0.25**EPACRIS.**

Deze plantjes geven eene groote menigte van kleurige bloemen en maken een zeer schoon effect. Ze moeten onder glas gezaaid worden in potten en bloeien reeds vrueg in het voorjaar. Hoogte 30 cM.

2492. **hybrida**, in vele soorten gemengd, p. pakje f 0.30**FRANCOA.**2510. **ramosa hybrida „Brautkranz"** . p. pakje f 0.30

Eene belangrijke verbetering van de bestaande Francoa, waarvan de bloemstengels aanmerkelijk talrijker en ook de bloemen belangrij grooter zijn.

Men zaait ze in juni, overwintert ze vorstvrij in potten, waarna ze in het voorjaar, tegen zware regens besluit, worden uitgeplant. Bloeit juli-Oct. H. 60 cM.

FREESIA.2511. **refracta alba** p. pakje f 0.152512. **hybrida**, gemengd " " - 0.15**FUCHSIA.**

Deze algemeen bekende plant wordt gewoonlijk door stek gekweekt, maar met eenigen zorg kan men haar ook zaaien. Wil men de planten hetzelfde jaar nog in bloei hebben, zoo dient zoo vroegtijdig mogelijk te worden gezaaid onder glas in ondiepe pannen met liechten grond. De plantjes worden in potjes verspeend; later geve men ze langzamerhand grootere potten. Vóór dat de planten voor den winter worden opgeborgen, moeten ze flink worden ingesnoeid. Men kan ze ook buiten in den vollen grond uitplanten en ze 's winters met eikenblad en riet bedekken. De planten sterven dan meestijds tot aan den grond af, maar loopen in 't voorjaar weer uit. Ze bloeien dan later in den zomer.

Bloeitijd Juni Oct. H. 60 cM.

2513. **hybrida**, enkele prachtsoorten gem., p. pakje f 0.60

2514. " dubbele " " " " " - 0.65

2518. **procumbens** " " " " - 0.30

Een prachtige hangplant met karmijnroode bessen.

GESNERIA.

Deze plantjes hebben prachtig fluweelachtig loof en gespikkelde bloemen. Ze zijn verwant aan de Gloxinia's en worden ook evenals deze gekweekt. H. 15 cM.

2522. **hybrida**, gemengd p. pakje f 0.75**GLOXINIA.**

Men zaait de Gloxinia's begin Februari evenals de Begonia's enz., verspen op tijd en houde ze in een matig warmen bak of serre. Voor sterken zonneschijn moet men ze beschutten. Bloeitijd Juni-Aug. H. 30 cM.

2526. **hybrida crassifolia erecta**, met rechtopstaande bloemen in prachtsoorten gemengd, p. pakje f 0.60*Gloxinia hybrida crassifolia „Prinz Adalbert."*2527. **hybrida crassifolia „Prinz Adalbert,"** p. p. f 0.75

De violet-purpere bloemen dezer Gloxinia hebben een sterk afstekenden zuiver witten rand. De planten zijn bijzonder mooi gevormd en uit het stevige, naar beneden omgebogen bladerenrozet staan de bloemen als in een bouquet saamgevoegd, omhoog.

2528. **robusta grandiflora**, Fransche en Belgische prachtsoorten, gemengd p. pakje f 0.60**HELIOTROPIMUM.**

De *Heliotropen* zijn overbekend wegens de heerlijk riekende bloemen. De kweekwijze is zeer eenvoudig; men zaait in Maart in den warmen bak; bloeit Juli-Sept.

2548. **grootbloemige prachtsoorten gemengd**,
p. pakje f 0.30

IMPATIENS.

Deze schoone plant met heldergekleurde bloemen wordt in Maart in den warmen bak gezaaid, verspeend en later in den kouden bak overgebracht of in de kamer geplaatst. H. 30 cM.

2555. **Holstii, nieuwe hybriden** p. pakje f 0.30

De bloemen dezer prachtige nieuwe Impatiens of Oost-Afrikaansche *Balsaminen* zijn 3½. à 4 cM. in doorsnede, alzoo grooter dan die der bekende variëteit *Sultani*, terwijl ook de bloembladen breeder, soms rond zijn. Gewoonlijk bevinden zich 6—8 bloemen gelijktijdig aan den top der bloemtakjes.

De kleur der bloemen is wit met schitterend rood oog, donker violet, schitterend karmijnrood, zacht rose etc. Zeer aanbevelenswaardige plant voor potcultuur en voor beplanting van perken. Zij laat zich gemakkelijk kweken.

2557. **Sultani hybrida**, in vele kleuren gemengd p. pakje f 0.35

LAVATERA.

Deze plant heeft sierlijk gevlekte bladeren en wordt veel gebruikt voor groote perken met *Canna's*, enz. Zij wordt begin Maart in den bak gezaaid, verspeend en einde Mei op de perken geplant.

2560. **arborea fol. var.** p. pakje f 0.15

2562. **trimestris**, rood - 0.15

2564. „ **fl. albo**, wit „ „ - 0.15

LOTUS.

Een zeer schoone hangplant, die in de kas moet gekweekt worden. Ze heeft donkergroen fijn loof en oranjeleurende bloemen, die eenigszins gelijken op die van de *Clianthus*.

2565. **peliorhynchus** p. pakje f 0.35

MEDEOLA.

2568. **asparagoides** p. pakje f 0.15

MIMOSA.

Van dit eigenaardige plantje is algemeen bekend, dat de bladeren zich sluiten en slap neerhangen bij de minste aanraking. Het kan ook niet legen tocht. In April in den warmen bak gezaaid, moet men de plantjes zoo spoedig mogelijk in potten verspenen; later zette men ze in de kamer, den kouden bak of serre. H. 30 cM.

2572. **pudica**, *Kruidje-roer-mij-niet* p. pakje f 0.15

PELARGONIUM.

De *Pelargoniums*, ook ten onrechte *Geraniums* genoemd, worden in Februari in den warmen bak gezaaid en zoodra mogelijk verspeend, hetgeen later nog weer wordt herhaald. Men plant ze nu in potten, en zoodra ze daarin aangeslagen zijn, kan men ze buiten met de potten uitplanten. Ze zullen dan denzelfden zomer nog bloeien. De planten moeten in den kouden bak, serre of kamer worden overwinterd. Men moet ze zooveel mogelijk licht geven. Bloeitijd Mei-Nov.

2598. **hederæfolium fl. pl.**, dubbelbloemig kruipend, p. pakje f 1.—

Bovenstaande soort is ook bekend als klimopbladerige *Hang-Pelargonium* (*Geraniums*), en zijn als hangplanten zeer aan te bevelen.

2604. **zonale**, in de nieuwste prachtsoorten gemengd, H. 45 cM., p. pakje f 0.30

PRIMULA CHINENSIS.

De Chineesche *Primula's* worden in Juni-Juli uitgezaaid in zaaipannen of goed gedraaineerde potten gevuld met een mengsel van oude bladaarde en tuingrond met verteerde koemest en in den kouden bak geplaatst. Zoodra de plantjes eenige blaadjes hebben, zet men ze in potjes en later in grotere potten, die men zoodra het herfst wordt in een half warme serre zoo dicht mogelijk bij 't glas plaats. Bij 't begieten moet men oppassen de bladeren niet nat te maken. H. 20 cM. Bloeitijd Dec.-April.


2620. **fimbriata gemengd**, in enkelbloemige prachtsoorten. p. pakje f 0.40

2632. **gigantea fl. pl. gemengd**, in dubbelbloemige prachtsoorten - 1.—

PRIMULA OBCONICA.

Deze *Primula's* met prachtige groote bloemen, kunnen op dezelfde wijze worden behandeld als de vorige. H. 30 cM.

2636. **grandiflora**, Ronsdorfer hybriden, gemengd, p. pakje f 0.50



Primula obconica grandiflora alba.

2638. **grandiflora alba** p. pakje f 0.50

Schoone witte variëteit, welke voor snijbloemen zeer is aan te bevelen.

2640. **grandiflora fimbriata**, gemengd p. pakje f 0.50

SAINTPAULIA.

Prachtige rijkbloeiende *Gesneriaceae* met helderblauwe bloemen. Deze wordt op dezelfde wijze behandeld als de *Gloxinia's*. Bloeitijd Juli-Oct. H. 15 cM.

2648. **ionantha** p. pakje f 0.60

SALVIA.

Prachtige plant met scharlakenroode bloemen, die in Maart-April in den bak wordt gezaaid en in potten gekweekt. Men kan dezelve in Mei ook buiten zetten en zoodra er vorst te vreezen is, in potten plaatsen in kamer of serre; zij zullen dan nog zeer lang doorbloeien. Bloeitijd Juni-Nov. H. 60 cM.

2652. **splendens Ingénieur Clavenad**, vroeg en rijk-bloeiend p. pakje f 0.25

SCHIZANTHUS.

2654. **Wisetonensis** p. pakje f 0.35

Deze *Schizanthus* heeft een gedrongen pyramidalen vorm. De plant groeit zeer regelmatig en brengt een menigte bloemen voort, die een fraai effect maken in vereeniging met het fijn ingesneden blad. De hoofdkleur der bloemen is wit met rose vlekken, terwijl de bovenlip karmijnrood, geel of bruin is. H. 40 cM.

SOLANUM.

Deze planten worden hoofdzakelijk om de op eieren gelijkende vruchten meer uit curiositeit gekweekt. Bloeitijd Juni-Nov.

2660. **Melongena**, Eierplant met witte vruchten, p. pakje f 0.15

2662. „ „ in gemengde kleuren, p. pakje f 0.15

STREPTOCARPUS.

De groote fraaie bladeren dezer plant liggen meestal vlak op den grond. De bloemstengels, die meestal 8 à 12 bloemen dragen, komen dus flink boven de bladeren uit. De bloemen zijn zeer schoon en gelijken eenigszins op die van Gloxinia's; zij komen in de meest verschillende kleurnances voor. Zij worden op dezelfde wijze gekweekt als de Gloxinia's. Bloeitijd Juni-Nov. H. 20 cM.

2668. *hybridus*, nieuwe hybriden . . . p. pakje f 0.50

TORENIA.

De *Torenia*'s laten zich zeer gemakkelijk kweeken. Zij vormen prachtige potplanten, maar men kan ze, mits vroeg in den bak uitgezaaid en einde Mei uitgeplant, ook op een warm plekje in den tuin kweeken. Bloeitijd Juli-Sept.

2676. *Fournieri compacta*, laag, H. 30 cM., p. pakje f 0.35

2677. *Fournieri compacta grandiflora „Nymphe,”*

p. pakje f 0.40

Schoone nieuwe variëteit van een lagen, gedrongen groei; zij bloeit zeer lang met lichtblauwe bloempjes, waarvan de drie onderste bloemblaadjes eene donker violette vlek hebben. Zij vereischt echter eene gunstige standplaats.

2678. *Fournieri speciosa*, nieuw, zeer grootbloemig,

H. 45 cM., p. pakje f 0.40

VINCA.

De *Vinea* zaait men begin Maart - April in den bak en verspeent ze in potten onder glas. Om mooie gedrongen planten te krijgen, moet men ze een paar malen pinceeren of innipen. Bloeitijd Juni-Oct. H. 30 cM.

2688. *rosea*, gemengd p. pakje f 0.20

Zaden van twee-jarige en overblijvende planten.

Van de meer dan 2-jarige of vaste planten zijn er velen die wel uit zaad *kunnen* worden gekweekt, maar eene groote menigte die slechts met de uiterste zorg en moeite, waarbij tevens eenige vakkennis een vereischte is, eenig resultaat opleveren. Vele soorten zijn er ook waarvan het zaad zeer langzaam ontkiemt, ja zelfs eerst het tweede jaar opkomt.

Juist om dus teleurstellingen te voorkomen heb ik in de onderstaande rubriek alleen die zaden opgenomen, die niet al te moeilijk te kweeken zijn en die dus kans van slagen hebben. Waar ik geen nadere beschrijving heb gegeven, kan men die vinden onder de afdeling II Vaste Planten. De meeste worden in Mei of Juni gezaaid, en bloeien dan een volgenden zomer. Sommigen bloeien nog het eerste jaar, indien ze vroeg en onder glas worden gezaaid.

De met een † gemerkte soorten zijn geschikt voor snijbloemen; de soorten gemerkt met een * zijn geschikt voor randen; de soorten gemerkt met t zijn tweejarig.

2690. t *ALTHÆA rosea fl. pl.* p. pakje f 0.25

Dubbele Chaters prachtsoorten in kleuren gemengd. De *Stokrozen* leenen zich uitmuntend tot het aanplanten langs groote heesterperken. In Engeland ziet men ze zeer veel; in ons land worden ze echter lang niet genoeg gewaardeerd. Men zaait ze half Juni en plant ze uit einde September.

2692. *ALYSSUM saxatile compactum* p. pakje f 0.25



Aquilegia.

2694. † *AQUILEGIA chrysantha*, goudgeel . . . p. pakje f 0.30

2698. † „ „ *hybrida*, in soorten gemengd - 0.30

2700. † „ „ *Skinneri*, oranje-rood . . . - 0.35



Bellis perennis fl. pl.

2704. * *BELLIS perennis fl. pl.*, gemengd . . . p. pakje f 0.25

2706. * „ „ „ „ *Sneeuwbal* . . . - 0.30

2708. t† *CAMPANULA Medium*, enkele in kleuren gemengd, p. lood f 0.40 - 0.10

2710. t† „ „ *Medium rosea*, enkele rozerode, p. lood f 0.50, - 0.15

2712. t† „ „ *Medium fl. pl.*, dubbele in kleuren gemengd p. pakje f 0.20

Deze *Campanula*'s worden in Engeland veel gekweekt en daar *Canterbury Bells* genoemd. Ze worden in Juni gezaaid, gedund en voor den winter met eenige ruigte bedekt. In 't voorjaar plant men ze op de perken.

2714. t† *CAMPANULA Medium calycanthema*, p. pakje gemengd f 0.20

2716. †**CAMPANULA persicifolia grandiflora** *p. pakje*
alba (Backhousei) f 0.25

2718. †**CAMPANULA persicifolia grandiflora**
coerulea - 0.25

2724. †† " **pyramidalis** - 0.25
 Ongeveer 1.50 M. à 2 M. booggroeiende variëteit met dichte hart-
 vormige bladeren. De schoongevormde klokvormige bloemen zijn
 van een bleekblauwe kleur. Men zaait in het voorjaar en overwintert
 ze in potten in koude kas of bak.

2726. ††**CAMPANULA pyramidalis alba**, witte
variëteit f 0.25

2728. ††**CHAMAEPSEUCE dliacantha**, *Ivoordistel*. - 0.20
 Het eerste jaar wordt deze plant gewoonlijk als bladplant gebruikt
 terwijl ze het tweede jaar een eigenaardigen bloemstengel voort-
 brengt met purperen bloemen. Men zaait vroeg in 't voorjaar.

2730. †**CHRYSANTHEMUM LEUCANTHEMUM HYBRI-**
DUM „Frühlingsmarguerite“ . *p. pakje* f 0.20

Door haren vroegen, rijken bloei maakt deze Margariet eene uit-
 zondering op alle reeds bestaande soorten. Half Mei staat zij reeds
 in vollen bloei, terwijl dan aan geen der andere soorten ook maar
 een enkele bloem te vinden is.

De bloemen hebben een doorsnede van 8 cM. en staan op lange dunne,
 doch stevige stengels. Bij uitstek geschikt voor de moderne binderij.



Chrysanthemum Leucanthemum hybridum
 „Frühlingsmarguerite.“

2732. †**CHRYSANTHEMUM maximum** *p. pakje*
 f 0.15

2734. † " **lacini-**
tum witte Comeet-marguerite - 0.40

Een nieuwe Marguerite welke zich door haren lossen, eleganten
 vorm van alle andere soorten onderscheidt. De vederachtig inge-
 sneden bloembladeren bedekken min of meer het gele hart en geven
 de bloemen hierdoor een bevallig aanzien. De plant groeit ongeveer
 1 Meter hoog en brengt in Augustus een menigte groote bloemen
 voort, welke op stevige, lange stengels zijn gezeten. Onschatbaar
 voor groote vaasbouquetten.

p. pakje
 2736. †**COREOPSIS grandiflora** f 0.15

2738. ††**DIANTHUS barbatus**, *Duizendschoonen*,
 enkele in de schoonste kleuren gemengd,
p. lood f 0.30 - 0.10

2740. ††**DIANTHUS barbatus fl. pl.**, *Duizendschoo-*
nen, extra dubbele grootbl. in
 de schoonste soorten gemengd,
p. lood f 0.75 - 0.20

2741. †**DIANTHUS Caryophyllus fl. pl.**, *Dubbele*
Anjelier, in extra schoone *per*
 soorten gem., zaden van onder *25 zaden*
 glas gekweekte prachtplanten, f 0.45

2742. † " **Caryophyllus fl. pl.**, gewone *p. pakje*
 dubbele, in vele kleuren gem. f 0.25

2743. † " **Caryophyllus fl. pl.**, *Remon-*
tant of doorbloeiende Anjelier,
 gemengd . . . *per 25 zaden* - 0.30

2744. † " **Caryophyllus Marguerite**,
geel en geelgrondige gemengd - 0.30

2745. † " **Caryophyllus Marguerite**,
zuiver wit - 0.30

2746. † " **Caryophyllus Marguerite**,
rosa - 0.30

2747. † " **Caryophyllus Marguerite**,
scharlaken - 0.30

2748. † " **plumarius fl. pl.**, *dubb. Gras-*
Anjelier, in schoone kleuren
 gemengd - 0.25

2750. † " **plumarius nanus fl. pl.** - 0.25

Een zeer vroegbloeiende dubbele Gras-Anjelier met een lage ge-
 drongene groeiwijze en prachtige kleurschakeering. *p. pakje*

2752. ††**DIGITALIS gloxiniaeflora**, gemengd . . . f 0.15



Gerbera Jamesonii hybriden.

2758. †**GERBERA Jamesonii hybriden**, *p. 20 zaden* f 0.60

Was reeds de oorspronkelijke Gerbera door haar edelen vorm en
 frissche kleuren een sieraad onder de langstellige snijbloemen, deze
 nieuwe hybriden bieden met haar menigvuldige kleurschakeeringen
 en belangrijk grootere bloemen een onschatbaar materiaal voor lijne
 bouquetten, temeer daar zij afgesneden zeer lang goed blijven. De
 bloemen hebben den vorm eener Margariet en komen voor in bijna
 alle kleuren van wit, geel, oranje, zalmkleur, rose, kersrood en violet.
 De krachtige bloemstengels zijn 40-50 cM. lang en komen flink boven
 de zwaardvormige, donkergroene bladeren uit. De planten zijn over-
 jaarig, maar zij moeten gedurende den winter tegen strenge vorst en
 aanhoudende vochtigheid worden beschermt in koude bak of serre.

*Primula malacoides alba.*2814. **REHMANNIA augulata** *p. pakje* f 0.25

Deze uit China ingevoerde plant, vormt ongeveer 1 Meter hooge smalle pyramiden met sierlijke, veelal aan de onderzijde roodgetinte bladeren, in de oksels waarvan de talrijke op *Incarvillea Delavayi* gelijkende bloemen verschijnen van eene eigenaardige wijnroode kleur met gele strepen en purperblauwe vlekken. Zeer fraaie plant voor een beschutte plaats in den tuin, alsmede voor potcultuur in degematigde kas.

*p. pakje*2818. **SALVIA argentea**, met wit blad f 0.102820. †**THALICTRUM adianthifolium** - 0.152822. **VIOLA CORNUTA**, gemengd - 0.202824. " " **alba** - 0.202826. " " **Zwarte Prins**. - 0.402828. " " **Thurlingen**, donkerblauw
met wit oog - 0.402830. " **ODORATA semperflorens**, Bosch
viooltje - 0.25

Dit welriekend viooltje, ook wel Maartsch viooltje genoemd, is in het voorjaar een voorbode van de lente, terwijl laat in het najaar de bloemen zich ook vertoonen. Het bemint een half beschaduwde standplaats. Het zaad moet een jaar in den grond liggen alvorens het kiemt.



Collectie eigengewonnen Zaden van vaste en overblijvende planten.

De beschrijving dezer soorten vind men in Afdeeling II. **Vaste planten.**


	<i>p. pakje</i>		<i>p. pakje</i>
2832. † ACONITUM Napellus	f 0.15	2864. † CIMICIFUGA (Actaea) racemosa	f 0.20
2833. † " Wilsoni	- 0.20	2870. CODONOPSIS ovata	- 0.25
2834. ANEMONE pulsatilla alba , (<i>White Swan</i>), <i>p. lood</i> f 0.60, -	0.10	2872. † DELPHINIUM hybridum , prachtmengsel , van de <i>beste</i> en <i>nieuwste</i> enkele en dubbele soorten <i>p. lood</i> f 0.60, -	0.15
2836. " " rubra , (<i>pratenso Kew</i>), <i>p. lood</i> f 0.60, -	0.10	2873. † DELPHINIUM sinensis	- 0.35, - 0.15
2838. † ANTHERICUM liliastrum giganteum	- 0.20	2874. † " " cineraria coeruleum	- 0.25
2839. † AQUILEGIA Heidenae	- 0.25	2875. † " " fl. albo , <i>p. lood</i> f 0.35, -	0.15
2840. † " nivea grandiflora , <i>p. lood</i> f 0.25, -	0.10	2876. † DICTAMNUS caucasicus " "	- 0.25, - 0.10
2842. ARABIS alpina	- 0.15	2877. † " fraxinella " "	- 0.40, - 0.15
2850. † ASTILBE Davidii	- 0.15	2878. † " " albus <i>p. lood</i> - 0.25, -	0.10
2852. BIDENS Dahlifolides	- 0.15	2883. † ECHINACEA (Rudbeckia) purpurea	- 0.20
2854. † CAMPANULA lactiflora . . <i>p. lood</i> f 0.60, -	0.10	2884. EREMURUS himalaicus	- 0.20
2856. † " macrantha	- 0.25, - 0.10	2886. ERICA cineraria , in <i>prachtsoorten</i> gemengd -	0.30
2858. † " " alba , " "	- 0.40, - 0.10	2888. " vagans alba	- 0.30
2860. " (<i>Platycodon</i>) Mariesi , gemengd -	0.20		

		p. pakje			p. pakje
2890.	†ERYNGIUM alpinum . . .	p. lood f 0.60,	2962.	†MALVA moschata alba . . .	f 0.15
2891.	† „ giganteum . . .	„ „ - 0.30,	2964.	OROBUS lathyroides . . .	- 0.15
2892.	† „ Bourgatl . . .	„ „ - 0.25.	2966.	„ varius . . .	- 0.15
2896.	†FUNKIA Thos Hogg . . .	- 0.15	2972.	†PHLOX decussata, prachtsoorten ge-	
2898.	†GAILLARDIA maxima, prachtmengsel van			mengd.	p. lood f 0.75 - 0.20
	de mooiste nieuwere soorten	- 0.15	2978.	PRIMULA Bulleyana	- 0.25
2902.	†GEUM atro-sanguineum fl. pl.	- 0.15	2980.	„ Cashmeriana (denticulata)	
2904.	† „ coccineum, Mrs. J. Bradshaw . . .	- 0.25		alba	- 0.40
2912.	†GILLENIA trifollata . . .	p. lood f 0.60 - 0.15	2982.	„ luteola	- 0.25
2918.	HELIANTHELLA quinquenervis	- 0.25	2988.	† „ rosea grandiflora	- 0.20
2930.	INCARVILLEA Delavayi . . .	p. lood f 0.60 - 0.15	2992.	„ veris elatior, gemengd,	
2932.	„ grandiflora, „ „ - 0.75	- 0.20		p. lood f 0.75	- 0.15
2934.	„ „ Brevipes . . .	- 0.25	2994.	RODGERSIA tabularis	- 0.30
2944.	†LIATRIS spicata	p. lood f 0.60 - 0.15	2996.	†SCABIOSA caucasica	- 0.25
2946.	†LUPINUS polyphyllus, blauw,		2998.	† „ „ alba p. lood f 1.—	- 0.30
	p. kilo f 3.—, p. ons f 0.50, p. lood f 0.10		3004.	SENECIO clivorum	- 0.15
2948.	†LUPINUS polyphyllus albus,		3008.	„ Wilsonianus	- 0.15
	p. kilo f 4.—, p. ons f 0.60, p. lood f 0.10		3012.	†SIDALCEA Rosy Gem.	- 0.15
2950.	†LUPINUS polyphyllus Moerhelml,		3020.	†THALICTRUM aquilegiaefol. album . .	- 0.20
	p. lood f 0.60	- 0.15	3022.	† „ „ purpureum	- 0.20
2952.	†LYCHNIS chalconica	- 0.15	3026.	† „ dipterocarpum	- 0.30
2956.	†LYTHRUM roseum superbum	- 0.15	3042.	†TROLLIUS Ledebouri	- 0.25
2960.	†MALVA moschata rosea, p. lood f 0.30	- 0.10	3048.	† „ pumilus Yunnanensis . . .	- 0.25

AFDEELING II.

Overblijvende Planten, Bol- en Knolgewassen.

A. Planten voor den Moestuin.



Asperie.

Asperie van Argenteuif.

p. 10 st. f 0.40, p. 100 st. f 3.50

Uitmuntende verscheidenheid, welke reeds zeer vroeg prachtige dikke asperges oplevert. In de omstreken van Parijs wordt deze bijna uitsluitend gebruikt.

Over de kultuur der Asperie zie onder Afdeeling I, A. Groentezaden, blz. 2.

Dragon, echte overblijvende p. st. f 0.25

Het jonge loof levert een zeer smakelijk toekruid bij salade en is voór den inmaak van Augurken enz. onmisbaar.

Lavendel p. st. f 0.20

Plant met zeer geurige bladeren en bloemen, welke somtijds als kruidrij wordt gebruikt. In Engeland worden de gedroogde bloemstengels met violet blauwe bloemen veel tussehen linnengoed gelegd, om daaraan een aangename geur te geven.

Lieve-Vrouwe-Bedstroo . . . p. st. f 0.15, p. 10 st. f 1.—

Welriekend plantje, dat veel wordt gebruikt om Meiwijn of Rijnwijnbowl te kruiden.

Majoraan p. st. f 0.15

Men gebruikt de blaadjes dezer plant om eenige spijsen mede te kruiden, zooals erwten, boonen, visch, enz.

Mierikswortel p. st. f 0.15

Deze wordt veel gebruikt bij het inmaken van Augurken, enz.

Rabarber Challenge p. st. f 0.20

Aanbevelenswaardige variëteit met vele prachtige zware roode stengels van een uitmunten smaak.

Saile p. st. f 0.15, p. 10 st. f 1.—

Zuring, breedbladerige, p. 10 st. f 0.50, p. 100 st. f 3.—

Knolbegonia's.



Knolbegonia's.

De Knolbegonia's worden direct na ontvangst uitgepakt en op een droge koele en vorstvrije plaats tot half Maart bewaard. Men plant ze tegen dien tijd bij voorkeur in een lauw warmen bak om ze eerst te laten uitloopen. Ook kan men ze voor dat doel in potten zetten in de warme kamer. Einde Mei of begin Juni worden ze op de perken uitgeplant, die eerst goed van meststoffen moeten voorzlen zijn. Op lichten zandgrond moeten zij bij droog weder des avonds worden gegoten.

N.B. Het is wel eens gebeurd, dat ik klachten kreeg dat de Knolbegonia's niet uitliepen. Daar ik echter steeds

goede gezonde knollen aflever, moet de oorzaak worden gezocht in een verkeerde behandeling. Zelfs heb ik al eens gezien, dat de knollen onderstboven geplant waren.

	p. 100 st.	p. 10 st.
Enkelbloemige, in vele kleuren gem. . .	f 5.—	f 0.60
" op kleur	- 6.—	- 0.70
Dubbelbloemige, in vele kleuren gem. .	- 6.—	- 0.70
" op kleur	- 7.—	- 0.80
Crispa (met gekrulde bloembladen) in		
vele kleuren gemengd	- 7.—	- 0.80
op kleur	- 8.—	- 0.90

van vroegere jaren vervangen. In plaats van een bonte mengeling van bloemen met veel geduld op stokjes of ijzerdraadjes bijeen gebonden, ziet men nu in de fraaie uitstallingen der bloemenwinkels onzer steden bloemwerken, waarin elke bloem of tak tot haar recht komt. Ook hierin hebben de Vaste planten een groote rol gespeeld. Van het vroege voorjaar tot laat in den herfst kan hij, die eene met zorg gekozen collectie Vaste planten heeft, naar hartelust bloemen snijden, waarvan vele met lange stengels en sierlijke bladeren. Met hoe weinig kosten kan men zijn huiskamer steeds met bloemen versieren! Men plaatse niet te veel soorten in een vaas bijeen. Welk een heerlijk effect maakt b.v. niet een vaas met een handvol *Delphiniums*, of *Pyrethrums*, of *Helianthus* in diverse soorten.

Waar deze planten zich op zooveel verschillende wijzen laten gebruiken, behoeven ze verder weinig aanbeveling, te meer, daar de prijs ze binnen het bereik van iedereen stelt.

Hoewel ze niet veel eischen stellen, wat de cultuur betreft, is het raadzaam den grond voor het planten flink diep om te spitten en van meststoffen te voorzien. Indien men vóór den winter plant, moet men ze met een weinig stroo of ruigte voor de felle koude of voor het opvriezen bedekken, met uitzondering van die soorten, welke in den winter het blad behouden, zooals b.v. *Arabis*, *Aubrietia*, *Campanula persicifolia*, enz., daar deze onder de bedekking zouden verrotten. Wil men veel bloemen hebben, dan moet men na een paar jaren weer mesten. Ook vergete men niet, dat daar waar ze in de nabijheid van hooge boomen staan, deze altijd min of meer den grond uitputten.

Behalve eenige uitzonderingen, waarbij dit vermeld is, kunnen alle hieronder aangeboden planten zonder de minste bedekking in den vollen grond overwinteren. Voor den rijkeren bloei van vele soorten, vooral die waarvan de bladeren in 't najaar afsterven, is het goed ze gedurende den winter met een dun laagje blad of stroo te bedekken.

De verzending der Vaste planten geschiedt bij open weder in Maart, April en de eerste helft van Mei; voorts in de maanden Augustus en September. De beste tijd van planten is ongetwijfeld in het voorjaar, met uitzondering evenwel van de zeer vroeg bloeiende soorten, die bij voorjaarsplanting het eerste jaar niet zoo rijk zullen bloeien; het tweede jaar zal echter de bloei des te rijker zijn.

N.B. Op verzoek wordt gaarne uitvoerig advies gegeven omtrent den aanleg van borders, boordbedden of vaste plantenrabatten en de behandeling daarvan.



Een veld met Vaste Planten in de Koninklijke Kweekrij „Moerheim.”

VASTE PLANTEN EN ROTSPLANTEN.

De nieuwe en meest aanbevelenswaardige soorten zijn onderstreept.

Om de keuze der soorten gemakkelijk te maken, heb ik bij de meeste planten den bloeitijd benevens de hoogte aangegeven. Deze laatste kan niet anders dan bij benadering worden bepaald, daar het afhankelijk is van den aard en de kwaliteit van den grond en vele planten eerst haar normale hoogte bereiken een jaar of langer nadat ze geplant zijn. De soorten welke met een † zijn aangeduid, zijn bijzonder geschikt voor snijbloemen; die met a gemerkt, verdienen aanbeveling voor rotspartijen of steengroepen.

aAcaena Buchanani p. st. 0.15

Varenachtig, groenblijvend, zodevormend plantje, dat den grond met een mosachtig tapijt bedekt.

Acanthus spinosus (70 cM.) p. st. f 0.15

Met groote bladeren en van stekels voorziene stelen.

BLOEITIJD.

Juli-Aug. *Achillea Eupatoria* (85 cM.) . . p. st. f 0.15

Met schitterende goudgele vlakke bloemschermen op stevige stengels.

Juli-Aug. *Achillea Eupatoria Parker's var.* (85 cM.),
p. st. f 0.15

De bloemschermen van deze variëteit zijn eveneens goudgeel en eenigszins gebogen.

Juli-Aug. †*Achillea Millefolium Cerise Queen* (50 cM.),
p. st. f 0.15

Met fijn ingesneden bladeren en fraaie kersroode bloemen.

Juli-Aug. †*Achillea Millefolium Kelwayi* (50 cM.),
p. st. f 0.15

Een nieuwe variëteit met schitterend donker karmijn-roode bloemen.

Juli-Aug. †*Achillea Ptarmica fl. pl* (60 cM.), p. st. f 0.15

Met een menigte dubbele sneeuw witte bloempjes op stevige stengels.

Juli-Aug. †*Achillea Ptarmica grandifl. fl. pl.* (75 cM.),
p. st. f 0.15

Evenals de vorige met een massa dubbele witte bloemen, die grooter zijn dan van de vorige variëteit.

Aug.-Oct. *Aconitum autumnale* (90 cM.) p. st. f 0.10

Herfst-Aconitum met prachtige donker paarsachtig-blauwe bloemen.

Juli-Aug. †*Aconitum Californicum* (80 cM.), p. st. f 0.10

Sept.-Oct. †*Aconitum Fisheri* „ „ - 0.15

Met donkergroen blad, dat zoo glanzig is, alsof liet steeds met een doorschijnende vloeistof overgoten is. Zij groeit slechts 50 cM. hoog en brengt laat in den herfst een korte bloemstengel voort met groote helder-blauwe bloemen.

Juli-Sept. *Aconitum japonicum* (80 cM.) . p. st. f 0.15

Lichtblauw met purper.

Aug.-Oct. *Aconitum lycocotum pyrenaicum* (90 cM.),

Variëteit met zwavelgele bloemen. p. st. f 0.20

Juli-Aug. †*Aconitum Napellus* (100 cM.) „ „ - 0.10

Met helderblauwe bloemen.

Juli-Aug. †*Aconitum Napellus album*, wit (90 cM.)
p. st. f 0.10

Bovenstaande schoone sierplanten hebben geheel dezelfde groeiwijze. Ze worden ook „Monnikskap" genoemd.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

BLOEITIJD.

Juli-Aug. †*Aconitum Napellus bicolor* (variegatum)
Blauw met wit. (90 cM.), p. st. f 0.10

†*Aconitum rostratum fl. coerulea* (130 cM.),
p. st. f 0.15

Nieuwe variëteit met lichtblauwe bloemen.

Sept.-Oct. †*Aconitum Spark's Var.* . . . p. st. f 0.15

Zeldzame plant van 1.50 M. hoogte; de donkerste van alle.

Sept.-Oct. †*Aconitum Stoerkianum* (120 cM.), p. st. f 0.10

Prachtige plant met diepblauwe bloemen aan lange stengels.

Aug.-Sept. *Aconitum volubile* (130 cM.) . p. st. f 0.15

Sept.-Oct. †*Aconitum Wilsoni* „ „ - 0.30

Nieuwe, uit China afkomstige, 5 tot 6 voet hooggroeiende Aconitum, met groote lichtblauwe en violet gekleurde bloemen. De bloei begint in September en nadat de hoofdstengel uitgebloeid is, geven haar laag geplaatste vertakkingen nog tot het eind van October een menigte nieuwe bloemen.

Actaea, zie *Cimicifuga*.

April-Mei. *aAdonis amurensis* (25 cM.) . p. st. f 0.45

Zeldzame plant met fijn ingesneden blad en groote gsele bloemen.

Mei. *aAdonis amurensis fl. pl.* (25 cM.) . p. st. f 0.25

Dubbele variëteit der voorgaande.

April. *aAdonis pyrenaica* (45 cM.) . . . „ „ - 0.55

Deze plant heeft veel overeenkomst met *A. vernalis*, maar zij groeit forscher en de bloemen zijn veel grooter.



Adonis vernalis.

BLOEITIJD.

April-Mei. *aAdonis vernalis* (30 cM.) . . p. st. f 0.15

De bloemen dezer zeer vroegbloeiende plant zijn glanzend geel; zij steken fraai af tegen de fijn ingesneden groene bladen.

BLOEITIJD.

Juni-Sept. *Agapanthus umbellatus* fl. albo, wit, p. st. f 0.10

Bovenstaande sierplant heeft lange, smalle bladeren en zeer fraaie bloempluimen. Men plaatst ze veel in kuipen. 's Winters moeten ze op een vorstvrije plaats of in den kouden bak of oranjerie worden bewaard.

Ajuga reptans atro-purpurea p. st. f 0.15

a " " fol. arg. var., " " - 0.15

Deze beide laaggroeiende bladplanten zijn zeer geschikt voor blijvende mozaïekvakken. De bladeren der eerste zijn donkerbruin, die der andere zilverbont.

Juli-Sept. † *Aistroemeria aurantiaca* (75 cm.) p. st. f 0.10

Een in 't oog loopende plant met schitterend oranje bloemen; zeer geschikt voor snijbloemen. Het eerste jaar na de planting moet zij wat gedekt worden.

Mei. a† *Alyssum saxatile citrinum* (25 cm.) p. st. f 0.15

Rijkbloeiend met zwavelgele bloemen.

Mei. a† *Alyssum saxatile* fl. pl., (20 cm.) p. st. f 0.15

Dubbelbloemige *Alyssum* met een massa schoone ronde, geel gekleurde bloemen. Evenals de vorige geschikt voor rotspartijen en randen.

Aug.-Sept. *Amsonia saicifolia* (40 cm.), blauw, p. st. f 0.25

Juli-Sept. *Anchusa italica Dropmore* var., p. st. f 0.15

Nieuw ingevoerde plant, die door haar hard blauwe bloemen en mooi donker groen zeer de aandacht trekt. Zij wordt ongeveer 125 à 150 cm. hoog en vormt een forschen breeden struik.

Juli-Sept. *Anchusa italica Opai* (150 cm.) . p. st. f 0.15

De bloemen dezer variëteit zijn van een lichter blauw dan die der *Dropmore* var.

Juli-Sept. *Anchusa italica Pride of Dover* (150 cm.) p. st. f 0.20

Nieuwe variëteit met donkerblauwe bloemen.

a *Anchusa myosotidiflora* p. st. f 0.15

Een nieuwe plant uit den Kaukasus, met hartvormige bladeren, waaruit in April-Mei op sterke stelen de fijne vergeet-mij-niet-achtige bloemen van mooie blauwe kleur te voorschijn komen.

Goede plant voor „borders” en rotspartijen, die ook in de halfschaduw nog goed gedijt.

April-Mei. a *Anemone alpina sulphurea* (20 cm.), p. st. f 0.35

Gele vroegbloeiende Alpen-Anemoon.

Maart-April. a *Anemone appennina coerulea* (10 cm.), p. st. f 0.15

Met blauwe bloempjes; moet in het najaar geplant worden.

a *Anemone balcalensis* (30 cm.) p. st. f 0.30

Mei-Juni. a *Anemone dichotoma* (30 cm.) . " " - 0.25

Lief voorjaarsplantje met zuiver witte bloemen.

Aug.-Sept. *Anemone hupehensis* (50 cm.), p. st. f 0.15

Komt veel overeen, zoowel wat groeiwijze als bloei betreft met de Herfst-anemonen, alleen bloeit zij veertien dagen vroeger. De kleur is wijnrood.

Sept.-Oct. † ANEMONE JAPONICA.

(60 à 90 cm.)

(Herfst-Anemonen.)

Onder de najaarsbloeiers kunnen de Herfst-Anemonen zonder twiifel tot de schoonste planten worden gerekend. Zij groeien in bijna elken grond en brengen een menigte bloemen voort op een tijdstip, dat er anders buiten niet veel bloemen zijn. De stevige

grootte bloemen zijn goed bestand tegen koud en guur weer en zelfs eenige nachtvorsten schaden haar niet. Wanneer men een zacht najaar heeft, kan men dikwijls nog in November bloemen van deze schoone planten snijden.

Ze moeten gedurende den winter met eenige ruigte worden gedekt.

A. japonica Alice p. st. f 0.15

Belangrijke verbetering der variëteit *Königin Charlotte*, met bloemen van een frissche karmijnroode kleur met lilarose centrum.

A. japonica Coupe d'Argent p. st. f 0.10

Witte variëteit met kelkvormige halfdubbele bloemen.

A. japonica Géante des Blancs p. st. f 0.20

Prachtvolle nieuwigheid met zeer grootte zilverwitte halfdubbele bloemen op stevige 90 cm. hoge bloemstengels. De mooiste van de witbloeiende.

A. japonica Honorine Jobert (alba) wit, p. st. f 0.10

Gewone witte Japansche Anemone. Zeer losse en elegante groeiwijze.

A. japonica Königin Charlotte p. st. f 0.10

Deze brengt grootte halfdubbele bloemen voort, die op lange stengels zijn gezeten en aan de achterzijde lila-rood gekleurd zijn. Zij groeit 75 cm. hoog.

A. japonica Kriemhilde p. st. f 0.30

De schaaivormige halfdubbele bloemen zijn van een opvallend helder roode kleur.

A. japonica Lady Ardilaun p. st. f 0.15

Grootbloemig wit met stevige bloembladeren.

A. japonica Lord Ardilaun p. st. f 0.10

De bloemen dezer verscheidenheid zijn groot, stevig en halfdubbel, van binnen sneeuwwit en aan de buitenzijde violetachtig. Zij bloeit rijk, heeft eene gedrongen groeiwijze en donkergroene bladeren.

A. japonica Loreley p. st. f 0.15

Nieuwe variëteit met halfdubbele, schaaivormige bloemen van een lila-rose kleur, iets donkerder dan *Königin Charlotte*.

A. japonica Mont Rose p. st. f 0.15

De bloemen dezer variëteit zijn goed gevuld en bereiken een middellijn van 9 cm. De kleur is zacht-rose, terwijl de uiteinden der bloembladeren evenals die der bloemknoppen karmijn-rose zijn.

A. japonica Prinz Heinrich p. st. f 0.20

Deze heeft een lage, gedrongene groeiwijze en geeft grootte halfdubbele, donker roode bloemen. De donkerste der Herfst-Anemonen.

A. japonica rosea superba, grootbl. rose, p. st. f 0.15

" " rubra " " - 0.15

Oorspronkelijke soort met donkerroode bloemen, waar uit de variëteiten zijn ontstaan.

A. japonica Whirlwind p. st. f 0.10

Deze verscheidenheid kenmerkt zich door grootte zuiver witte ingesneden bloemen, welker bloembladeren eenigszins gedraaid zijn.

BLOEITIJD.

April-Mei. a *Anemone nemorosa Robinsoniana* (15 cm.) p. st. f 0.20

Prachtige grootbloemige voorjaars-Anemoon, met helder lilakleurige bloemen. Men plante deze liefst in het najaar.

Maart-Mei. a *Anemone Pulsatilla* (20 cm.) p. st. f 0.10

De grootte blauwe bloemen verschijnen reeds voor de bladeren.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "

BLOEITIJD.

Maart-April. *aAnemone Pulsatilla alba* . p. st. f 0.15

Prachtige helderwitte variëteit. Zij komt het best tot haar recht op een zonnige standplaats en op eenigszins kalkachtigen grond en wordt ongeveer 20 cm. hoog.

Maart-April. *aAnemone Pulsatilla rubra* (20 cm.),
p. st. f 0.20

Nieuwe, zeldzame bruinroode variëteit.

Mei-Juni. *a†Anemone sylvestris fl. pl.* (45 cm.),
p. st. f 0.30

Deze draagt op lange stengels prachtige dubbele zuiver witte bloemen.

Aug. *Anemonopsis marophylla* p. st. f 0.70

Uit Japan ingevoerde vaste plant, met groote schaalvormige bloemen van een heerlijk violette kleur, welke aan een *Campanula* doen denken. Deze prachtige, ongeveer 75 cm. hoge plant verlangt een beschaduwde standplaats.

aAntennaria tomentosa candida, p. 100 st. f 5.—,
p. st. f 0.10

Kruipend plantje met glanzend wit blad, dat vooral in mozaïekvakken een schoon effect maakt.

aAnthemis alzoön p. st. f 0.35

a „ *cuplana* „ „ - 0.30

Juli-Sept. *†Anthemis E. C. Buxton* (45 cm.), p. st. f 0.25
Nog vrij zeldzame plant met licht gele bloemen.

Juni-Juli. *†Anthericum liliastrum giganteum* (90 cm.),
p. st. f 0.20

Prachtige plant met lange stengels, waarop mooie zuiverwitte lelieachtige bloemen; grootbloemig.

Mei-Juni. *†Anthericum liliastrum major* (80 cm.),
p. st. f 0.10

De prachtige zuiverwitte bloemen dezer plant doen veel denken aan die der bekende witte Lelies. Zij groeit het best in een eenigszins zandigen, humusrijken grond.

†Antholyza paniculata major p. st. f 0.15

De bloemen en bladeren dezer plant hebben veel overeenkomst met de *Montbretia*'s, maar de groeiwijze is forscher. Heeft eenige bedekking nodig.

Juni-Juli. *†Aquilegia Helenae* (60 cm.) . . p. st. f 0.25

Aanbevelenswaardige *Aquilegia*, welke zich krachtig ontwikkelt en rijk bloeit. Bloem prachtig donker blauw met wit hart.

Mei-Juni. *†Aquilegia hybriden* (60 cm.) . p. st. f 0.20

De *Aquilegia*'s kunnen tot de schoonste voorjaarsbloemen gerekend worden. Zij komen in verschillende kleuren-nuances voor.

Juni-Aug. *†Aquilegia nivea grandiflora* (60 cm.),
p. st. f 0.15

Deze is zuiver wit en bloeit iets later dan de andere *Aquilegia*-soorten.

April-Mei. *a†Arabis alpina* (15 cm.) . . . p. st. f 0.10

Lief alpenplantje met fraaie witte bloemen. Een der vroegste voorjaarsbloemen.



Arabis alpina fl. pl.

BLOEITIJD.

April-Mei. *†Arabis alpina fl. pl.* (25 cm.) p. st. f 0.15

De dubbele zuiverwitte bloemen zijn op stevige losse stengels gezeten en gelijken veel op zomerviolieren. Deze plant bloeit reeds in April en is daardoor onschatbaar voor bouquetwerk. Het is eigenaardig, dat deze dubbele variëteit veel langer en steviger bloemstengels geeft dan de bekende enkele.

April-Mei. *a†Arabis alpina fol. var.* (15 cm.),
p. st. f 0.15

Variëteit met zilverbonte bladeren, die ook dikwijls gedurende den winter haar kleur behouden.

April-Mei. *Arabis alpina nana compacta grandiflora*
(15 cm.), p. st. f 0.15

Deze variëteit onderscheidt zich door een lage gedrongen groeiwijze en de zeer groote sneeuw Witte bloemen.

Mei-Aug. *aArabis Sturli* (10 cm.) p. st. f 0.25
Laagblijvende plant met witte bloemen.

aArenaria caespitosa p. st. f 0.15

Lief geelachtig groen zodenvormend; dit kruipende plantje is zeer geschikt voor mozaïekvakken.

aArenaria rotundifolia „ „ - 0.25
Aardig witbloeiend kruipend rotsplantje.

Juni-Juli. *aArmeria alpina* (15 cm.) . . . „ „ - 0.15

Alpenplantje met roode bloemhoofdjes, welke op stevige stengels zijn gezeten. Dichte zoden vormend, kan het zeer goed voor randen worden gebruikt.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ 4 „ „

BLOEITIJD.

Juni-Juli. †*Armeria Bees' Ruby*. Nieuwl. p. st. f 0.55

Prachtige verbetering van de *A. Cephalotes*, met zeer lange 60—70 cM. hooggroeiende stengels en groote bloemhoofdjes van een schitterend rose kleur.

Juni-Juli. *aArmeria Cephalotes splendens* (40 cM.),

helderrose p. st. f 0.20

Juni-Juli. *aArmeria Lauchiana alba* (20 cM.) wit,

p. st. f 0.15

" " *a* " " *splendens* (20 cM.),

vuurrood p. st. f 0.15

Mei-Juni. *aArnica sachalinense* (40 cM.), p. st. f 0.25

Nieuwe uit China ingevoerde plant met groote helder gele bloemen.

Arrhenaterum bulbosum fol. var. (25 cM.),

p. st. f 0.15

Bont siergras. Zoowel geschikt voor potcultuur als voor den vollen grond.

Sept.-Oct. †*Artemisa lactiflora* . . . p. st. f 0.15

Zeer schoone nieuwe plant met rechtopstaande, meer dan 1½ M. hooggroeiende bloemstengels met een menigte fijne welriekende roomwitte bloemen. Prachtige snijbloem, ook zeer geschikt voor borders.

Asarum europaeum p. st. f 0.10

Dit plantje is bijzonder geschikt voor beschaduwde plaatsen.

Aug.-Sept. †*Asclepias incarnata* (75 cM.),

p. st. f 0.15

De bloemen van deze plant zitten in schermen bijeen en hebben een donkerroode kleur.

Aug.-Sept. †*Asclepias tuberosa* (60 cM.), p. st. f 0.15

Prachtig schitterende oranje-kleur.

Juni-Juli. *Asphodelus tauricus* (75 cM.), " " - 0.25

Met fijn blad en lichtgele bloemen.

I. † VOORJAARS-ASTERS.

A. alpinus (20 cM.), helderblauw . . . p. st. f 0.15

" " *albus* (20 cM.), zuiver wit, " " - 0.10

" " *Nixe* (20 cM.) " " - 0.15

Variëteit met fraaie, helderblauwe bloemen.

A. alpinus superbus (20 cM.) . . . p. st. f 0.25

Zeer rijkbloeiende lichtblauwe variëteit.

II. † HERFST-ASTERS.

Prijs: p. st. f 0.15; behalve de geprijsde soorten.

A. acris (75 cM.) p. st. f 0.20

Met stervormige lila-roode bloemen.

A. Amellus Beauté parfaite " " - 0.25

Wordt ongeveer 60 à 70 cM. hoog en vormt in het eind van Augustus en September één prachtig donker violet gekleurd bouquet.

A. Amellus cassubicus (40 à 50 cM.)

Een der mooiste *Amellus*-soorten, laaggroeiend en bijzonder rijkbloeiend met fraaie paarse bloemen.

A. Amellus Gruppenkönigin (35 cM.), p. st. f 0.20

De plant is sterk vertakt en geeft een menigte lavendelblauwe bloemen.

A. Amellus Madame E. Gauguin . . . p. st. f 0.35

Nieuwigheid met rechtop groeiende, goed vertakte bloemstengels en schoone roode bloemen; hoogte 45 cM.

A. Amellus Perry's Favourite.

Variëteit met mooie rose-lila bloemen, welke alle aanbeveling verdient.

A. Amellus Preziosa p. st. f 0.20

Variëteit met schoon gevormde bloemen van donkerpaarse kleur.

A. Amellus Rubellus (60 cM.)

De rijkvertakte planten bloeien met schitterend lila-rose bloemen.

A. Amellus Schöne von Ronsdorf (45 cM.), p. st. f 0.30

De groote bloemen zijn ongeveer 6 cM. in doorsnee en van een mooien vorm. De kleur is prachtig lila-rose.

A. Amellus Wlenholtzi p. st. f 0.30

Fraaie variëteit met lichtrose bloemen. Zij bloeit in Augustus en wordt 50—60 cM. hoog. Van de rose *Amellus*-soorten is deze nieuwe variëteit de lichtst gekleurde.

A. Attraction (140 cM.) p. st. f 0.30

Schoone blauwe variëteit.



Aster Beauty of Colwall.

A. Beauty of Colwall.

Deze opvallende nieuwe Aster heeft zuiver dubbele bloemen van een schoone lavendel kleur, welke op stevige ongeveer 120 cM. hoge stengels zijn gezeten; zeer rijkbloeiend. Daar dit de eerste volkomen dubbele Aster is, is ze bekroneerde nieuwigheid van zeer groote waarde.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "

HERFST-ASTERS (vervolg.)

- A. Bianca** (120 cm.), Nieuw! kleinbl. wit . . . *p. st. f* 0.45
- A. Cilmax** (150 cm.) . . . „ „ - 0.20
Rijkbloeiende Aster met bloemen van een licht lavendelblauwe kleur met stroogeel hart.
- A. cordifolius magnificus** (120 cm.) . . . *p. st. f* 0.40
Donker lila.
- A. cordifolius Photograph** (80 cm.) . . . „ „ - 0.30
Met groote trossen kleine helderlila bloempjes.
- A. ericoides Ophir** (90 cm.) . . . *p. st. f* 0.25
Nieuwe variëteit met zacht rose bloemen.
- A. Freifrau Anna von Münchhausen** (100 cm.), blauw, *p. st. f* 0.25
- A. Glory of Colwall** (140 cm.) . . . „ „ - 0.25
Prachtige nieuwe soort met een massa groote dubbele zacht lilakleurige bloemen op stevige stengels.
- A. hybridus Flossy** (90 cm.) . . . *p. st. f* 0.20
Variëteit met helderwitte vederachtige bloemen.
- A. hybridus Herbsteife** (100 cm.) . . . *p. st. f* 0.25
Rijkbloeiend met zeer groote licht lila bloemen, welke half gevuld zijn.
- A. hybridus Lavendel.** Met lavendelblauwe bloemen.
- A. hybridus Lutetia** (80 cm.) . . . *p. st. f* 0.25
Rijkbloeiende Aster met groote losgevormde bloemen van een zacht lila rose kleur. Zeer geschikt als snijbloem, alsmede voor beplanting van borders enz.
- A. hybridus Mr. S. A. de Graaff** (120 cm.), *p. st. f* 0.20
Een rijkbloeiende nieuwe variëteit met witte bloemen.
- A. ibericus Ultramarine** (60 cm.)
Bijzonder schoone nieuwe Aster, met schitterend donkerpaars gekleurde bloemen, die in menigte worden voortgebracht. Een der beste voor snijbloemen.
- A. laevis pulcherrimus** (2 M.), lila . . . *p. st. f* 0.25
- A. Lustro** (1 M.) . . . „ „ - 0.25
Prachtige variëteit met groote halfdubbele helderrose bloemen; rijkbloeiend.
- A. Maidenhood** (120 cm.) . . . *p. st. f* 0.40
Witte vorm van ericoides.
- A. Mesa grande speciosa grandiflora** zie *Erigeron*.
- A. Miss Willmott** (90 cm.) . . . *p. st. f* 0.40
Halfdubbele variëteit met helderblauwe bloemen.
- A. Mrs. Frank Brazier** (120 cm.) . . . *p. st. f* 0.25
Helderblauw op lange stelen.
- A. Nancy Ballard** (90 cm.) . . . „ „ - 0.35
Bloeit zeer lang vanaf eind September met een menigte groote dubbele purper-lila bloemen.
- A. Novae-Angliae Mrs. S. T. Wright** (150 cm.),
De bloemen zijn fraai rose-purper. *p. st. f* 0.25
- A. Novae-Angliae Ryecroft Pink** (130 cm.), „ „ - 0.25
Een der beste Asters met groote bloemen van een mooie rose kleur.

A. Novae-Angliae Ryecroft Purple (130 cm.), *p. st. f* 0.20
Grootbloemige variëteit met bloemen van een prachtig purperblauwe kleur.

A. Novae-Belgiae Brandenburgia (120 cm.), *p. st. f* 0.45
Donkerrose, lila.

A. Novae-Belgiae Feltham Blue . . . „ „ - 0.20

Zeer rijkbloeiend met geel centrum. De stevige, recht-opstaande stengels vertakken zich tot aan den grond en bereiken een hoogte van 120 cm. De plant is een en al bloem van boven naar beneden.

A. Novae-Belgiae Finchley White (120 cm.), *p. st. f* 0.25
Een der beste witte Herfst-Asters.

A. Novae-Belgiae Letzter Straus (150 cm.), „ „ - 0.25
Laatbloeiend met lichtblauwe bloemen.

A. Novae-Belgiae Heiderose.

Een der schoonste onder de vele rose Herfst-Asters. Zij bloeit zeer rijk half September met groote bloemen.

A. Novae-Belgiae Silberstern (100 cm.)

Met groote stervormige zuiver witte bloemen in dichte trossen. Fraai rijkbloeiende soort; een der beste witten.

A. Novae-Belgiae Waldröschchen (140 cm.), *p. st. f* 0.30
Rose-lila.

„ „ „ **White Queen** (1 M.), zuiver wit.

A. Peggy Baliard (90 cm.) . . . *p. st. f* 0.30

Een „Beauty of Colwall” in het klein. De stevige stengels brengen lila-rose bloemen in groote menigte voort, die eerst geheel dubbel, doch langzamerhand halfdubbel worden. In Sept. 1910 te Londen bekroond.

A. Shorti (1 M.), lila.

„ **St. Egwin** (1 M.)

Deze nieuwe sterk vertakte Aster heeft platte bloemen van een schoone roserode kleur, welke 3½ cm. in doorsnede zijn. Als snijbloem en voor beplanting van groepen verdient zij alle aanbeveling.

A. Thompsoni (50 cm.) . . . *p. st. f* 0.45

Een van de mooiste Asters, die reeds in Juli begint te bloeien en onophoudelijk doorbloeit totdat het vriest met groote zachtblauwe bloemen op lange stelen.

A. THOMPSONI NANA (30 cm.) . . . *p. st. f* 0.35

Laaggroeiende variëteit der vorige, die nog rijker bloeit. Een der rijkst en langst bloeiende Vaste Planten.

A. Tradescantia (1 M.), wit. *p. st. f* 0.25

„ **vimineus** (1 M.), wit.

Het is zeer aan te bevelen de Herfst-Asters te planten langs opgaand hout of heesterparken, of in de voorste regels er tusschen. Niet alleen vroolijken ze op deze wijze den tuin laat in het najaar op, maar leveren ook een uitmuntend materiaal voor bouquets.

N.B. Voor uitvoeriger beschrijvingen der meeste Aster-soorten raadplege men de vroegere jaargangen van mijn *Catalogus*.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „



Een veld met nieuwe Astilbe's en Spiraea's op de Kweekery „Moerheim.”

† NIEUWE ASTILBE HYBRIDEN.

(Bloeitijd Juli-Aug.)

Onderstaande collectie nieuwe Astilben, welke thans met uitzondering van de variëteiten *Gruno*, *Moerheimi*, *Salland* en *Prinses Juliana* voor de eerste maal worden aangeboden, zijn alle in mijn kweekery ontstaan uit kruisingen van verschillende soorten met hybriden van *A. Davidii*. Uit een partij van 20.000 zaailingen daarvan afkomstig, hebben wij een twintigtal der mooiste afgezonderd en doorgekweekt en van deze wordt slechts een tiental der mooiste in den handel gebracht. De vaste Keurings-Commissie der Nederl. Maatsch. van Tuinbouw en Plantkunde heeft in de maand Augustus aan deze nieuwe Hybriden niet minder dan 4 Certificaten Eerste Klasse en 7 Getuigschriften van Verdienste toegekend, daardoor op duidelijke wijze de belangrijkheid dezer nieuwe aanwinsten erkennende. De collectie munt uit door een buitengewonen rijkdom van vormen en kleuren van blad en bloem. Er zijn er bij met reusachtig groote stengels, zooals b.v. *Koning Albert*, andere zooals b.v. *Anneke Schimmelpenninck* hebben een meer gedrongen groeiwijze. De collectie werd door alle bezoekers der kweekery ten zeerste bewonderd. Ook in de Tuinbouwbladen, zooals *Onze Tuinen*, *Floralia*, enz. werd er waardeerd over geschreven.

ANNEKE SCHIMMELPENNINCK p. st. f 1.50

Variëteit met lage gedrongen tros. De bloemen zijn wijnrood. Een zeer aparte tint. Hoogte 1 M.

BETSY CUPERUS p. st. f 2.50

Prachtige, 1.50 M. hooge soort. De fraai afhangende tros, die minstens 50 cM. lang wordt, prijkt des zomers gedurende eenige weken met een schat van witte bloemen met rose hart. De helderroze kleur heeft echter de overhand.

FREULE H. VAN DEN BOSCH p. st. f 1.—

Hoogte 1 M., met fijn loof en rechtopstaande stengels. De talloze bloemen hebben een schitterend roode kleur, tot dusver geheel onbekend onder de Astilben. Getuigschrift v. Verdienste, 24 Aug. 1916.

GRUNO p. st. f 0.30

Voor snijbloemen is deze variëteit een van de mooiste. Losse tros met zachtrose bloemen. Hoogte 120 cM.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

” ” ” ” ” 5 ” ” ” ” ” 4 ” ”

† NIEUWE ASTILBE HYBRIDEN (vervolg.)

JO OPHORST p. st. f 1.50

Hoogst elegante lange tros met donker purperroode bloemen. Hoogte 150 cm. Certif. 1e Klasse. Aug. 1916.

KONING ALBERT p. st. f 1.50

Deze Astilbe, die men waarlijk een koning onder de Astilben kan noemen, bezit meer dan 2 M. lange rood aangelopen stengels, waarvan de tros alleen reeds een lengte van 1 M. bedraagt. De bloemen zijn groot en zuiver wit. Wij hebben deze plant zoo genoemd uit sympathie voor de heldhaftige figuur van Koning Albert van België. Certif. 1e Klasse Aug. 1916.

MARGUÉRITE GRAVIN VAN REGTEREN LIMPURG, p. st. f 1.50

Het blad dezer nieuwe soort doet eenigszins denken aan dat van A. Grandis. De plant groeit circa 1½ M. hoog. De bloemstengels zijn buitengewoon krachtig en beginnen zich reeds dicht boven den grond te vertakken en bloemtrossen te vormen, zoodat de tros zelf ruim 1 Meter lang is. De zeer fijne franjeachtige bloemen zijn helderrood met donker lila getint, hetgeen aan het geheel een prachtigen gloed geeft. Zeer decoratieve plant.

MARIA VAN LEEUWEN p. st. f 1.50

Vrij hoog groeiende variëteit met buitengewoon lange trossen, welker kleur rose is met een mat lila weerschijn. Hoogte 180 cm.

MARIE GRAVIN VAN LIMBURG STIRUM, p. st. f 2.—

Deze zeer schoone variëteit met 1.90 M. lange stengels is een verbetering van Astilbe hybr. Moerheimi. De bloem

is evenals deze crème wit, maar de trossen zijn veel langer, tot 70 cm.

META IMMINK p. st. f 1.50

Prachtige kruising, met dichte bloemtrossen van een heerlijke rose kleur. Zeer aanbevelenswaardig. Hoogte 150 cm. Getuigschrift v. Verdienste Ned. Mij v. T. en P., Aug. '16.

MOERHEIMI p. st. f 0.30

Deze opvallende Nieuwigheid is enkele jaren geleden in mijne kweekkerij ontstaan uit een kruising van A. Davidii met eenige andere hybriden en heeft denzelfden krachtigen groei als eerstgenoemde, wordt echter 150 cm. hoog. De elegante rechte bloemstengels bereiken een hoogte van 70 cm., de kleur der bloemen is roomkleurig wit. Men kan haar een witte Davidii noemen, echter met veel grootere bloemtrossen. Zonder twijfel een der beste en fraaiste nieuwigheden der laatste jaren.

PRINSES JULIANA p. st. f 0.25

De lange stengels, welke 90—100 cm. hoog groeien, vormen losse en sierlijke trossen, welke helder karmozijn-rose gekleurd zijn.

SALLAND p. st. f 0.25

Ontstaan uit een kruising met A. Davidii. Zij heeft denzelfden groei als deze laatste, echter zijn de stengels veel krachtiger en geven losse bloemtrossen van een prachtige roode kleur. Zij groeit 180 cm. hoog en is een eerste klasse snijbloem.

† ASTILBEN.

BLOEITIJD.

Aug.-Oct. **A. Davidii** p. st. f 0.15
(Zie afbeelding blz. 55 hiernevens.)

Zeer decoratieve plant, afkomstig uit China; groeit ongeveer 6 voet hoog en hare kolossale bloemtrossen hebben een donker purperroode kleur.

A. Grandis p. st. f 0.15

De circa 180 cm. hooge stengels zijn voorzien van 60—75 cm. lange witte bloempluimen, welke fraai afsteken bij het krachtige, gevederde loof.

A. Grandis Rosea Magnifica p. st. f 1.50

Nieuw. De geheele habitus der plant komt veel overeen met de bekende A. Grandis, die een 10-tal jaren geleden uit China is ingevoerd, maar het nadeel van deze soort is, dat het wit der bloem niet helder genoeg uitkomt. Van deze nieuwe door mij gewonnen variëteit, hebben de bloemen, die ook grooter zijn dan die der moederplant, een prachtige zuiver rose kleur. Zij bloeit in het laatst van Juli en groeit circa 130 cm. hoog. Getuigschrift v. Verdienste Ned. Mij v. T. en P., Augustus 1916.

A. hybrida Brunhilde p. st. f 0.15

Groeit circa 100—120 cm. hoog. De vederachtige bloemtrossen hebben een crème rose kleur.

A. hybrida Carminea p. st. f 0.15

Deze Nieuwigheid heeft elegante, rijkvertakte circa 90 cm. hooge bloemstengels, met bloemen van een karmijn violette kleur.

A. hybrida Ceres p. st. f 0.25

De 80—100 cm. hooge stengels zijn rijk vertakt en dragen stevige, ijle bloemtrossen, die schitterend lila-rose gekleurd zijn.

A. hybrida Crépuscule p. st. f 0.30
Met groote trossen vleeschkleurig rose bloemen.

A. hybrida Gloria p. st. f 0.40

Groeit slechts circa 50—60 cm. hoog en geeft dichte vederachtige bloemtrossen van een prachtige schitterend donkerrose kleur met een zwak lila weerschijn. (Getuigschrift 1e kl. Amsterdam 8 Juni 1915.)

A. hybrida Juno p. st. f 0.20

De vederachtige bloemtrossen dezer nieuwe variëteit zijn purperrose en bereiken eene hoogte van 3 à 4 voet.

A. hybrida Kriemhilde p. st. f 0.15

Prachtige vederachtige bloemtrossen van een heerlijke zalmrose kleur.

A. hybrida Lumineux p. st. f 0.35

Met groote bloemtrossen van karmijnroode kleur. Groeit circa 1 Meter hoog.

A. hybrida Magenta, karmijnrose p. st. f 0.45

A. hybrida Pyramidal " " - 0.15

Met sterke zuiverwitte bloemtrossen.

A. hybrida Rosa Perle " " - 0.25

Groeit met dicht pyramidevormige stengels van ongeveer 60 cm. hoogte. Ze bloeit begin Augustus en heeft een zacht-rose kleur.

A. hybrida Rubella p. st. f 0.20

Met ongeveer 60 cm. hooge, schoone, vleeschkleurige rose bloemtrossen.

A. hybrida Rutilians p. st. f 0.25

Een in het oog loopende schoone nieuwe Astilbe met vederachtige bloemtrossen van een prachtige karmijn-rose kleur.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "

*Astilbe Davidii.*

A. hybrida Solferino p. st. f 0.30
Groeit 100 à 120 cm. hoog en bloeit in Augustus met lange bloemtrossen van een schitterend purperen kleur.

A. hybrida Venus p. st. f 0.25
Vroegbloeiend; komt in groeiwijze met „Ceres” overeen, doch is wat hooger. Ze heeft echter schitterend purperrose bloemtrossen.

A. hybrida Vesta (75 cm.) p. st. f 0.30
Licht lilarose bloemtrossen.

A. hybrida Waliküre (75 cm.) „ „ - 0.25
Helderrose met zalmkleurige weerschijn.

A. W. E. Gladstone „ „ - 0.15
Munt uit door losse stevige bloemstengels en buitengewoon forsche groeiwijze. De witte bloemen zijn zeer schoon.

BLOEITIJD.

Juni-Juli. **A. Peach Blossom (50 cm.)** . . . p. st. f 0.15
Zeer fijne perzik-bloesem kleur, dicht gevulde trossen; een der beste soorten om te trekken.

Juni-Juli. **A. Queen Alexandra (50 cm.)** . . p. st. f 0.15
Zachtrose met dicht gevulde bloemtrossen. Deze soort is bijzonder geschikt om te forceeren.

BLOEITIJD.

Juli-Sept. **A. rivularis (1 m.)** p. st. f 0.15

De bloem lijkt veel op die van de *Splraea*'s, doch is grooter. Ze groeit het liefst in vochtigen bodem.

Juli-Sept. **A. rivularis major gigantea (150 cm.)** p. st. f 0.30

Juli-Sept. **A. Thunbergi delicata (150 cm.)** . „ „ - 0.30
Lange trossen met zachtrose bloemen.

Juli-Sept. **A. Thunbergi Moerhelmi (80 cm.)** „ „ - 0.20

Deze in mijne kweekerij ontstane Nieuwigheid is een belangrijke verbetering der *A. Thunbergi*. Zij is een der schoonste *Astilbes* en bloeit vanaf einde Juli met zeer groote trossen van kleine zuiverwitte bloemen.

Juli. **Astrantia carniolica rosea (40 cm.)** . p. st. f 0.20

„ AUBRIETIA'S.

Deze kunnen tot de mooiste en dankbaarste rotsplanten worden gerekend. Ze nemen elken grond voor lief en vroeg in April en Mei zijn de lage kruipende plantjes met een massa bloemen overdekt, in de meest verschillende kleuren-nuances tusschen rose en paars.

A. Crimson King, levendig karmijnrose . . p. st. f 0.20

A. deltoidea „ „ - 0.20

Bloeit zeer vroeg met lilakleurige bloemen. Laaggroeiend.

A. Dr. Mules p. st. f 0.20

De schitterend gekleurde bloemen zijn purperlila.

A. Fire King, diep karmozijn p. st. f 0.20

A. graeca (15 cm.) „ „ - 0.20

Heeft veel overeenkomst met *A. deltoidea*, alleen zijn de bladeren en bloemen iets grooter; de laatste hebben eene violetblauwe kleur.

A. Hendersoni, paarsrood p. st. f 0.20

„ **H. Marshall**, donker purper-violet . . „ „ - 0.20

„ **Lavender** „ „ - 0.20

Deze nieuwe *Aubrietia* onderscheidt zich door prachtig lavendel-blauwe bloemen.

A. Moerhelmi p. st. f 0.20

Deze nieuwe variëteit, in mijne kweekerij ontstaan, is de fraaiste en grootstbloemige. De bloemen hebben een helder zacht rose kleur.

A. Mrs. Lloyd Edwards p. st. f 0.30

Grootbloemige variëteit met schitterend donker purperblauwe bloemen.

A. Prichard's A 1 p. st. f 0.20

Schitterend donker violet.

A. Purple robe, purperrood „ „ - 0.20

„ **tauricola** „ „ - 0.20

Zeer laaggroeiend met helderblauwe bloempjes.

A. Wallacei, mauve p. st. f 0.20

BLOEITIJD.

Junl. †**Barbarea vulgaris fl. pl.** p. st. f 0.25

Deze reeds oude plant heeft pl.m. 40 cm. hooge, sterk vertakte trossen, waaraan een menigte kleine dubbele goudgele bloemen.

Juni-Juli. **Betonica grandiflora superba (30 cm.)**, p. st. f 0.15

Deze vaste plant heeft lange stengels met schoone roode bloemen.

Juni-Sept. **Bidens dahlioides (60 cm.)** . . . p. st. f 0.35

De bladeren zitten in een rozet bijeen; de bloemen hebben een purperachtige kleur en gelijken op enkelbloemige *Dahlia*'s.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

*Campanula persicifolia* „Moerheimi.”

BLOEITIJD.

Juni-Juli. †*C. persicifolia* „Moerheimi,” (50 cm.), *p. st.* f 0.25
Deze prachtige *Campanula*, in mijne kweekrij ontstaan, is een der schoonste vaste planten.

De stengels zijn dicht met bloemen bezet, die loodrecht op de stengels staan, zoodat men de volle bloem zien kan. De enorm groote dubbele bloemen, die een middellijn van

7 à 8½ cm. hebben, zijn plat gevormd als een roos, en de kleur is zoo prachtig sneeuwwit als men zelden bij bloemen aantreft. Zoowel voor decoratiedoeleinden als voor snijbloemen kan deze plant dus ten zeerste worden aanbevolen. De afgesneden bloemen blijven 8 dagen goed.

BLOEITIJD.

Juni. *C. punctata* (50 cm.) *p. st.* f 0.25

De hangende bloemen dezer soort zijn geelachtig wit gekleurd en van binnen met dofroode puntjes.

Juni-Sept. *C. turbinata* (25 cm.) *p. st.* f 0.20

Rijkbloeiende laaggroeiende soort met groote licht- en donkerblauwe bloemen.

Juli-Sept. *C. van Houttei* (60 cm.) *p. st.* f 0.20

Zeer schoone hybride met buitengewoon groote donkerblauwe bloemen.

Juni-Juli. *Cardamine pratensis fl. pl.* (30 cm.),

p. st. f 0.25

Dubbele Pinksterbloem met zacht lila bloemen. Groeit het best op vochtige of halfbeschaduwde plaatsen.

Aug.-Sept. *Cassia Marylandica* (120 cm.), *p. st.* f 0.25

Juni-Aug. *Catananche alba plena* - 0.15

Lange stengels met witte bloemen in den vorm van korenbloemen.

Juni-Aug. *Catananche coerulea* (60 cm.), *p. st.* f 0.15

De bloemen hebben eenige overeenkomst met de korenbloemen en zijn purperblauw gekleurd.

† CENTAUREA.

De verschillende soorten van het geslacht *Centaurea*, waartoe ook de bekende wilde korenbloem behoort, munten alle zonder uitzondering uit door bevallige losse bloemen. Zoowel de lagere als de hooggroeiende soorten kunnen tot de dankbaarste vaste planten gerekend worden, zoowel voor sierplanten als voor snijbloemen.

BLOEITIJD.

Juni-Sept. *C. dealbata* (30 cm.) *p. st.* f 0.15

Deze is een der fraaiste van dit geslacht; de bloemen zijn zeer fijn franjeachtig en levendig rose gekleurd. Bloeit zeer lang.

Juli-Aug. *C. macrocephala* (90 cm.) *p. st.* f 0.15

Met groote gele kogelvormige bloemen op dikke stijve stengels. Prachtige vreemde decoratieplant.

Mei-Juni. *aC. montana alba*, wit *p. st.* f 0.15

” ” *a* ” ” *coerulea*, blauw ” ” - 0.15

” ” *a* ” ” *carnea*, lila - 0.15

” ” *a* ” ” *grandiflora*, grootbloemige variëteit *p. st.* f 0.15

” ” *a* ” ” *Lady Florence Hastings*, wit, *p. st.* f 0.20

” ” *a* ” ” *rosea*, rose - 0.30

” ” *a* ” ” *violetta*, violet - 0.20

Deze zijn variëteiten van de overblijvende alpenkorenbloemen. Zij bloeien nagenoeg den geheelen zomer.

Mei-Juli. *C. ruthenica* (120 cm.) *p. st.* f 0.15

Eene uit Rusland ingevoerde hooggroeiende soort. Ze heeft diep ingesneden bladeren, en bloemen van een stroogele kleur.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

” ” ” ” ” 5 ” ” ” ” ” 4 ” ”

BLOEITIJD.

Juli-Oct. †*Chelone barbata* (60 cm.) . . . p. st. f 0.15

Met schoone scharlakenroode bloemen, welke eenigszins leeuwenbekachtig zijn gevormd.

Aug. †*Cheione glabra aiba* (80 cm.) . . . p. st. f 0.15
Met witte bloemen.

Juli-Aug. *Cheione obliqua fl. aiba* (80 cm.) „ „ - 0.15

† *CHRYSANTHEMUM INDICUM*.

Zoogenaamde vroegbloeiende winterharde
Chrysanthemums.

Op verzoek van vele mijner afnemers heb ik dit artikel weer in mijn catalogus opgenomen en zij verdienen ook ten volle de aandacht. Zij beginnen reeds te bloeien in Juli en bloeien door tot October, ja zelfs November, indien het niet te hard vriest en de bloemen komen voor in prachtige nuanceeringen van geel, bruinrood, rose en wit. Daar het wel eens gebeurt, dat enkele soorten niet goed door den winter komen, doet men goed de keus der soorten geheel aan mij over te laten en zal zoo veel mogelijk voor een goede variatie worden gezorgd.

Het verdient aanbeveling ze in den winter te bedekken met een flinke laag drooge turfstrooisel, die langzamerhand moet verwijderd worden, wanneer de planten in het voorjaar beginnen te werken. Nog beter is het om ze in den kouden bak te overwinteren. Enkele jaren overwinteren ze zelfs zonder bedekking, maar men kan er toch niet op rekenen, want vooral bij afwisselend vriezend en dooi weder, sterven ze dikwijls geheel af.

Prijs per 10 stuks f 2.—, per stuk f 0.25.

Juni-Juli. *Chrysanthemum leucanthemum plenum*
(50 cm.), p. st. f 0.90

† *CHRYSANTHEMUM MAXIMUM*.

De hieronder volgende zijn variëteiten van deze schoone vaste plant. De bloemen hebben, wat vorm en kleur betreft, veel overeenkomst met de gewone Margrietten die in 't wild voorkomen, doch hebben een middellijn van omstreeks 10 cm. Zij bloeien zeer rijk en lang. Daar de bloemen op zeer lange stengels zijn gezeten, kan men ze ook uitstekend voor snijbloemen gebruiken.

Zij groeien gemiddeld 75 cm. hoog.

BLOEITIJD.

Juni-Juli. †*C. maximum* Albert J. Church, p. st. f 0.30
Zeer rijkbloeiende zuiverwitte soort.

Juni-Juli. †*C. maximum* Buisson nain, „ „ - 0.30
Zooals de naam aanduidt vormt deze soort gedrongen bosjes ± 30 cm. hoog met een massa zuiverwitte bloemen.

Juli-Aug. †*C. maximum* Cactus . . . p. st. f 0.25
Met groote witte bloemen en eenigszins gefranjeerde bloemblaadjes.

Juni-Juli. †*C. maximum* Etolie de Nivelles, p. st. f 0.30

Deze schoone nieuwe *Chrysanthemum* bloeit ongeveer 2 weken vroeger dan eenige andere variëteit. De elegante bloemen, waarvan de buitenste bladeren diep zijn ingesneden, zijn zuiverwit en hebben een doorsnede van 13 cm.

Juli-Aug. †*C. maximum* Fiancée . . . p. st. f 0.30

Zeer groote witte bloemen, waarvan de buitenste bloembladen in dubbele rijen staan.

Juni-Aug. †*C. maximum* Graf Kobbo . . . p. st. f 0.30

Enorm groote witte Margriet, met bloemen tot 15 cm. middellijn, die slechts een klein geel hart hebben, en waarvan de breede bloembladeren aan beide einden smaller uitloopen.

Juli-Sept. †*C. maximum* King Edward . . . p. st. f 0.20

Forsch groeiende variëteit met dikke bloemstengels en groote bloemen.

BLOEITIJD.

Juli-Aug. †*C. maximum* Magda am Ende p. st. f 0.25
Middelhooge soort, die omstreeks 50 cm. hoog groeit met goed gevulde bosjes van witte bloemen.

Juli-Sept. †*C. maximum* Mme Lauwaert . . . p. st. f 0.30
Nieuwe variëteit met groote zeer fijn ingesneden bloemen.



Chrysanthemum maximum Mrs. J. Tersteeg.

BLOEITIJD.

Juli-Sept. †*C. maximum* Mrs. J. Tersteeg p. st. f 0.25

Prachtige nieuwe variëteit, welke door mij in den handel is gebracht; de hoogsgroeiende nl. 100—120 cm. De schoone, sierlijke bloemen zijn van een enorme grootte en overtreffen in dit opzicht alle andere nieuwe invoeringen der laatste jaren.

Juli-Sept. †*C. max.* Plume d'Autruche (60 cm.), p. st. f 0.40

Juli-Sept. †*C. maximum* semipienum . . . p. st. f 0.20

De groote zuiverwitte bloemen dezer door mij gewonnen verscheidenheid zijn op lange, stevige stengels gezeten en fraai half dubbel; zij blijven afgesneden zeer lang goed. Van alle andere is deze het beste tegen den winter bestand.

Juli-Sept. †*C. maximum* The Tunstall . . . p. st. f 0.30

Nieuw, met groote bloemen en teruggeslagen bloembladen. Groeit 90 cm. hoog.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

BLOEITIJD.

Sept.-Nov. †*Chrysanthemum (Pyrethrum) uliginosum* (150 cm.), p. st. f 0.15

Deze, in het laatst van den herfst nog bloeiende plant geeft een groote menigte zuiverwitte bloemen. Zeer aan te bevelen voor snijbloemen.

Sept.-Oct. †*Cimicifuga (Actaea) dahurica* (180 cm.), p. st. f 0.30

Hooggroeiende plant met lange rechtopstaande stengels, waaraan een menigte roomwitte bloemen.

Juli-Aug. †*Cimicifuga (Actaea) japonica* (80 cm.) p. st. f 0.25

Met sierlijk gebogen bloemstengels m. roomwitte bloemen.

Juli-Sept. †*Cimicifuga (Actaea) racemosa* (120 cm.), p. st. f 0.15

Zeerschoone hooggroeiende sierplant met kolossale lange witte bloemaren. Prachtig voor groote vaasbouquetten.

Sept.-Oct. †*Cimicifuga (Actaea) Simplex*, p. st. f 0.15

Zeer decoratieve plant, welker bloemstengels, die ongeveer 80 à 90 cm. hoog worden, in dichte trossen zuiver witte bloemen eindigen; zij bloeit op een tijd, dat mooie bloemen schaarsch zijn.

Juli-Sept. †*Clematis cocinea* p. st. f 0.55

Zeer elegante klimplant met vurig karmijnroode bloemen.

BLOEITIJD.

Juli-Sept. †*Clematis Davidiana Azur* . . . p. st. f 0.25

De fraaie pyramidaal-vormige planten groeien ongeveer 1 M. hoog. De bloemen zijn lichtblauw met wit centrum, waarbij de crème-witte meeldraden fraai afsteken.

Aug.-Sept. †*Clematis Davidiana Cypris*, (120 cm.) p. st. f 0.25

Prachtige, nieuwe soort met groote, welriekende, zachtblauwe bloemen, welke in dichte bossen verschijnen.

Sept.-Oct. †*Clematis Davidiana Profusion*, p. st. f 0.25

De bloemen dezer nieuwe variëteit hebben een prachtig zacht asch-blauwe kleur.

Juli-Aug. †*Clematis erecta* (100 cm.) . . . p. st. f 0.15

Sept.-Oct. †*Clematis erecta flore pleno* . . . - 0.35

(Zie afbeelding.)

Rijkbloeiende variëteit, die zeer mooie roomkleurige bloemen voortbrengt, 70 à 80 cm. hoog.



Clematis erecta fl. pl.



Clematis erecta grandiflora.

Juli-Aug. †*Clematis erecta grandiflora* (1 M.); p. st f 0.45

Verkregen door kruising van *C. erecta* en *angustifolia*. De stengels bereiken de hoogte van 1 M. en zijn van boven bedekt met groote bloemen van tenminste 3 cm. middellijn, met 4, 5 of 6 bloembladeren van zuiverwitte kleur met crème meeldraden.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "

BLOEITIJD.

Aug.-Oet. †*Clematis grata* p. st. f 0.20
Schoone vaste plant, met een groote menigte witte bloemen, met blauwachtige tint op zeer losse stengels van circa 1½ M. lengte.

Juli-Aug. *Codonopsis ovata* p. st. f 0.20
Mooie klokvormige lichtblauwe hangende bloemen.

April-Mei. †*Convallaria majalis* Fortin (20 cm.),
p. 100 st. f 7.—, p. st. f 0.10

Grootbloemige variëteit van de bekende Lelietjes-vandalen.

Juli-Aug. †*Coreopsis lanceolata oculata* (50 cm.),
p. st. f 0.30

Juli-Aug. *Coreopsis verticillata* (50 cm.) - 0.15
Met zeer fijn ingesneden lichtgroen blad en groote goudgele bloemen.

Coriaria terminalis p. st. f 0.40
Deze plant is meer merkwaardig door hare schoone vruchten, dan door de bloemen. Zij groeit 60 cm. hoog en de lange, een weinig hangende takken, dragen aan het uiteinde eene menigts doorschijnende gele bessen.

aCotula squallida p. st. f 0.20

Uit Nieuw-Zeeland ingevoerd zodenvormend plantje met fijne bladeren, die ook 's winters groen blijven. Zeer geschikt voor bekleding van rotspartijen.

Aug.-Sept. †*Crinum Powellii*, donker rose, p. st. f 0.15
" † " " *album*, sneeuw wit.

" † " " *intermedium*, lichtrose,
p. st. f 0.30

Deze Crinums zijn ontstaan uit kruising tusschen *C. longifolium* (*Amaryllus longifolia*) en *C. Moorei*. Ze kunnen met succes in den open grond worden gekweekt. De zeldzame schoone, op lelies gelijkende bloemen, zijn op kolossale stengels gezeten en komen prachtig uit boven de lange glanzend groene bladeren. Des winters moet men ze opnemen of met stroo of bladeren dekken. De planten worden 60 cm. hoog.

Juni. *Cruslanella stylosa* (20 cm.) p. st. f 0.30



Cyclamen europeum.

Aug.-Oet. *aCyclamen europeum* (10 cm.) p. st. f 0.15

De beste van de Cyclamen-soorten voor den vollen grond. Zij bloeit in den herfst; de bloemen zijn van een violetroode kleur en komen veel overeen met die van de gewone kas-Cyclamen. Zij vereischt niet veel zorg, maar moet niet te diep geplant worden; des winters moet ze met een weinig blad of eenige dennetakken worden gedekt. Het blad heeft veel overeenkomst met de klimop.

Oet. *aCyclamen hederaefolium* p. st. f 0.15

Prachtige soort met schoone bladeren en rose bloempjes; verlangt des winters een lichte bedekking.

BLOEITIJD.

Juni. *Cynoglossum appenninum* (40 cm.), p. st. f 0.25
Mei-Juni. *Cypripedium macranthum* (30 cm.), p. st. f 0.60

Vollegronds-Orchidee met groote purperroode bloemen.

Juni-Juli. †*Cypripedium spectabile* (40 cm.), p. st. f 1.10
Bijzonder schoone vollegronds-Orchidee met groote eigenaardig gevormde bloemen, die wit met helderroze gekleurd zijn. Gewoonlijk zijn 2 bloemen bij elkaar op de lange stevige fraai bebladerde stengels gezeten. Een der schoonste snijbloemen. Zij is volkomen winterhard.

Juni-Juli. †*Delphinium atropurpureum* (1 M.), p. st. f 0.30
Deze Delphinium is de vroegstbloeiende van alle. De groote bloemen zijn schitterend purperblauw met zwart hart.

Juni-Aug. *Delphinium Brunonianum* (90 cm.) p. st. f 0.45
Zeldzame soort van de Himalaya met violetkleurige bloemen.

† DELPHINIUM HYBRIDUM. (RIDDEERSPOREN.)

De overblijvende riddersporen kunnen tot de schoonste sierplanten worden gerekend. Zij vormen forsche bossige planten met talrijke stevige bloemstengels, die tot 6 voet hoog worden en van onderen tot boven dicht met bloemen zijn bezet. De kleur der bloemen komt het meest voor in nuances van blauw, violet, purper en wit. De afgesneden bloemen van Delphiniums blijven zeer lang frisch en zijn daardoor zeer geschikt voor bouquets, vooral tot het vullen van groote vazen. De bloeitijd is Juli-Aug., maar gewoonlijk bloeien zij door tot in October.

Aeroplane p. st. f 0.30
Grootbloemig halfdubbel, kleur blauw met violet en wit hart.

Amos Perry p. st. f 0.30
Mooie variëteit met halfdubbele bloemen, ± 6½ cm. in doorsnee, van een helder rose-mauve kleur met hemelsblauwen weerschijn en hemelsblauw gestreept. De buitenste bloembladeren zijn hemelsblauw. Het oog is zwart en goed zichtbaar.

Andrew Carnegie p. st. f 0.35
Prachtig variëteit met enorme dubbele bloemen, van zacht lila kleur met blauw midden.

Beauty of Langport p. st. f 0.75
Crémewit met licht geel oog.

Belladonna p. st. f 0.15
Bekende oude soort, met ongeveer 60 cm. hooge stengels en hemelsblauwe enkele bloemen. Snijbloem bij uitnemendheid, daar zij gedurende den geheelen zomer bloeit.

Belladonna grandiflorum p. st. f 0.20
Deze heeft een sterker gewas dan de gewone Belladonna en ook groeter bloemen.

Belladonna semiplenum p. st. f 0.20
Voortreffelijke halfdubbele variëteit; met hemelsblauwe bloemen.


Bleu tendre p. st. f 0.30
Vertakte stengels met middelgrote, enkele bloemen van een zacht lila, bijna witte kleur.

Boerhave p. st. f 1.50
Een der grootstbloemige met helder cobaltblauwe bloemen, die mauve gevlekt zijn.

CAPRI p. st. f 0.30
Eigengewonnen Nieuwigheid met denzelfden sterken groel als „Moeiheimi," waarvan ze een pendant is. De kleur komt overeen met die van „Persimmon," waarvan ze echter in elk opzicht een verbetering kan genoemd worden; de bloemen zijn groeter en de stengels langer en meer vertakt. Ik beschouw deze als de beste hemelsblauwe enkele Delphinium.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "

*Delphinium hybriden.*

- Chamud** p. st. f 0.25
Met dubbele, donker violette bloemen, extra.
- Col. Douglas** p. st. f 0.55
Met rechtopstaande stengels en zuiver blauwe bloemen.
- Conspicua** p. st. f 0.55
Gentiaanblauw met wit hart; enkel.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "

Corry p. st. f 0.25

Met groote, goed gevormde dubbele bloemen aan zeer lange stengels. De kleur is zacht hemelsblauw met iets rood. De tros is gewoonlijk over haar geheele lengte tegelijk in bloei en daardoor munt deze variëteit uit boven vele.

De Ruyter p. st. f 0.25

Halfdubbel met donker violetblauwe bloemen. Zeer rijkbloeiend; losse bloeiwijze.

Fanny Stormonth p. st. f 0.30

Francis F. Fox " " - 0.30

Een der mooiste enkele. De groote bloemen zijn schitterend donkerblauw.

Goliath p. st. f 0.45

Hooggroeiende variëteit met rechtopstaande groote bloemen die een violetblauwe kleur hebben, met zwart hart. De buitenste bloembladeren zijn diepblauw.

Harry Smetham p. st. f 0.35

Halfdubbele nieuwe soort met porcelein-blauwe bloemen.

Henri Moissan p. st. f 1.10

Met kolossale donker violette bloemen en een donkerder hart.

Hugo Poortman p. st. f 0.40

Door mij gewonnen nieuwigheid, met enorme, platte, halfdubbele bloemen, die mooi op den stengel zitten en een fraaie dofblauwe kleur hebben, zeer aanbevelenswaardig.

Humosa p. st. f 0.35

Eigengewonnen variëteit met prachtige halfdubbele donkerblauwe bloemen.

Ida R. Elliott p. st. f 1.50

Extra grootbloemige variëteit met zuivere cobaltblauwe bloemen en amethyst-kleurige binnenbloemen. Prachtige tros.

J. B. Blackmore p. st. f 0.45

Hemelsblauw met mauve weerschijn; grootbloemig; sterke groeier.

KING OF DELPHINIUMS p. st. f 0.35

Van de donkerkleurige soorten is deze een der aller-mooiste. De bloemen zijn zeer groot, halfdubbel, prachtig donkerpaars met blauw gekleurd en met een groot wit oog.

Koningin Wilhelmina p. st. f 0.30

Hooggroeiende enkelbloemige variëteit met hemelsblauwe bloemen.

K. Th. Caron p. st. f 0.30

De bloemen zijn schitterend gentiaanblauw, wat een fraai effect maakt met het witte hart.

Lady Ravensworth p. st. f 0.30

Zeer lange ijle trossen met groote symmetrisch geplaatste zuiver blauwe bloemen.

Lamartine, enkelbl. donkerblauw p. st. f 0.30

Lize " " - 0.30

Talrijke bloemstengels met enkele bloemen van bizon-dere grootte en opvallend hemelsblauwe kleur.

Lize van Veen p. st. f 0.30

Met zeer groote enkele lichtblauwe bloemen.

Lord Curzon p. st. f 0.30

Blauw met violet en wit oog.

Lorenzo de Medici p. st. f 0.55

Zeer fraaie variëteit. De dubbele bloemen zijn rose met zacht blauw, extra.

DELPHINIUM HYBRIDUM (vervolg.)**Marie Closon** p. st. f 1.—

Prachtige, in mijne kweekerij gewonnen nieuwigheid. De buitengewoon groote bloemen zijn dubbel en de kleur is opvallend lila met rose en hemelsblauw gevlamd. Eene der allerschoonste Riddersporen.

Miss Nelly Weyman p. st. f 0.45Met halfdubbele helderblauw met lilakleurige bloemen.*Delphinium hybr. Moerheimi.***MOERHEIMI. NIEUW!!** p. st. f 0.30

De eerste en eenige zuiverwitte *Delphinium*. De beste, winterharde, vaste plant, in de laatste jaren ingevoerd.

Deze nieuwe variëteit is eenige jaren geleden in mijne kweekerij ontstaan. Zij groeit 150 à 180 cm. hoog en brengt lange stengels voort, welke van onderen sterk vertakt zijn. Zij vormt deze lange zijstengels gedurende den geheelen zomer en deze brengen nog bloemen

voort, wanneer de hoofdstengels reeds lang zijn uitgebleid. Hierdoor wordt de bloeitijd verlengd tot laat in den zomer. De bloemen zijn van het zuiverste wit, met wit centrum en hebben niet die blauw-, geel- of groenachtig vuilwitte tint van sommige vroeger als wit in den handel gebrachte soorten. De groei is buitengewoon krachtig en gezond en zij is vrij van meeldauw.

Juli 1909 te Londen bekroond.

Mr. J. S. BRUNTON p. st. f 0.35

Door mij gewonnen nieuwe *Delphinium*. Hare schoone bloemen zijn prachtig hemelsblauw gekleurd, ongeveer als „*Belladonna*." Zij groeit pl.m. 3 à 4 voet hoog en bloeit buitengewoon rijk. Geen andere variëteit overtreft haar in overvloedig bloeien en daardoor kan zij voor de binderij extra worden aanbevolen.

Mrs. Thomson p. st. f 0.25

De bloemen dezer door mij gewonnen variëteit, die een helderblauwe kleur hebben, zijn op stevige sterk vertakte lange stengels gezeten. Weinig andere soorten bloeien zoo rijk en zoo lang als deze. De plant is zeer krachtig en niet vatbaar voor ziekte.

Novelty p. st. f 0.40

Zeer lange trossen, bloemen zuiver rond, donkerblauw met geel en zwart oog.

Persimmon p. st. f 0.30

De kleur der hemelsblauwe bloemen met licht geel oog, is zeer levendig, terwijl zij goed doorbloeit.

Polar Star p. st. f 0.35

Een laaggroeiende variëteit met halfdubbele ivoorwitte bloemen.

Prins Gustav p. st. f 2.50

Eigen gewonnen nieuwe variëteit, welke thans voor het eerst wordt aangeboden, met zeer groote half dubbele bloemen. De buitenste bloembladeren hebben een donker amethystblauwe kleur, naar het midden in purper-violet overgaand en met bronskleurig oog. Zeer aparte en schitterende kleur, welke reeds van verre de aandacht trekt. Prins Gustav van Denemarken, een broeder van Z. M. Koning Christian, gaf mij de toestemming deze plant naar Z. K. H. te noemen.

Prins Hendrik p. st. f 0.35

Zeer aanbevelenswaardige nieuwigheid van een zeer mooie en aparte kleur. De bloemen zijn halfdubbel en van een levendig purperblauwe kleur met klein wit oog.

Prinses Jullana TB3-323 12-12-1909 p. st. f 0.55

Met groote trossen donker purperblauwe bloemen; een der donkerste *Delphiniums*.

Progression p. st. f 0.30

Eene nieuwe, bijna witte variëteit, waarvan de binnenste drie bloembladeren een weinig geel gekleurd zijn.

Purity p. st. f 0.35Enkelbloemig roomwit.**Queen of Spain** p. st. f 0.35Halfdubbel, lichtblauw met lila.**REV. E. LASCELLES** p. st. f 0.55

Van de dubbelbloemige soorten is deze een der mooiste. De enorm groote donkerblauwe bloemen zijn op stevige stengels gezeten en trekken door het groote witte oog reeds van verre de aandacht.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

Rozenlust *p. st. f* 0.30
Lichtblauw met rose, dubbel.

Salland *p. st. f* 0.30

Eene door mij gewonnen nieuwigheid, welke enkele jaren geleden voor het eerst werd aangeboden. Zij heeft enkele, donkerblauwe bloemen aan stevige stengels.

THE ALAKE *p. st. f* 0.75

Met enorm groote bloemen, los geplaatst op de reusachtige stengels. Kleur der bloemen van buiten diep donkerblauw, van binnen violetblauw.

Theodora *p. st. f* 0.25

Met losse, sierlijke bloemstengels, welke groote bloemen van eene prachtige blauwe kleur — als van een korenbloem — voortbrengen, die een klein sepiakleurig midden hebben. De plant is niet zeer vatbaar voor meeldauw.

Waiter T. Ware *p. st. f* 0.45

Enorme trossen van purperachtig blauwe bloemen met wit oog; lage groeier.

Willy Obreen *p. st. f* 0.45

Dubbele bloemen, blauw met rose.

Yvette Guilbert *p. st. f* 0.35

Enkelbloemig met zuiver helderblauwe bloemen; rijk bloeiend.

Zuster Lugten *p. st. f* 0.35

Nieuwe, door mij gewonnen variëteit, enkele jaren geleden in den handel gebracht. Ze is van een sterken groei en heeft platte mooi gevormde, dubbele, donkerblauwe bloemen.

BLOEITIJD.

Juli-Sept. †**Delphinium sinense** (50 cm.) . . *p. st. f* 0.15

Deze soort heeft een gedrongen groeiwijze en sierlijke bloemtrossen van helder blauwe kleur.

Juli-Sept. †**Delphinium sinense Cineraria coerulium**,
p. st. f 0.20

Deze soort met donkerblauwe bloemen heeft geen sporen waardoor de bloemen aan *Cineraria's* doen denken. Zij bloeit zeer lang door. Hoogte 50 cm.

Juli-Sept. †**Delphinium sinense flore albo**, *p. st. f* 0.15

Variëteit met witte bloemen.

Mei-Juni. **Dianthus caesius** *p. st. f* 0.25

Zodenvormend rotsplantje met roseroode bloempjes.

Mei-Juni. **αDianthus caesius grandiflorus**, *p. st. f* 0.40

Lage variëteit; zeer rijkbloeiend met roseroode bloempjes; uitstekend rotsplantje.

Juni-Aug. **αDianthus graniticus** (20 cm.) . . *p. st. f* 0.40

Zeldzaam rotsplantje met een menigte lichtrose bloempjes.

Juni-Juli. **α†Dianthus plumarius Duchess of Fife**, *p. st. f* 0.20

Zeer rijkbloeiend, rose, laaggroeiend. Zeer geschikt voor rotspartijen. Een der mooiste.

Mei-Juni. †**Diclytra eximia** (30 cm.) . . . *p. st. f* 0.15

BLOEITIJD.

Juni-Juli. †**Diclytra formosa** (30 cm.) . . *p. st. f* 0.15

Boven het fijn ingesneden loof verheffen zich de kleine hangende roode bloemen.

Mei-Juli. †**Diclytra spectabilis** (*Gebroken hart*) (60 cm.),
p. st. f 0.25

Zoowel de elegante bladeren als de fijne roode hartvormige losse bloemen geven de plant een bevallig aanzien.




Dictamnus caucasicus.

Juni-Juli. †**Dictamnus caucasicus** *p. st. f* 0.20

Deze nieuwe en zeldzame soort is veel schooner dan de bekende *D. Fraxinella*, daar de bloemen op meer dan een Meter hoge stengels zijn gezeten en geheel boven de bladeren uitkomen.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "

*Dictamnus Fraxinella alba.*

BLOEITIJD.

Juni-Juli. †*Dictamnus Fraxinella*, rood (60 cm.), p. st. f 0.15„ „ † „ „ „ *alba*, wit, „ „ - 0.15

Beide bovenstaande planten worden ook wel *Esschenkruid* of *Vuurwerkplant* genoemd. Het blad komt veel overeen met dat van den Esch en zooals de afbeelding doet zien, komen de schoone bloemen er flink boven uit. Deze hebben de merkwaardige eigenschap, dat zij een vluchtige olie afscheiden, die ontploft, zoodra men er een brandende lucifer bij houdt. Ze verdienen ten volle een plaatsje in onzen bloementuin en bloeien het schoonst wanneer ze eenige jaren gestaan hebben, zonder te zijn verplant.

Sept.-Nov. †*Diplostegium amygdalinum* (120 cm.),
(*Boltonia latisquama*) p. st. f 0.15

De bloemstengels vertakken zich van boven sterk en brengen een groote menigte witte bloemen voort, die gelijken op herfst-Asters.

Maart en Aug. †*Doronicum plantagineum excelsum*,
(*Hapur Crewe*) (90 cm.), p. st. f 0.15
(Zie afbeelding blz. hiernevens.)

Bloei zeer lang met een overvloed van schoone goudgele bloemen. Zij kan zowel in de schaduw als in de volle zon gekweekt worden.

Aug.-Oct. †*Echinacea (Rudbeckia) purpurea* (1 M.),
p. st. f 0.15

Een van de meest opvallende herfstbloeiërs met groote bloemhoofdjes op lange stevige stengels. Kleur purper-rood met kegelvormig donkerbruin midden.

Aug.-Oct. †*Echinacea (Rudbeckia) tubiflora*, (1 M.),
p. st. f 0.30

Juli-Aug. †*Echinops humilis* (90 cm.) . . . „ „ - 0.20
Een der beste soorten van de blauwe Kogeldistels.

Juli-Aug. †*Echinops nivalis* (1 M.) . . . p. st. f 0.15
Witte Kogeldistel.

Juli-Aug. †*Echinops Ritro* (60 cm.) . . . p. st. f 0.15
Kogeldistel met van stekels voorziene, groene bladeren en fraaie hemelsblauwe bloemhoofdjes.

Elymus glaucus (120 cm.) p. st. f 0.20
Siergras met blauwgroen loof.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

† **EPIMEDIIUM.**

Onder de vroegbloeiende planten nemen de *Epimedium's* een voorname plaats in. De bloemen doen dikwijls denken aan kleine Orchideeën en komen reeds in Mei te voorschijn. Ook de bladeren zijn zeer fraai gevormd en kunnen even zoo goed als de bloemen voor bindwerk worden gebruikt. Zij kunnen ook in de schaduw worden geplant en gedijen in bijna elken grond. H. 30 cm.

E. bicolorum p. st. f 0.15
„ *coccineum* „ „ - 0.15
„ *erectum* „ „ - 0.15
„ *grandifl. album* „ „ - 0.15
„ *lilacinum* „ „ - 0.20
„ *macranthum* „ „ - 0.20

Zowel de bevallige blaadjes als de fijne melkwhite losse bloemen leveren een uitmuntend materiaal voor bouquets.

E. niveum p. st. f 0.15

De bloemen dezer soort zijn zuiver wit en zeer schoon.

E. pinnatum elegans p. st. f 0.55

Dit is zonder twijfel een der mooiste *Epimediums*. Zij bloeit bijzonder rijk met prachtige, groote, goudgele bloemen. Een der beste voorjaarsbloeiërs.

E. sulphureum p. st. f 0.20
Zeer fraaie soort met sierlijke zwavelgele bloemen.

EREMURUS.

Van deze zeer interessante plantengroep heb ik sedert enkele jaren speciaal werk gemaakt en kan ik thans de hieronder opgegeven collectie (welke bestaat uit de beste mij bekende soorten) aanbieden. Het is een zeer merkwaardige groep van planten, waarvan enkele soorten reusachtige afmetingen in bladeren en bloemstengels bereiken, terwijl andere een meer bescheiden groeiwijze hebben.

Enige wenken omtrent de behandeling volgen hier.
De plant (voor zoover het ondergrondse gedeelte betreft) bestaat uit een krachtige neus of kiem, omringd door een 6 tot 12-tal dikke rechte wortels, die een lengte bereiken van 50 à 100 cm., naar gelang van soort en ouderdom.

Bij het planten dient er op gelet dat alle wortels in bijna horizontale richting in den grond worden uitgespreid, eenigszins aflopend van het hart der plant, terwijl de neus slechts weinig onder de oppervlakte komt. Deze houding, in een goed gedraineerd en flink met oude koemest onder de planten bemeste grond, bevordert een zoo volkomen mogelijke ontwikkeling.

De plant sterft jaarlijks in Augustus tot den grond af en bevindt zich dan vanaf dit tijdstip tot het eind van October in een volkomen rustperiode, gedurende welke tijd zij zoo droog mogelijk moet gehouden worden. Het is hierom dat ik, als de beste behandeling, het in Augustus opnemen der planten en tegen eind October weer uitplanten kan aanbevelen. Men kan ze dan tijdens de rustperiode op een volkomen droge plaats bewaren.

Het planten moet liefst in het najaar geschieden, in October of uiterlijk tot half November. Desnoods kan men ook planten in Februari of begin Maart. Gedurende den winter is het raadzaam overvloedige vochtigheid te vermijden en zorg men dus voor goed losgewerkte grond, waardoor het water zich gemakkelijk kan verwijderen en overdekte men de planten hetzij met een omgekeerden grooten bloempot of met turfstrooisel.

Reeds in Maart beginnen de planten zich te ontwikkelen en groeien dan bewonderenswaardig vlieg. Zeer spoedig na het rozen van schoon-gevoerde lichtgroene bladeren volgt de sierke bloemstengel, die in een lange tros van talloze kleine, geel, wit of rose gekleurde bloemen eindigt. Deze zeer decoratieve planten kan ik een ieder ten zeerste aanbevelen, die ze een zonnige, eenigszins tegen wind beschutte plaats kan geven.

Alle soorten worden in bloei bare planten geleverd.

BLOEITIJD.

Juli. *E. Bungei* p. st. f 2.25

Hoog pl.m. 1 Meter, bloemen levendig geel. Hoewel een zeer aparte, mooie soort, is dit nogal een zwakke groeier, die nogal eens dood gaat na den bloei. De andere soorten zijn veel sterker.

Juni. *E. Elwesianus* p. st. f 1.50

Krachtige stengels van 2½—3 M. hoog; bloemen zacht rosc. De mooiste van alle.

Juni. *E. himalaicus* p. st. f 0.90

Deze wordt 2—2½ M. hoog en heeft zuiver witte bloemen.



Doronicum plantagineum excelsum.

(Voor beschrijving zie blz. hiernevens.)

*Eremurus robustus.*

BLOEITIJD.

Juni. **E. robustus** p. st. f 1.50

Stengels ter hoogte van $2\frac{1}{2}$ —3 M., met zacht rose bloemen.

Juni. **Eremurus robustus superbis** ($2\frac{1}{2}$ —3 M.), p. st. f 1.50

Sterkgroeiende kruising met roseachtig witte bloemen.

Erica's, zie vervolg *Vaste Planten*, blz. 96.

Juli-Aug. †**Erigeron Asa Gray** (30 cm.) . p. st. f 0.20

Nieuwe verscheidenheid met abrikooskleurige bloemen.

Juli-Sept. †**Erigeron elatior Antverpia** (80 cm.) p. st. f 0.25

Rijk en lang bloeiende nieuwe variëteit, met zeer groote lila-kleurige bloemen.

Juni-Juli. †**Erigeron glabellus**, lila . . . p. st. f 0.15

Juli-Sept. †**Erigeron intermedius** (50 cm.), „ „ - 0.20

Rijkbloeiende soort met groote zacht lavendel-kleurige bloemen. Kan tot een der fraaiste en beste *Erigerons* worden gerekend.

Juni-Aug. †**Erigeron mesa grande speciosus grandiflorus** (80 cm.) p. st. f 0.15

Een der rijkstbloeiende planten, die onder den naam van *Aster* enkele jaren geleden is ingevoerd. De groote donkerblauwe bloemen zijn goed gevormd en op stevige stengels gezeten.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

*Erigeron speciosus.*

BLOEITIJD.

Juli-Oet. †**Erigeron speciosus grandiflorus**

(60 cm.), p. st. f 0.20

„ † „ „ „ **superbus** (60 cm.), p. st. f 0.15

Beide bovenstaande soorten zijn buitengewoon rijkbloeiend, met prachtige lila bloemen met geel hart. Die der eerste zijn donkerder gekleurd en iets grooter. Zij bloeien tot in den winter en zijn onschatbaar voor bouquetwerk en ook voor perken.

Juni-Sept. †**Erodium manescavi** (30 cm.) . p. st. f 0.20

Buitengewoon dankbaar bloeiende plant met lange stevige bloemstengels. De bloemen zijn paarsrood en de plant bloeit den geheelen zomer tot laat in den herfst. Zij moet des winters iets gedekt worden.

†**ERYNGIUMS.**

(Edeldistels).

De eigenaardig gevormde bloeiwijze en de mooi staalblauwe kleur die de stengels der meeste soorten aannemen, maken de Edeldistels tot de meest gezochte planten voor vulling van groote vazen. De afgesneden stengels blijven eenige maanden goed, hetgeen slechts van weinig planten kan gezegd worden.

BLOEITIJD.

Juli-Aug. **E. alpinum** (75 cm.) p. st. f 0.15

Wel een der schoonste van dit geslacht; de groote, sierlijk gevormde bloemhoofdjes zijn evenals de bloemstengels van een heldere, staalblauwe kleur. De bovenste bladeren zijn zeer fijn ingesneden.

Aug. **E. Bourgatli** (50 cm.) p. st. f 0.25

Prachtige edeldistel met donkerblauwe bloemen. De blauwe bloemstengels zijn evenals de stevige, grijs-groene bladeren wit geaderd.

*Eryngium giganteum.*

BLOEITIJD.

Juni-Juli. *E. giganteum* (60 cm.) p. st. f 0.15

Deze wordt ook Ivoordistel genoemd. In vorm komt zij veel overeen met *E. Oliverianum*, maar de kleur is prachtig zilverwit.

Juli-Sept. *E. Oliverianum* (60 cm.) p. st. f 0.15
(Zie afbeelding.)

Deze soort moet niet verward worden met de *Eryngium amethystinum*, onder welken naam ze dikwijls verkocht wordt. De kleur is prachtig staalblauw. De bloemen blijven na afgesneden te zijn, geruimen tijd geheel onveranderd en maken een zeer schoon effect, wanneer er eenige bij elkaar in een vaas worden geplaatst.

Om ze lang goed te houden, moet men ze, zoodra ze afgesneden zijn, een paar weken onderstboven op een drooge, donkere, luchtige plaats ophangen.

Juli-Oct. *E. planum* (90 cm.) p. st. f 0.15

Met kleine helderblauwe bloemen, welker stengels ook blauw worden.

Juni-Oct. *E. planum coelestinum* (90 cm.) p. st. f 0.15

Belangrijke verbetering der voorgaande met donkerder blauw gekleurde bloemen en stengels. Prachtige snijbloem.

Aug. *E. Springhill Seedling* (70 cm.) p. st. f 0.20

Schitterende nieuwe variëteit. De bloemen en stengels hebben een prachtige donker staalblauwe kleur.

Juli-Aug. *Erythrochaete pinnatifida* (90 cm.) p. st. f 0.25

Zeer decoratieve plant met groote grillig gevormde ingesneden bladeren en groote gele bloemen.

*Eryngium Oliverianum.*

BLOEITIJD.

Sept.-Oct. *Eupatorium purpureum* p. st. f 0.25

Zeer decoratieve plant met groote paarsroode bloemschermen, groeit bijna 2 Meter hoog.

Mei-Juni. *Euphorbia cyparissias* (30 cm.) . p. st. f 0.25

April-Mei. " *polycroma* (30 cm.) . " - 0.30

Deze plant behoort tot de familie der Wolfsmelk; de bloemtrossen zijn heldergeel, terwijl ook de schutbladeren goed gekleurd zijn.

Evonymus radicans fol. var. (30 cm.) p. st. f 0.20

Bontbladerige *Evonymus*.

Juli-Sept. *Fuchsia americana* " - 0.15

Sterke roodbloeiende variëteit.

Juli-Sept. *Fuchsia americana elegans* (60 cm.) p. st. f 0.15

Deze winterharde *Fuchsia* met karmijnroode bloemen is ook wel een plaatsje in den tuin waard, daar zij zeer lang bloeit.

Juli-Sept. *Fuchsia corallina* (60 cm.) p. st. f 0.15

Met koraalroode bloemen.

Juli-Sept. *Fuchsia* *Enfant Prodiges* (60 cm.) " - 0.15

" " *gracilis* (60 cm.) " - 0.15

Deze soort heeft iets fijnere bloemen.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "

BLOEITIJD.

- Juli-Sept. *Fuchsia longipedunculata* (60 cm.) p. st. f 0.15
 " " *Mad. Cornellissen* (60 cm.) " " - 0.15
 " " *profusion* (60 cm.) . . . " " - 0.15
 " " *Ricartonia* (60 cm.) . . . " " - 0.15

Grootbloemige variëteit, welke ook fraai blad heeft.

- Juli-Sept. *Fuchsia Thompsoni* (60 cm.) . . p. st. f 0.15

FUNKIA'S.

Op beschaduwde plaatsen, waar vele planten minder goed groeien, kan men aan deze planten een plaatsje inruimen en men zal er geen spijt van hebben.

De meeste Funkia's worden meer geplant om de ongemeen schoone bladeren, welke in de meest verschillende nuances voorkomen, dan om de lila-achtige klokvormige bloemen, die bij de meeste soorten weinig verschil opleveren. Zij bloeien in juli-Aug. en worden circa 30 à 60 cm. hoog.

- F. Fortunei* p. st. f 0.30

- " " fol. var. " " - 0.40

Deze behooren ongetwijfeld tot de schoonste van alle Funkia's. De groote stevige bladeren zijn bij de eerste blauwgroen gekleurd en de andere heeft donkergroene vlekken, hetgeen een zeer schoon effect maakt. De bloemen zijn van wit tot lichtblauw.

- F. Fortunei robusta* p. st. f 0.45

Eene reuzenvorm van de *F. Fortunei*, met enorm groote bladeren en bloemen.

- F. glauca* p. st. f 0.15

Met fraai blauwgroen blad.

- F. japonica gigantea* " " - 0.25

Met zeer groote bladeren.

- † *F. minor alba* " " - 0.25

Een der schoonste zuiverwitte snijbloemen, 50—70 cm. hoog, zeer rijkbloeiend. Het blad dezer soort is klein.

- F. robusta elegans fol. var.* p. st. f 0.15

Schoon goudbont.

- † *F. subcordata grandiflora* (lilliflora). . . " " - 0.15

Met groot blad en groote witte bloemen op lange stevige stelen.

- F. Thos Hogg* p. st. f 0.15

Variëteit met groote lichtgroene bladeren, welke aan den rand zuiver wit zijn. De bloemen zijn purper-rose.

- F. undulata medio var.* p. st. f 0.15

De mooiste van de witbonte Funkia's; ze wordt zeer veel gebruikt voor randen en maakt dan ook een bijzonder schoon effect. Zeer aan te bevelen.

† GAILLARDIA'S.

De *Gaillardia*'s kunnen tot de schoonste en dankbaarste planten worden gerekend, zoowel door haar langdurigen bloei als door de eindeloze kleurschakeeringen tusschen geel, rood en purper waarin haar prachtige bloemen worden aangetroffen. Voor perken maken zij een nitnuntend effect, terwijl zij in afgesneden toestand zeer lang goed blijven.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "



Gaillardia maxima.

BLOEITIJD.

- Juli-Oct. *Gaillardia maxima*, gem. (75 cm.), p. st. f 0.20

10 stuks in 10 soorten op naam . . . - 2.50

5 " " 5 " " " " . . . - 1.50

50 " " 10 " " " " . . . - 9.—

50 " " 5 " " " " . . . - 7.50

- Juli-Oct. *Gaillardia maxima Lady Rolleston*,

p. st. f 0.25

Deze prachtige plant heeft zeer groote bloemen, 10 cm. in doorsnee, van een helder effen gele kleur met geel hart. De bloemen staan op lange stevige stengels; voortreffelijke snijbloem.

[*Galega bicolor Hartlandi*.]

BLOEITIJD.

Juli-Sept. †*Galega bicolor Hartlandi* . . . p. st. f 0.15

Deze plant vormt groote struiken van een Meter hoog, die in Juli-Aug. overdekt zijn met een menigte fraaie, wit en blauw gekleurde bloemtrossen.

Juli-Sept. †*Galega Duchess of Bedford* . . . p. st. f 0.20

Nieuw, van fraaie, gedrongen groei, ± 90 cm. hoog; lavendelblauwe en witte bloemen; zeer mooi.

Juli-Sept. †*Galega His Majesty* (100 cm.), p. st. f 0.20

Hooggroeiend, iets donkerder dan *G. Hartlandi*.

Juli-Sept. †*Galega Niobe* (80 cm.) . . . p. st. f 0.20

Met lange trossen zuiver witte bloemen.

Juli-Aug. †*Galega officinalis carnea plena*, „ „ - 0.20

Met vleeschkleurige, dubbele bloemen.

Juli-Aug. †*Galega officinalis fl. albo* . . . „ „ - 0.20

Zeer rijkbloeiend met zuiverwitte vlinderachtige bloemen.

Juni-Juli. †*Gentiana sagittalis* (kruipend) . . . p. st. f 0.15

Prachtige kruipende rotsplant met een groote menigte heldergele bloemen; neemt zelfs de droogste en schraalste standplaats voor lief.

BLOEITIJD.

Juni-Juli. †*Gentiana sibirica fl. pl.* . . . p. st. f 0.20

Schoone laaggroeiende, heesterachtige rotsplant, uitmuntend door rijken bloei, met dubbele heldergele bloemen.

Maart-Juni. †*Gentiana acaulus* (15 cm.) . . . p. st. f 0.30

De *Gentiaan* der Alpen is een der schoonste vaste planten. De trechtervormige 5 à 6 cm. lange bloemen hebben een prachtige, donkerblauwe kleur. Deze plant groeit het best in humusrijken, vochtigen, doch goed gedraineerden grond.

Juli-Aug. †*Gentiana asclepiadea* (60 cm.), p. st. f 0.30

Rijkbloeiend met prachtige, donkerblauwe bloemen.

Juli-Aug. †*Gentiana asclepiadea alba* . . . p. st. f 0.25

Slanke stengels, 60 cm. hoog, met 2 en 3 bloemen in de oksels der bladeren, soms in een tros verschijnend. De kleur is zuiver wit.

Juli-Aug. *Gentiana Thibetica* (30 cm.) . . . p. st. f 0.20

Met groote bladeren en geelachtig witte bloemen.

Juni-Juli. †*Geranium grandiflorum* (40 cm.), p. st. f 0.15

Met helder violetblauwe bloemen.

Juni-Juli. †*Geranium nepalense* (30 cm.) . . . p. st. f 0.15

Deze plant heeft fraaie roode bloemen.

Juli. *Geranium platypetalum* (60 cm.) . . . p. st. f 0.20

Ouderwetsche sierplant met groote paarse bloemen.

Mei-Aug. †*Geranium sanguineum* (20 cm.) p. st. f 0.20

Zeer schoone plant, geschikt voor randen en rots-partijen. De bloemen zijn groot en diep rood-purper-kleurig; zij bloeit den geheelen zomer.

Mei-Aug. †*Geranium sanguineum album* (20 cm.), p. st. f 0.20

Deze schoone, nieuwe variëteit van de voorgaande, heeft prachtige, zuiverwitte bloemen van een lossen, eleganten vorm. Ze bloeit den geheelen zomer en is zeer geschikt voor randen en perken.

Juni-Sept. †*Geum atro-sanguineum fl. pl.* (50 cm.), p. st. f 0.15

Deze *Geum* is de donkerste van haar geslacht en heeft zeer fraaie, goedgevulde, donkerroode bloemen.

Juli-Sept. †*Geum bujaricum* (20 cm.) . . . p. st. f 0.40

Nieuwe soort met groote oranjegele bloemen en groot donkergroen blad.

Juli-Aug. †*Geum coccineum Mrs. J. Bradshaw*, (50 cm.), p. st. f 0.15

Prachtige nieuwigheid met zeer groote, dubbele bloemen van een schitterend scharlakenroode kleur. Zeer rijkbloeiend. Te Londen bekroond.

April-Juni. †*Geum Heldreichi* (45 cm.) . . . p. st. f 0.15

Een vrij nieuwe variëteit met heldere, oranje bloemen en zeer rijkbloeiend.

April-Juni. †*Geum Heldreichi luteum* (45 cm.) p. st. f 0.25

Zuivergele variëteit.

April-Juni. †*Geum Heldreichi magnificum* (45 cm.), p. st. f 0.15

Mei-Aug. †*Geum Heldreichi splendens (superbus)* (45 cm.), p. st. f 0.15

Belangrijke verbetering der bekende *G. Heldreichi* met groote bloemen van het zuiverste oranje.

Mei-Juni. †*Geum montanum aurantiacum* (30 cm.), p. st. f 0.25

Nieuwe variëteit met glanzige, groote, donker-groene bladeren en groote gele bloemen.

Mei-Juni. †*Geum montanum maximum* (30 cm.) p. st. f 0.20

Met groote zuivergele bloemen.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

BLOEITIJD.

Juni-Sept. *Geum pyrenaicum* (30 cm.) . . p. st. - 0.25
Met gele bloemen.

Juli-Aug. †*Gillenla trifoliata* (60 cm.) . . „ „ - 0.15

Deze plant, ook wel ten onrechte *Spiraea* genoemd, heeft zeer losse bloemtulpen met fijne witte franjeachtige bloemen. Prachtig voor bouquets. Als de planten eenige jaren op dezelfde plaats hebben gestaan, worden ze meer dan een Meter hoog.

Glechoma hederacea florentina, kruipend, p. st. f 0.25

Glyceria spectabilis fol. var., (zie *Waterplanten*.)

Juli-Sept. *Gnaphalium margaritaceum* (40 cm.), p. st. f 0.20

Eigenaardige plant met wollige, lichtgrijze bladeren en bloemen, welke laatste veel aan Immortellen doen denken.


Juni-Juli. *Gnaphalium Leontopodium*, *Edelweiss*,
(15 cm.), p. st. f 0.15

Dit is het lieve Alpenplantje, dat steeds de aandacht trekt van alle reizigers, die Zwitserland bezoeken en meestal als een souvenir van hunne reis wordt medegenomen. Het groeit daar op rotsen en berghellingen. De bladeren zoowel als de witte stervormige bloemen zijn geheel wolachtig en de plant heeft daardoor een zeer eigenaardig aanzien. Op rotspartijen maakt het een ongemeen schoon effect. Het groeit best in lichten zandgrond met steenen vermengd.

Gunnera }
Gynerium } zie *Gazonplanten*.

Juli-Aug. †*Gypsophila paniculata*, *Gipskruid*, (60 cm.)
p. st. f 0.15

De zeer talrijke, kleine, lichtroze bloempjes, welke op fijne dunne stengels zijn gezeten, geven aan deze plant een zeer schoon en bevallig aanzien. Uitmuntend voor bouquets.



Gypsophila paniculata flore pleno.

Juli-Sept. †*Gypsophila paniculata flore pleno*, p. st. f 0.20

Bijzonder schoone vaste plant en zoowel voor snijbloem als voor alleenstaande plant aan te bevelen.

De bekende enkele variëteit was steeds onmisbaar bij het vervaardigen van bloemwerken, doch deze nieuwe *Gypsophila* bezit in ieder opzicht nog grootere waarde. Doordat de bloempjes gevuld zijn, heeft de bloeiende plant het uiterlijk van een dichte, witte wolk. Als alleenstaande plant maakt ze een prachtig effect, daar hare

bloemstengels zelfs wel een Meter lang worden. Wanneer de bloemen, voordat ze geheel zijn uitgebloeid, worden afgesneden, blijven ze eenige maanden goed. Men moet ze dan in vazen zonder water zetten.

BLOEITIJD.

Juli-Aug. *Gypsophila prostrata rosea* . . p. st. f 0.25

Kruipende variëteit met schoone rose bloempjes.

Juni-Aug. *Gypsophila repens monstrosa*, p. st. f 0.20

Deze heeft grootere bloemen dan de andere *Gypsophila*'s, bloeit ook ruim een maand vroeger en heeft daarbij een uiterst losse groeiwijze, waardoor zij uitmuntend geschikt is voor snijbloemen. Bloeit den geheelen zomer met elegante witte bloemen.

Juni-Aug. *Gypsophila repens rosea* . . p. st. f 0.25

Kruipende *Gypsophila* met tamelijk groote rose gekleurde bloempjes.

†*Harpallum rigidum*, zie *Helianthus rigidus*.

Juni-Aug. *Hedysarum multijugum* (60 cm.), p. st. f 0.25

Sterk vertakt, heesterachtig gewas met zeer schoone roode vlindervormige bloemen; bloeit rijk en lang.

† HELENIUM.

Aug.-Nov. *H. autumnale* *Gartensonne* . . p. st. f 0.25

De schitterend goudgele bloemen dezer nieuwe variëteit hebben een fluweelachtig hart.

Juli-Oct. *H. autumnale superbum rubrum* (150 cm.),
p. st. f 0.15

Prachtige nieuwe variëteit met vlammend roode bloemen. Door den hoogen, stevigen groei en de feite kleur der bloemen is deze plant bijzonder geschikt om tusschen heesters te worden geplant, waar ze dan zeer veel effect maakt.

Juli-Sept. *H. Bigelowi* (60 cm.) . . p. st. f 0.20
(Zie afbeelding blz. hiernevens.)

Met heldergele bloemen, die een donkerbruin hart hebben.

Juli-Sept. *H. grandicephalum comp. bicolor* (1 M.),
p. st. f 0.20

Juli-Aug. *H. grandicephalum Julisonne* (1 M.),
p. st. f 0.30

Prachtige nieuwigheid met groote donkergele bloemen, die aan den rand lichtbruin geschadwd zijn.

Juni-Sept. *H. Hoopesi* (60 cm.) . . p. st. f 0.20

Deze schoone *Helenium* heeft veel overeenkomst met *H. Bigelowi*, maar de bloemen zijn helder oranje.

Juli-Sept. *H. pumilum magnificum*, p. st. f 0.15

Rijkbloeiende plant van $\pm 2\frac{1}{2}$ voet hoog. Bloemen van groote afmeting en zachtgele kleur.

Aug.-Oct. *H. Riverton Beauty* (150 cm.), p. st. f 0.15

Zeer rijkbloeiende nieuwe *Helenium* met krachtigen groei en bloemen van een fijne citroengele kleur, fraai afstekend bij het zwart purpuren centrum.

Aug.-Oct. *H. Riverton Gem.* (150 cm.) . . p. st. f 0.15

Eene sterk groeiende zaailing der reeds oude variëteit „*Striatum*” die zeer rijk bloeit met goudgele bloemen en een terracotta weerschijn.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend,

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

*Helianthemum Bigelowii.*

BLOEITIJD.

Juni-Juli. †*Hellanthella quinquenervis*. . . p. st. f 0.25

Fraaie snijbloom, met slanke 1 M. hooge, sterke stengels. Zeer rijkbloeiend met schoone, gele bloemen die een doorsnede hebben van 12 cm.

Juni-Aug. *aHellanthemum amabile fl. pl.* (20 cm.) . . . p. st. f 0.20

Zeer eigenaardig en schoon rotsplantje, ook wel zonne-roosje genoemd. De bladerengroei is compact en gedrongen, terwijl de plant des zomers steeds bedekt is met een onnoemelijk aantal gevulde seharlakenroode bloemen. Zeer geschikt voor rotspartijen.

Juni-Aug. *aHellanthemum amabile Orange double* (20 cm.), p. st. f 0.20

Deze variëteit heeft fraaie, helder oranjekleurige bloemen en is overigens gelijk aan de voorgaande.

†**HELIANTHUS.****(Overblijvende Zonnebloem.)**

Deze behoort met zijne soorten en variëteiten tot de dankbaarste planten, daar zij in elken grond slagen en weinig eischen stellen aan de behandeling.

Aug.-Sept. *H. doronicoides* (120 cm.) . . . p. st. f 0.15
Kleinbloemige overblijvende Zonnebloem.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "

BLOEITIJD.

Sept.-Oct. *H. microcephalus* (120 cm.), . . . p. st. f 0.20
Met zwavelgele, kleine, elegante bloemen op lange stengels.

Sept.-Oct. *H. multiflorus D. Dewar* (125 cm.), . . . p. st. f 0.15

" " " " " *flore pleno*, (150 cm.), . . . p. st. f 0.20

" " " " " *maximus* (200 cm.), . . . p. st. f 0.25

" " " " " *Nuttali* (100 cm.) . . . " " - 0.20

Laagblijvende, zeer vroegbloeiende Zonnebloem. Elegante, enkel gele bloemen met zwart midden.

Juli-Sept. *H. rigidus* (120 cm.) . . . p. st. f 0.15

Sierlijke, rijkbloeiende, gele, overblijvende Zonnebloem.

Juli-Sept. *H. rigidus D. Dewar* (120 cm.) . . . p. st. f 0.15

Donkergele bloemen met spits toeloopende bloembladen (straalbloemen).

Aug.-Oct. *H. rigidus H. G. Moon* (130 cm.), p. st. f 0.15

Met groote, gele bloemen.

Juli-Sept. *H. rigidus Ligeri* (150 cm.) . . . p. st. f 0.15

Een der schoonste, overblijvende Zonnebloemen met groote, heldergele bloemen.

Juli-Sept. *H. rigidus Miss Mellish* (180 cm.), p. st. f 0.15

Deze onderscheidt zich van de voorgaande door grootere en half dubbele bloemen, die op de wijze der Cactus-Dahlia's eenigszins omgebogen zijn.

Aug.-Oct. *H. rigidus Miss Willmott* (150 cm.),

Met groote, halfdubbele, gele bloemen . . . p. st. f 0.15

Juni-Aug. *H. rigidus praecox* (120 cm.) . . . " " - 0.15

Vroeg bloeiende soort, iets kleiner dan de voorgaande, doch dezelfde kleur van bloemen. Evenals de vorige zeer geschikt voor snijbloemen.

Sept.-Oct. *H. strumosus* (150 cm.) . . . p. st. f 0.20

Laatbloeiende variëteit met tamelijk groote, goudgele bloemen in trossen.

Hellchrysum Bellidifolium p. st. f 0.40
Prachtig rotsplantje.

Juli-Sept. †*Hellopsis Pitcheriana* (150 cm.), p. st. f 0.25
Met oranjegele bloemen.

Juli-Sept. †*Hellopsis scabra major* (100 cm.), " " - 0.25

Losse plant met heldergele bloemen, die een donkerbruin hart hebben.

Juli-Sept. †*Hellopsis scabra zinnaeflora*, p. st. f 0.20

Deze nieuwe variëteit groeit slechts 60 cm. hoog; de prachtig goudgele bloemen hebben een doorsnede van 7 à 8 cm. en doen aan dubbele Zinnia's denken. Weinige planten overtreffen deze aan rijkbloeiendheid.

Nov.-Maart. †*Helleborus niger angustifolius* (Mad. Fourcade) p. st. f 0.70

Rijkbloeiende Kerstroos, met fraaie, zuiverwitte bloemen. Deze soort munt uit door krachtigen, gezonden groei en is minder dan de andere Kerstroos vatbaar voor ziekte.

Nov.-Maart. †*Helleborus niger grandiflorus*, grootbloemige Kerstroos (20 cm.) . . . p. st. f 0.45

Daar de Kerstroos bloeien op een tijd dat men tevergeefs andere bloemen op den open grond zou zoeken, kunnen zij als sierplanten zoowel als voor snijbloemen niet genoeg worden gewaardeerd. De schoone, zuiver witte bloemen steken fraai af bij de donkergroene handvormige, glanzige bladeren. Opdat de bloemen in den winter niet te veel van den wind en regenvlagen te lijden hebben, geve men de planten een beschutte en half beschaduwde standplaats. Als men er een raam over legt, blijven de bloemen langer mooi.

† **HEMEROCALLIS.**

BLOEITIJD.

Juli-Aug. **H. Ajax** (60 cm.) p. st. f 0.45
Nieuwe variëteit met oranjegele bloemen.

Juli-Aug. **H. aurantiaca major**, (60 cm.) . . p. st. f 0.30
Deze plant werd voor eenige jaren uit Japan ingevoerd. De bloemen zijn zeer groot en hebben een prachtige, oranje kleur. Deze soort kan zonder twijfel een der schoonste genoemd worden.

Juli-Aug. **H. Aureole**, (60 cm.) p. st. f 0.25

Uit Japan ingevoerde, nieuwe soort, die ongeveer 2 voet hooge dichte planten vormt. Zij brengt eene menigte vertakte bloemstengels voort, voorzien van talrijke glanzend donker oranje bloemen, die aan de buitenzijde roodachtig getint zijn.

Juli-Aug. **H. citrina**, (80 cm.) p. st. f 0.55

Zeldzame, uit China ingevoerde variëteit met langwerpige trechtervormige bloemen van licht citroen gele kleur.

Juni-Juli. **H. flava**, (70 cm.) p. st. f 0.15

Juli-Aug. **H. flava major** (60 cm.) . . . p. st. f 0.20

Zuiver gele welriekende bloemen.

Mei-Juni **H. fulva fl. pl.** (60 cm.) p. st. f 0.20

Met dubbele bloemen.

Mei-Juni. **H. hybrida Apricot** (60 cm.) . . p. st. f 0.15

Kruising met oranjekeurige bloemen.

Juni-Aug. **H. hybrida Sovereign** (70 cm.), p. st. f 0.20

Met licht oranjegele, groote, schoon gevormde bloemen. De bloembladen zijn breed.

Juli-Aug. **H. luteola** p. st. 0.20

Prachtige, oranjegeel gekleurde hybride tusschen Hemerocallis aurantiaca major en H. Middendorffiana, welke zeer rijk bloeit.

Juni-Aug. **H. luteola major** (70 cm.) . . p. st. f 0.55

Juli-Aug. **H. Middendorffiana** (50 cm.) . . p. st. f 0.30

Met fraaie, lelieachtige, oranjegele bloemen.

Mei-Juni. **H. Queen of May** (75 cm.) . . p. st. f 0.45

Een der vroegste bloeiers.

Juli-Aug. **H. Sir Michael Foster** (90 cm.), p. st. f 0.30

Nieuwe variëteit met enorm groote, zuivergele bloemen.

HEPATICAS.

De Hepatica's of Leverbloemen moet men een half beschaduwde niet te droge standplaats geven. Zij bloeien zeer vroeg en men kan ze onder de schoonste voorjaarsbloemen rangschikken. Bloeitijd Febr.-April (20 cm.)

H. triloba, blauw p. st. f 0.20

„ „ **fl. pleno**, dubbel blauw . . . „ „ - 0.60

„ „ **alba**, wit „ „ - 0.30

„ „ **rubra**, rood „ „ - 0.30

„ „ „ **fl. pl.**, dubbel rood . . „ „ - 0.30

BLOEITIJD.

Juli. **Heracleum Mantegazzianum** (150 cm.), p. st. f 0.30

Gazonplant met reusachtige bladeren en witte bloem-schermen.

a † **HEUCHERA'S.**

BLOEITIJD.

Mei-Juni. **H. alba** (60 cm.) p. st. f 0.25

Witbloeiende variëteit, welke bloemtrossen veel overeenkomst hebben met *H. sanguinea*, behalve de kleur.

Juli-Aug. **H. brizoides Flambeau** (60 cm.) . p. st. f 0.20

Aanbevelenswaardige variëteit welke rijk bloeit met bloemen van een schitterend rose kleur. De stengels bereiken een hoogte van 50 à 60 cm.

Juli-Aug. **H. brizoides gracillima** (60 cm.) p. st. f 0.15

De bloempjes dezer nieuwe variëteit zijn zeer fijn, zacht-rose gekleurd en op lange stengels met draadvormige steeltjes gezeten, waardoor zij een der beste is voor de binderij.

Juli-Aug. **H. gracillima Perry's var.** (60 cm.) p. st. f 0.30

Prachtige, nieuwe variëteit met karmijnroode bloemen.

Juli-Aug. **H. PLUIE DE FEU** (50 cm.) . . p. st. f 0.15

Zeer mooie nieuwigheid met elegante trossen vuurroode bloemen; rijkbloeiend. Door de felroode kleur trekken de bloemen reeds van verre de aandacht.

Juni-Juli. **H. rosea grandiflora** (60 cm.) . p. st. f 0.30

Zeer lange bloemstengels met groote rose bloemen.



Heuchera sanguinea.

Mei-Juni. **H. sanguinea robusta** (60 cm.) . p. st. f 0.20

Juni-Juli. **H. sanguinea Shirley** (50 cm.) . „ „ - 0.25

Met koraal-scharlakenroode bloemen. Zonder twijfel een der mooiste roode Heuchera's.

Juni-Juli. **H. sanguinea splendens** (50 cm.), p. st. f 0.15

Mei-Juni. „ „ **Walkers var.**, „ „ - 0.20

Bovenstaande variëteiten van *Heuchera sanguinea* hebben prachtige, bloedroode bloemen, welke leeuwenbekachtig zijn gevormd en op zeer dunne bloemstengels zijn gezeten. De plant heeft bijzonder bevallige, ijle bloemtrossen. Voor bouquets onovertreffbaar.

Juni-Sept. **aHieracium aurantiacum** (40 cm.), p. st. f 0.15

Alpenplant met levendig gekleurde, van goudgeel naar oranje en purper overgaande bloemhoofdjes.

Juni-Sept. **aHieracium rubrum**, rood . . p. st. f 0.15

Holcus, zie *Siergrassen*.

April-Juli. **aHoustonia serpyllifolia** (10 cm.), p. st. 0.25

Lief klein alpenplantje met hemelsblauwe bloempjes.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

BLOEITIJD.

April-Mei. *aHutchinsia alpina* p. st. f 0.20

Aardig alpenplantje met schitterend groene bladeren en zuiver witte bloemen. Bloeit vroeg in het voorjaar. Groeit het best op drooge plaatsen.

Juli-Oct. †*Hypericum calycinum* p. st. f 0.15

Heesterachtige plant, die ongeveer 50 cm. hoog wordt en bedekt is met een groote menigte zuiver gele bloemen, terwijl elke bloem is voorzien van talloze zuivergele meeldraden, die haar een zeer eigenaardig effect geven.

Juli-Aug. *aHypericum fragile* p. st. f 0.25

De draadvormige stengels met kleine blaadjes kruipen over den grond en dragen een groote menigte goudgele bloemen.

Juli-Oct. †*Hypericum Moserianum* (30 cm.) p. st. f 0.15

Met groote, gele bloemen, die met hare talrijke goudgele meeldraden een schoon effect opleveren.

Juli-Aug. †*Hypericum olympicum gracile* (15 cm.)
p. st. f 0.25

Vrij lange takken met mooie gele bloemen.

April-Juni. †*Iberis coraeifolia* (20 cm.), . p. st. f 0.15

„ *alberis sempervirens* Little Gem., (10 cm.)
p. st. f 0.15

Een dwergachtige plant, die gedrongen en dicht groeit met sneeuwwitte bloempjes.

April-Juni. *alberis sempervirens* Snowflake (20 cm.),

Met groote sneeuwwitte bloemen. p. st. f 0.15

April-Juni. †*Iberis sempervirens superbus*, (30 cm.)
p. st. f 0.15

Bovenstaande Iberis-soorten zijn een langen tijd overdekt met schoone zuiverwitte bloemen en bij uitstek geschikt voor rotspartijen en perkjes.

Imperata, zie Siergrassen.

Juni. †*Incarvillea Delavayi*, (60 cm.) . . p. st. f 0.15

Schoone, uit China afkomstige plant, welke aan lange stengels groote op Gloxinia's gelijkende bloemen van karmijnachtig rose kleur voortbrengt.

Mei. *incarvillea grandiflora* (30 cm.) . . p. st. f 0.15

De bloemen komen in vorm veel overeen met die van Inc. Delavayi, maar zijn veel grooter, fraaier en donkerder gekleurd.

Juni-Juli. *INCARVILLEA GRANDIFL. BREVIPES*,
p. st. f 0.30

Nieuwe variëteit, welke nog zeer zeldzaam is, veel gelijkend op de voorgaande, wat grootte en kleur der bloemen betreft, maar de stengels bereiken een hoogte van 45 cm.

Juli-Sept. †*Inula ensifolia* (30 cm.) . . p. st. f 0.30

Vormt dichte polletjes, die in den zomer overdekt zijn met een massa goudgele bloemen.

Juli-Aug. †*Inula glandulosa grandiflora*, p. st. f 0.15

Met zeer groote oranjegele straalbloemen.

†*inula grandiflora* p. st. f 0.15

Schoone variëteit met langere stengels en grootere bloemen.

Juni-Aug. †*inula macrocephala* (120 cm.), p. st. f 0.20

Prachtige sierplant met kolossaal groote bladeren. De bloemstengels dragen aan het uiteinde groote, oranjegele bloemen.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „



Iris aurea.

BLOEITIJD.

Aug. †*Iris aurea* (100 cm.) p. st. f 0.20

Hooggroeiende soort met smalle bladeren en zuiver goudgele bloemen.

Juni-Juli. *Iris Forrestii* (60 cm.) p. st. f 0.30

Nieuwe, uit China afkomstige soort met gele bloemen.

† IRIS GERMANICA

De waarde van deze Iris-groep voor onze bloementuinen kan niet licht te hoog worden geschat. Zij zijn verbazend gemakkelijk te kweken, daar zij na het planten niet de minste zorg vereischen en bijna elke grondsoort voor lief nemen. Op een droge en zonnige standplaats zullen zij echter het rijkst bloeien. Zij bloeien Mei-Juni en de prachtige op orchideeën gelijkende bloemen komen in de

† IRIS INTERMEDIA (interregna.)

De volgende nieuwe variëteiten zijn ontstaan door kruising van *Iris pumila* en de mooiste soorten der *Iris germanica* en vullen den bloeitijd tussehen deze beide aan, terwijl ze ook door hare hoogte tussehen beide in staan.

Fritjof p. st. f 0.15

De opstaande bloembladeren zijn helder licht lavendel-blauw, de hangende fluweelachtig violetblauw.

Halldan, effen licht erème-geel p. st. f 0.15

Helge, licht citroengeel " " - 0.15

Ingeborg, grootbl. zuiverwit " " - 0.15

Ivorine, matwit " " - 0.20

Walhalla, lila met wijnrood " " - 0.10

† IRIS KAEMPFERI (90 cM.)

Prachtige groep, geheel verschillend van de andere soorten. De bloemen zijn grooter en wijduitstaand en in de schoonste kleuren. Deze groeien het best in een niet te drogen grond en zijn daarom zeer aanbevelenswaardig voor beplanting van den waterkant. Zij bloeien in Juli-Aug.

Soortenlijst.

Adriaan van der Werf, lila met blauwen grond.

Alex von Humboldt, wit.

Confusius.

Frans Hals, wit met blauwe tint grootbloemig.

Frans van Marls, purper violet.

Glory of Holland, violet.

Heinrich Witte, wit, extra grootbloemig.

Helena van Siebold, rose-lila.

Hendersoni, purperblauw.

Jersey Belle, grootbloemig wit.

Joroshima, paars-rood, lila gestreept.

Mrs. Stanley, paars met donkere aderen.

Nangasaki, rosa-lila, violet gevlekt.

Nippon, wit grootbloemig.

Paulus Moreelse.

Peking, paars-rood met wit eentrum.

Pleter de Hooghe, violet-rood, met zeer licht lila centrum.

Rangoon, blauw, van binnen licht lila.

Rembrandt, paars-rood met witte streepen.

Shirwin, zeer licht rose gespikkeld.

To Kwang, donkerblauw.

Tokio, lila met violetkl. aderen.

W. v. d. Velde, licht lila, violet gemarmerd.

Yokohama, wit met lila tint.

Prijs per stuk f 0.15.

10 stuks in 10 extra soorten naar mijne keus f 1.20.

100 stuks in 10 soorten naar mijne keus f 8.50.

IRIS LAEVIGATA FOL. VAR. . . . p. st. f 0.70

Het breede donkergroene blad is zuiverwit gestreept. Dit prachtige kleuren-contrast maakt deze *Iris* tot de schoonste bontbladerige vaste plant. De bloemen zijn blauw.

Iris laevigata Rose Queen p. st. f 0.45

Prachtige nieuwigheid met langstelige bloemen van eene zeldzame lilarose kleur.

† IRIS PUMILA HYBRIDEN.

Deze nieuwe hybriden zijn ontstaan door kruising der vroegbloeiende *Iris pumila* met grootbloemige *Iris germanica*. Ze bloeien even vroeg als eerstgenoemde en hebben inkleuren en vorm der bloem veel van de laatste overgenomen. Ze bloeien reeds in Mei, dus in een tijd, dat men nog weinig bloemen ziet.

Cyanea, donkerblauw p. st. f 0.10

Die Braut, zuiverwit " " - 0.20

Die Fee, geelachtig wit " " - 0.15

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 6 " " " " " 4 " "

Excelsa, okergeel p. st. f 0.15

Florida, geel " " - 0.15

Formosa, blauw " " - 0.40

Schneekuppe " " - 0.40

Iris van dezelfde groeiwijze als de *germanica* soorten. De opstaande en hangende bloembladeren zijn sneeuw-wit, de laatste aan de keel groengeel geaderd. Stengels 20 cM. hoog.

BLOEITIJD.

Mei-Juni. **Iris virginica** (1 M.) p. st. f 0.20

Juni-Sept. †**Lathyrus latifolius** (1½ M.) " " - 0.20

Overblijvende pronkerwt met rose bloemen.

Juni-Sept. †**Lathyrus latifolius albus** (1½ M.), p. st. f 0.15


Overblijvende pronkerwt met zuiverwitte bloemen.

Juni-Sept. †**Lathyrus latifolius Master Leslie** p. st. f 0.25

Nieuwe, zaecht rose variëteit.

Juli-Oct. †**LATHYRUS LATIFOLIUS ROSE QUEEN**, p. st. f 0.75

Nieuwe grootbloemige helderroze variëteit, in mijne kweekery ontstaan. (Getuigschrift v. Verdienste Amsterdam Augustus 1916).



Lathyrus latifolius White Pearl.

Juli-Oct. †**Lathyrus latifolius White Pearl**, p. st. f 0.30

De fraaiste overblijvende *Lathyrus* met bloemen die dubbel zoo groot zijn als die van de gewone witte. Men telt meestal 14 bloemen op de lange stevige stengels.

Lavatera Olbia p. st. f 0.30

Nieuw ingevoerde heesterachtige plant, behorende tot de familie der Malvaceeën met groote rose bloemen die in grooten overvloed het geheele jaar door verschijnen. Zij begint reeds te bloeien vroeg in Juni en bloeit onophoudelijk door tot het laatst van October of November, wanneer de vorst den bloei vernietigt. Op voedzamen grond bereikt de plant een hoogte van 1½ Meter.

BLOEITIJD.

Juli-Aug. **Lavendula Munstead var.** (30 cm.),
p. st. f 0.20

Vroegbloeiende, lage, nieuwe variëteit van het welriekende Lavendelkruid met groote bloemtrossen van paarse bloemen.

Aug.-Sept. **Liatris scalosa** (60 cm.) . p. st. f 0.15
Met donker-purpere bloemen.

Sept. **Liatris spicata** (45 cm.) . . . „ „ - 0.15
Met lange purperachtig roode bloemen. Zij groeit het best in lichten tuingrond en op een halfbeschaduwde standplaats.

Aug. **Ligularia Jaquemontana** (180 cm.),
p. st. f 0.25

Met zeer groot blad van een blauw-groene kleur en groote, gele bloemtrossen.

Aug. **Ligularia stenocephala** (120 cm.), p. st. f 0.20
De groote bronsgroene bladeren dezer zeer decoratieve plant maken in vereeniging met de goudgele bloemen een schoon effect.

Juli-Aug. **Ligularia stenocephala globosa** (80 cm.),
p. st. f 0.45

Juni-Juli **Linaria pallida** „ „ - 0.20
Zeer laag kruipend plantje, dat rijk bloeit met lila bloemen met witte vlekjes.

Mei-Sept. **Lithospermum prostratum** . p. st. f 0.20
Met donkerblauwe, trechtervormige bloemen.

Mei-Sept. **Lithospermum prostratum Heavenly Blue**,
nieuw, lichtblauw p. st. f 0.20

Beide Lithospermums kunnen tot de mooiste Rotsplanten worden gerekend. De bloemen doen aan de Vergeet-mij-niet denken en steken goed af tegen het donkergroene loof dat over den grond kruipt. Ze bloeien den geheelen zomer.

Juni-Juli. †**Lupinus polyphyllus** (100 cm.), p. st. f 0.15
Krachtige, hooggroeiende Lupine met lange bloemaren in blauwe tinten.

Juni-Juli. †**Lupinus polyphyllus albus** (100 cm.),
p. st. f 0.15

Zuiver witte variëteit der voorgaande. Zeer geschikt voor snijbloemen.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „



Lupinus polyphyllus Moerheimi.

BLOEITIJD.

Juni-Aug. †**Lupinus polyphyllus Moerheimi**, (80 cm.),
p. st. f 0.30

Een der beste nieuwigheden, die wij het genoegen hebben gehad in te voeren. De hoofdbloei valt in den voorzomer, evenwel volgen voor en na nog bloemstengels tot in het najaar. De prachtige trossen verheffen zich flink boven het sterke loof en zijn dicht bezet met rose en wit gekleurde bloemen.

Juni-Juli. †**Lupinus polyphyllus roseus** (100 cm.),
Rose bloeiende Lupine. p. st. f 0.15

Juni-Juli. †**Lychnis chalcedonica alba plena** (60 cm.),
Dubbele witte Konstantinopel. p. st. f 0.20

Juni-Juli. †**Lychnis chalcedonica rubra** (80 cm.),
p. st. f 0.15

Konstantinopel met schitterend scharl. roode bloemen.
Juni-Juli. †**Lychnis chalcedonica rubra plena** (80 cm.),
p. st. f 0.35

Dubbele Konstantinopel met scharlakenroode bloemen.

Mei-Juni. †**Lychnis diurna rosea plena** (60 cm.),
Met groote, dubbele, rozeroode bloemen p. st. f 0.25

BLOEITIJD.

Juli-Oct. **†Lychnis vespertina alba plena** (50 cm.),
p. st. f 0.25

Deze zeer rijk en langdurig bloeiende dubbele witte *Lychnis* is een der schoonste als sierplant zoowel als voor bouquets.

Juli-Sept. **†Lychnis viscaria splendens plena** (40 cm.),
p. st. f 0.15

Fraaie, dubbele, vuurroode *Lychnis*, die buitengewoon rijkbloeiend is. Deze plant, die vroeger meer algemeen bekend was onder den naam van „Pekanjer,” wordt thans weinig meer in de tuinen aangetroffen. Ze verdient echter alle aanbeveling.

Aug.-Sept. **†Lysimachia brachystachys** (60 cm.),
p. st. f 0.20

Met lange witte bloemaren, die afgesneden zeer lang frisch blijven.

Juli-Aug. **Lysimachia dahurica** (60 cm.) . p. st. f 0.45

„ „ **Fortunei** (60 „) . „ „ - 0.40

„ „ **velutina** (60 „) . „ „ - 0.45

Juli-Aug. **†Lythrum roseum superbum** (180 cm.),
Grootbl. helderroze. p. st. f 0.15

Juli-Aug. **†Lythrum roseum superbum Perry's var.**
(90 cm.), p. st. f 0.15
Glanzend kersrood.

„ **† salicaria Brightness** (90 cm.),
p. st. f 0.15

Sierlijke bloemstengels met zuiver rose bloemen.

„ **† salicaria Rose Queen** (90 cm.),
p. st. f 0.20

Helder rose.

„ **† virgatum roseum** (90 cm.),
p. st. f 0.20

„ **† virgatum Rose Queen**,
p. st. f 0.15

Met rose bloemen aan elegante stengels, een der beste van deze klasse.

De *Lythrum*s zijn alle zeer rijkbloeiende zomerbloemen. De bloemen hebben verschillende nuances van rose en zijn dicht aaneen op de lange stengels gezeten.

Juni-Oct. **†Malva alicaea** (180 cm.) . . . p. st. f 0.25

De bloemstengels zijn zeer fijn en ijl. De bloempjes zijn wijnrood.

Juni-Aug. **†Malva moschata** p. st. f 0.15
Rose bloeiende zoogenaamde Kaasjesbloem.



Malva moschata alba.

Juni-Aug. **†Malva moschata alba**, witte Kaasjesbloem,
(60 cm.) p. st. f 0.15

BLOEITIJD.

Juli-Sept. **Meconopsis cambrica fl. pl.** . . . p. st. f 0.30

Schoone zeldzame plant met dubbele, oranjegele bloemen, die aan *Papavers* doen denken.

Nov.-April. **Megasia cordifolia alba** (20 cm.), p. st. f 0.45
Witbloeiend.

Maart-Mei. **Megasia cordifolia purpurea** (40 cm.),
p. st. f 0.25

Groeit forscher dan *M. speciosa* en de bloemen zijn donkerder van kleur.

Nov.-April. **Megasia (Saxifraga) speciosa**, rose (20 cm.),
p. st. f 0.20

De *Megasia*'s behouden hare fraaie hartvormige of ovale lederachtige bladeren ook des winters en bloeien bovendien in een tijd des jaars wanneer men geen andere bloemen ziet. Zeer geschikt voor rotspartijen; groeien ook in vochtigen bodem bij watervallen of vijvers.

Juni-Juli. **Melittis Melissophyllum**, rose (30 cm.), p. st. f 0.25

„ „ „ **album**, wit (30 cm.),
p. st. f 0.25

Bovenstaande beide soorten, behoorende tot de familie der *Labiatae*, zijn zeer gezocht door de bijen.

Mei-Juli. **†Mertensia echioides elongata** (30 cm.),
p. st. f 0.40

Mooie alpenplant met gentiaanblauwe bloemen in menigte.

Mei-Juni. **Mertensia primuloides** p. st. f 0.30

Met diep donkerblauwe bloemen, overgaande in purper en geel oog. Deze soort komt veel overeen met eene *Myosotis* en groeit slechts circa 15 cm. hoog.

Mei-Juni. **†Mertensia sibirica ciliata** (30 cm.), p. st. f 0.25

Blauwe bloemen aan lange bloemstengels, die als trossen hangen en een schoon effect maken.

Meum athamanticum (25 cm.) p. st. f 0.15

De bladeren dezer plant zijn zeer fijn ingesneden en hebben een heldergroene kleur, waardoor dezelve onschatbaar zijn voor bouquets. De bloemen zijn onaanzienlijk.

Juni-Juli. **Monarda didyma**, vuurrood (60 cm.), p. st. f 0.15

Deze en navolgende soorten leenen zich zeer goed voor beplanting van randen aan heesterperken; zij vereischen weinig zorg.

Juni-Juli. **Monarda didyma, Cambridge Scarlet**, p. st. f 0.15

Donkerroode variëteit van de bekende gewone soort.

Juli-Sept. **Monarda violacea superba**, purper-violet,
p. st. f 0.15

† MONTBRETIA'S.

De *Montbretia*'s behooren tot de dankbaarste en rijkstbloeiende planten. Boven de rietachtige bladeren verheffen zich de elegant vertakte bloemtrossen, die gevormd zijn uit sterachtige bloempjes van een kleur, die naar gelang van de soort varieert tusschen geel, oranje en donkerrood. Zeer geschikt voor bouquets.

Het uitplanten der bollen geschiedt in April of Mei; in den herfst moeten ze opgenomen worden om droog en vorstvrij gedurende den winter te worden bewaard. Men kan ze evenwel onder een goede bedekking ook buiten doen overwinteren. Ze bloeien van Juli tot November en groeien circa 60 cm. hoog.

M. America p. st. f 0.15

Rijkbloeiend, met donker oranjegele bloemen en een donkerrood centrum.

M. Brilliant p. st. f 0.15


M. Exceisor „ „ - 0.25

De stevige stengels prikken met een menigte prachtig gevormde fluweelachtig geel gekleurde bloemen. Daar ze sterk vertakt zijn en deze vertakkingen eerst na de hoofdstengel beginnen te bloeien, is de duur van haar bloeitijd langer dan van vele andere soorten.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ 5 „ „ „ „ 4 „ „

† MONTBRETIA's (vervolg).



Montbretia.

M. Geo Davison p. st. f 0.10
Met groote wijdopenstaande licht oranjegele bloemen.

M. Germania p. st. f 0.10
De sterk vertakte bloemstengels worden ruim 1 M. hoog en dragen een menigte groote, wijdopenstaande bloemen, van een prachtige oranje-roode kleur.

M. Goldstrom p. st. f 0.20
Rijkbloeiend, met goudgele bloemen.

M. Hereward p. st. f 0.20
Met mat-oranje wijd openstaande bloemen, die teruggeslagen zijn als een *Lilium Martagon*.

M. King Edmund p. st. f 0.30
Sterke plant; 90—120 cm. hoog; rijk vertakt; met dichte stengels, welke goudgele bloemen dragen, die van buiten donkerder gekleurd zijn, ruim 7 cm. doorsnede hebben en zes tot acht chocoladekleurige vlekken aan de keel vertoonen.

M. Koh-I-Noor p. st. f 0.15
Zuivcr oranje; vorm gelijk aan die van „*Excelsior*.”

M. Lady Hamilton p. st. f 0.15
Deze komt in vorm en bloem veel met eene *Watsonia* overeen; bloeit zeer rijk met gele bloemen. Hoogte 100 cm.; be kroond te Londen.

M. Le Pactole p. st. f 0.15
Prachtige, nieuwe verscheidenheid met groote goudgele bloemen en bruin centrum.

M. Lord Nelson p. st. f 0.25
De donkerste van alle. Groeit ± 1 Meter hoog en heeft zeer donker, purperkleurige stengels, welke goed vertakt zijn. De bloemen hebben een doorsnee van 6½ cm., zijn donker oranje-scharlakenrood en aan de buitenzijde karmozijnrood. De groote bloembladeren zijn van een fraaie vorm, het oog is geel. Zeer mooie variëteit van een nieuwe en prachtige kleur.

M. Martagon p. st. f 0.10

De bloemen zijn groot, donker oranje met bruin hart met teruggeslagen bloembladen, waardoor de bloemen aan die van *Lilium Martagon* doen denken.

M. Messidor p. st. f 0.20
De groote bloemen zijn zacht stroo-geel gekleurd.

M. Norvic p. st. f 0.25
Laaggroeiend, laatbloeiend met groote gele bloemen.

M. Oriflamme p. st. f 0.20
M. Prometheus ” ” - 1.—

Bizonder schoone, uit Engeland ingevoerde nieuwe Montbretia. De bloemstengels worden ongeveer 1 M. hoog, vertakken zich sterk en zijn rijk voorzien van groote oranje-roode bloemen met donkerroode vlek bij het hart. De grootstbloemige.

M. Rheingold p. st. f 0.25

De kleur is schitterend goudgeel, terwijl het iets lichtere centrum bruinachtig karmozijnrood geteekend is.

M. Star of the East p. st. f 2.50

Prachtige nieuwe variëteit met oranjegele bloemen.

M. St. Botoiph p. st. f 0.15
Grootbloemig heldergeel.

M. Tragedie ” ” - 0.25

M. Vesuve ” ” - 0.15
Scharlakenroode bloemen met goudgeel hart.

M. Zonnebloem p. st. f 0.15
Zeer schoone, rijkbloeiende variëteit met oranjegele bloemen.

BLOEITIJD.

Juli-Aug. **Mulgedium giganteum** (1½ M.) p. st. f 0.20
Sierplant met groote bladeren en lichtblauwe bloemen.

Nepeta longiflora (1 M.) p. st. f 0.25
Juni-Juli. **Nepeta Mussini** (30 cm.) ” ” - 0.30

Rijkbloeiend met paarsachtige bloemtrossen en grijsblad.

Juli-Aug. **Nesaea salicifolia** (80 cm.) p. st. f 0.45

Mei-Juni. **Nierembergia rivularis** ” ” - 0.25
Aardig kruipend plantje met zuiverwitte klokvormige bloemen.

Juli-Aug. **Oenothera fruticosa Fraseri** (40 cm.), p. st. f 0.15
Verscheidenheid met schoone gele bloemen.

Juli-Aug. **Oenothera fruticosa major** (40 cm.), p. st. f 0.20
Juli-Sept. ” ” (40 cm.) ” ” - 0.15

” ” **missouriensis** (30 cm.) ” ” - 0.15
Deze soort heeft prachtige buitengewoon groote, zwavelgele bloemen. Kruipend.

Oenothera Nuttall (10 cm.) p. st. f 0.45
” **riparia** (30 cm.) ” ” - 0.20

” **serotina** (30 cm.) ” ” - 0.25
Deze beide laatste bloeien met gele bloemen.

Juli-Sept. † **Oenothera speciosa grandiflora** (60 cm.), p. st. f 0.20

Met groote, witte bloemen, die ook den geheelen dag openblijven.

Juli-Sept. † **Oenothera speciosa hybrida** . p. st. f 0.15
Hybride, in mijn kweekrij ontstaan door kruising van de fraaie maar zwakgroeiende *Oenothera speciosa rosea* met *Oenothera speciosa*. Het is een sterk groeiende soort met lichtroze bloemen, die naar het midden in wit over gaan. Zij bloeit gedurende den geheelen zomer met een grooten rijkdom van bloemen.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

” ” ” ” ” 5 ” ” ” ” ” 4 ” ”

BLOEITIJD.

Juli-Sept. *Oenothera Youngi* (50 cm.) . . . p. st. f 0.15
Rijkbloeiende variëteit met donkergele bloemen.

April-Mei. *Omphalodes cappadocica* (25 cm.) p. st. f 0.55

Maart-Mei. †*Omphalodes verna* (30 cm.) p. st. f 0.15

Voor deze plant, met hemelsblauwe Vergeet-mij-niet-achtige bloemen is een half beschaduwde standplaats wenschelijk.

Maart-Mei. †*aOmphalodes verna alba* 30 cm.) p. st. f 0.10

Witte variëteit der voorgaande. Beide bloeien ook nog dikwijls in het najaar.

Mei. *aOrobis albus roseus* 30 cm.) . . . p. st. f 0.25

Een zeer geschikte plant voor rotspartijen, met zacht rose bloemen.

Mei-Juni. *Orobis Gmellini*, lila (30 cm.) . . . p. st. f 0.15

April-Mei. *Orobis lathyroides* . . . „ „ - 0.15

Een der vroegste planten met donkerpaarse bloemen.

Orobis Smithi (30 cm.) zeldzaam . . . p. st. f 0.25

April-Mei. *aOrobis varius* (35 cm.) . . . „ „ - 0.30

Zeldzame plant, die zeer vroeg bloeit met zalmkleurig rose en gele bloemen.

Mei. *Orobis vernus*, rose, (30 cm.) . . . p. st. f 0.15

„ „ „ „ *albus*, wit, (30 cm.) „ „ - 0.30

Juni-Aug. *aOxalis enneaphylla* (100 cm.) „ „ - 0.75

Zeldzame plant van de Falklandeilanden met witte bloemen.

† PÆONIA SINENSIS (PIOENROOS).



Paeonia sinensis.

Men kan zich als sierplant in den tuin moeilijk een dankbaarder plant denken dan de pioenroos, welke in de laatste jaren door hybridisatie zoodanig is verbeterd, dat men ze in allerlei kleuren aantreft. Opdat ze goed zal groeien en bloeien, moet de grond flink diep worden omgespit en bemest. Eerst het tweede of derde jaar na de planting kan men volop bloemen verwachten.

enkelbloemige soorten.

	p. stuk
<i>Clothos</i> , rose	f 0.25
<i>Comus</i> , karmijnrose	- 0.20
<i>Hermes</i> , donker rose	- 0.40
<i>Lemon Queen</i> , wit met geel centrum	- 0.40
<i>Medon</i> , vleeschkleur in wit overgaand	- 0.30
<i>Orby</i> , donkerrood	- 0.25
WHITTLEY MAJOR , Met enorm groote, zuiver witte bloemen en oranjekleurige meeldraden op zeer lange en stevige bloemstengels. De mooiste enkele witte Pioen	- 0.75

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

dubbelbloemige soorten.

	p. stuk
<i>Agida</i> , violet rose, halfdubbel	f 0.30
<i>Agnes Mary Kelway</i> , licht rose met geel centrum	- 0.30
<i>Albâtre</i> , ivoorwit met licht gestreept midden	- 0.55
<i>Canarie</i> , wit met crème weerschijn	- 0.30
<i>Cytéré</i> , vleeschkleurig	- 0.25
<i>Duc de Cazes</i> , karmijnrose, naar het midden in zalmkleur overgaand	- 0.25
<i>Duchesse de Nemours</i> , (Calot). crémewit, extra	- 0.25
DUCHESSE OF TECK , Zeer groote platte bloem, roomwit met karmijnroode vlekken in het midden; laatbloeiend. De plant is zeer gezond en buitengewoon rijkbloeiend. Een der allerbeste om voor snijbloem te gebruiken	- 0.55
<i>Edmond Lebon</i> , schitterend rose met zilveren weerschijn	- 0.35
<i>Festiva</i> , wit met karmijnroode vlekken	- 0.35
<i>Festiva maxima</i> , zuiver wit, met purperkleurige vlekken	- 0.40
<i>Heiena</i>	- 0.30
LA ROSIÈRE , Groote platte bloem, vrij goed gevuld met gele meeldraden in het midden. De rand der bloembladeren is crème-achtig wit; de bloem doet denken aan een geopende theeroos. Middelhoog	- 0.30
<i>Lord Derby</i> , prachtig donkerrood	- 0.40
<i>Marie Lemolne</i> , zuiverwit met crémewit overschaduw centrum; extra grootbloemig	- 0.35
<i>Modesty</i> , purper rose	- 0.15
Mr. CHARLES LEVÊQUE , mooie zuivere zalmkleur extra	- 0.45
NOËMI DEMAY , grootbloemig, vleeschkleurig met zilveren weerschijn; vroegbloeiend	- 0.30
<i>Philomèle</i> , zachtrose met goudgeel centrum	- 0.55
<i>Picturata</i> , licht rose met een weinig rood	- 0.25
<i>Queen's Perfection</i> , Zeer licht rose met lila tint	- 0.45
<i>Roem v. Boskoop</i> , Vleeschkleurig wit, naar het midden overgaand in zwavelgeel	- 0.30
<i>Solfaterre</i> , zacht lilarose in wit overgaand	- 0.30
TRICOLOR GRANDIFLORA , vleeschkleurig met okergeel hart; grootbloemig	- 0.25
<i>Vertumnus</i> , lila rose met vleeschkleurig midden	- 0.20

† Diverse soorten PÆONIA'S.

Paeonia hybriden.

Deze planten zijn ontstaan door kruisingen van *P. sinensis* met *P. Witmanniana*. Zij bloeien evenals laatstgenoemde zeer vroeg, namelijk in het midden van Mei en dus eenige weken vóór dat de *P. sinensis* beginnen te bloeien. De bloemen zijn enkel.

Avant-garde, zachtrose met goudgele meeldraden,

p. st. f 1.50

Le Printemps, groote bloem, kleur roomgeel, gele meeldraden, stempel karmijnrood p. st. f 1.50

Mal-Fleuri, kleur vleeschkleurig wit met zalmkleurige tint, gele meeldraden p. st. f 1.50

LUTEA „ „ - 0.55

Prachtige nieuwe soort, van het Yunnanagebergte afkomstig. De groeiwijze komt wel wat met die van een boompioen overeen. De bloemen zijn levendig botergeel.

Voortreffelijke nieuwigheid.

Officinalis mutabilis plena p. st. f 0.25

Rose in wit overgaand.

Officinalis rosea plena „ „ - 0.25

Groote dubbele schitterend rose bloemen.

Officinalis rubra plena „ „ - 0.20

Dubbele, groote karmijnroode bloemen.

† PAPAVER ORIENTALE.

Bij de tegenwoordig heerschende voorliefde voor groote, langstelige bloemen, worden deze planten zeer terecht meer algemeen gewaardeerd. Voor versiering in groote vazen zijn ze bijzonder schoon. Ook maken ze met hare schitterende bloemen, die reeds van verre de aandacht trekken, een zeer fraai effect, wanneer men ze groepsgewijze in het gazon plant of langs den rand van heesterparken. Ze bloeien in juni-juli, maar ook gedurende den geheelen zomer en in het najaar komen af en toe nog bloemen tevoorschijn. Hoogte 50 tot 100 cM.

Beauty of Livermere, donkerbloedrood . . . p. st. f 0.15

Blush Queen, prachtig zacht rose . . . " " - 0.15

Duke of Teck . . . " " - 0.15

Schoone bloemen van een schitterend scharlakenr. kleur

Goliath . . . p. st. f 0.15

De enorme, rechtopstaande stengels, ter lengte van pl.m. 150 cM., eindigen in zeer groote schitterend scharlakenroode bloemen.

Grossfürst . . . p. st. f 0.15

Groote, goed gevormde, donkerroode bloemen met zwarte vlekken.

Jennie Mawson . . . p. st. f 0.20

Met groote, mooie, goed ontwikkelde bloemen van een zalmkleurig rose, die rechtop op stevige stelen staan.

Lady Roscoe . . . p. st. f 0.15

Rijkbloeiende variëteit met terracottakleurige bloemen.

Mahony . . . p. st. f 0.15

Deze is ongetwijfeld de donkerste die bekend is. Voor eenige jaren werd zij door mij gewonnen. Haar kleur is van het donkerst karmijnrood, zich neigende naar het bruin van donker mahonyhout.

Marie Studholme . . . p. st. f 0.15

Zalmkleurig rood met karmijn aan den voet der bloembladen.

Mrs. John Harkness . . . p. st. f 0.15

Oranje scharlakenrood.

Mrs. Perry . . . " " - 0.15

Een der schoonste, met enorme, groote bloemen van een eigenaardig abrikooskleurig oranje.

Oriental King . . . p. st. f 0.15

De groote scharlakenroode bloemen hebben een eigenaardigen vorm en gelijken op twee in elkaar geplaatste bloemen.

Oriflamme . . . p. st. f 0.15

Uitstekende soort welke circa 90 cM. hoog groeit. Zij bloeit met buitengewoon groote, prachtige oranje-scharlakenroode bloemen, welke 25 cM. in doorsnede zijn.

PERRY'S WHITE . . . p. st. f 0.30

Nieuwe variëteit, in groei- en bloeiwijze gelijkende op de bekende Mrs. Perry met bloemen van een zuiver satijnachtig witte kleur met donkere vlek.

Princess Ena . . . p. st. f 0.15

Deze onderscheidt zich van de andere soorten door hare helder oranje-zalmkleurige bloemen van een onberispelijken vorm; zeer rijkbloeiend.

Princess Victoria Louise . . . p. st. f 0.15

Prachtige nieuwe Papaver met zacht zalmkleurig-rose bloemen.

Queen Alexandra . . . p. st. f 0.15

Grootbloemige nieuwigheid van prachtig zalm-rose kleur.

Rembrandt . . . p. st. f 0.15

Oranje-scharlaken. Zeer grootbloemig.

Silver Queen . . . " " - 0.15

De bloemen zijn vleeschkleurig, bijna wit, met een schoone zilverschijntige tint.

Papaver orientale in soorten naar mijne keus,
p. 10 st. f 1.20

Pentstemon barbatus, zie *Chelone barbata*.

BLOEITIJD.

Juli-Sept. † **Pentstemon Mrs. F. Fulford** (50 cM.) p. st. f 0.45

Nieuwe variëteit met prachtige groote karmijnroode bloemen. Zeer rijkbloeiend.

Juli-Sept. † **Pentstemon Newbury Gem.** . . p. st. f 0.25

Met schitterende karmijnroode bloemen aan stengels van pl.m. 75 cM. hoogte. Bloeit zeer lang en rijk.



Pentstemon Southgate Gem.

Juli-Sept. † **Pentstemon Southgate Gem.**, p. st. f 0.40

Met schitterend karmijnroode bloemen, tweemaal zoo groot als die van Newbury Gem. Van binnen bijna geheel wit gekleurd, maakt dit een fraai effect met de karmijnroode bloemen.

Juli-Sept. † **Pentstemon tubiflorus** (60 cM.), p. st. f 0.20

Met witte bloemen op lange stengels.

Petasites japonicus giganteus . . . p. st. f 0.15

Plant met enorm groote decoratieve bladeren, die echter een paar jaar vast moet staan om zich tot volle schoonheid te kunnen ontwikkelen.

Mei-Juni. † **Phlox amoena rosea** (10 cM.) . p. st. f 0.15

Prachtige plant die enorm rijk bloeit, zoowel in het voor- als najaar, met schitterend rose bloemen. Zeer geschikt voor rotsen, randen en lage perken.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks beatelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "

† PHLOX ARENDSI

Deze nieuwe Phloxen zijn ontstaan door eene kruising van *P. Canadensis* met *P. decussata*. De bloei volgt direct op die der Voorjaars-Phloxen en duurt tot de decussatavariëteiten volop bloeien. De rijkvertakte planten bereiken een hoogte van ongeveer 40—60 cm.

AMANDA p. st. f 0.30

De middelgrootte bloemen zijn helder lila met een donkerder midden; deze soort groeit slechts 35 cm. hoog.

CHARLOTTE p. st. f 0.20

De bloemen, die eene doorsnede hebben van ongeveer 3 cm., zijn wit met een zacht lila rose weerschijn en donker lila oog; hoogte 50—60 cm. De mooiste van alle.

GRETE p. st. f 0.30

Met witte bloemen, waarvan de knoppen rose zijn; hoogte 50 cm.

HELENE p. st. f 0.30

De lichtlila bloemen doen denken aan een lichte *P. canadensis*; hoogte 40 cm.

HILDA p. st. f 0.45

Wit met zacht-lila weerschijn en helder-rose oog; hoogte 30—40 cm.

KÄTHE p. st. f 0.30

De bloemen zijn purperrose met donker oog, dat door een lichten rand is omgeven; hoogte 50 cm.

LISBETH p. st. f 0.45

De bloemen, welke zich uit lilaknoppen ontwikkelen, zijn wit met zacht lila onderzijde; hoogte 60 cm.

LOUISE p. st. f 0.30

Met helder lila bloemen en lilakarmijn oog. De krachtige, rijkvertakte planten worden ongeveer 60 cm. hoog.

† PHLOX DECUSSATA.

(HERFST-SERINGEN.)

Van deze algemeen bekende en gewaardeerde sierplant zal een beschrijving geheel overbodig zijn. Ze beginnen te bloeien in juli en bloeien den geheelen nazomer door tot somtijds in het begin van October. De bloemen, welke in de rijkste kleurschakeeringen voorkomen, bewaren, als ze afgesneden zijn, lang hare frisheid, hetgeen haar een onschatbare waarde geeft als snijbloem.

Nieuwere extra grootbloemige soorten.

Afrika p. st. f 0.20

Karmijn-purperkleurig met donker bloedrood oog.

Amerika p. st. f 0.25

Zalmkleurig rose met karmijnrood oog.

Auguste Normand p. st. f 0.20

Laaggroeiende soort met groote trossen zachtrose bloemen en groot karmijnrood oog.

Azië p. st. f 0.25

Lila-rose met helder karmijnrood oog; middelhoog.

BARON VAN DEDEM p. st. f 0.15

Eene nieuwigheid, welke in mijne kweekerij is ontstaan. De bloemen komen veel overeen met die van *Coquelicot*, doch zijn ongeveer tweemaal zoo groot. Zij bloeit met groote trossen schoone scharlaken-bloedroode bloemen. Door hare groote bloemen en hare opvallend, schitterende kleur is dit een nieuwigheid van zeer groote waarde.

Champion Verbist p. st. f 0.20

Violet met wit oog.

Comtesse de Jarnac p. st. f 0.20
Bontbladerig.

D. M. Mc. Kinnon p. st. f 0.25
Karmijnrose met lichter oog, laag.

Dr. Königshöfer p. st. f 0.20

Nieuw. Vurig scharlakenoranje met donker bloedrood oog en met gevulder trossen dan *Coquelicot*.

Electra p. st. f 0.15

Glanzend rood met donkeren weerschijn.

Elisabeth Campbell p. st. f 0.15

De groote bloemtrossen dezer nieuwe *Phlox* vormen prachtige boupuetten. De bloemen zijn van eene bijzondere kleur, n.l. licht zalmkleurig met rose hart. *Extra*.

Emmanuel Arène p. st. f 0.20

Zacht rose bloemen met groot, wit centrum.

Ernst Luz p. st. f 0.20

Karmijn rose met bloedrood oog.

EUROPA p. st. f 0.15

Sneeuwwit met zilverwitten weerschijn, en met een opvallenden, karmijnrooden ring. Groote, dichte trossen.

Favorite p. st. f 0.15

Heliotroopkleurig, wit geaderd en zuiver wit oog.



Phlox decussata.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "

† PHLOX DECUSSATA (vervolg).

Frau Ant. Buchner	<i>p. st. f</i> 0.15
Zuiver wit; lange trossen met enorm groote bloemen. Zeer sterke groeier. De beste witte.	
Friedrich Krupp	<i>p. st. f</i> 0.22
Witbloeiend, laag.	
Gartendirektor Brodersen	" " - 0.15
Licht-karmijnrood met donker oog. Grootbloemig.	
G. A. Strohleim	<i>p. st. f</i> 0.15
Met groote oranjeachtig scharlakenroode bloemen en schitterend karmijn oog.	
Generaal van Heutsz	<i>p. st. f</i> 0.15
Deze nieuwe door mij gewonnen Phlox brengt zeer groote bloemtrossen voort met kolosale bloemen, die schitterend zalmkleurigrood gekleurd zijn met een zuiver wit centrum.	
Gollath	<i>p. st. f</i> 0.15
Eigengewonnen nieuwigheid welke circa 150—180 cM. hoog groeit; de trossen zijn pyramidaal gevormd en van eene schitterend karmijnroode kleur, terwijl elke bloem een donker karmijnrood oog heeft.	
Gruppenkönigin	<i>p. st. f</i> 0.15
Vleeschkleurig rose, met karmijn oog.	
Hajo Eilers	" " - 0.15
Wit met lila, laag.	
Hans Voilmöller	" " - 0.25
Lila met wit; grootbloemig.	
Heinrich Kanzleiter	" " - 0.25
Schitterend karmijnviolet; grootbloemig.	
Hermine , zeer lage, witte variëet	" " - 0.15
Hervor	" " - 0.20
Karmijnrose met zalmkleurigen weerschijn en helder wit oog.	
Jan Blockx , violetrood met donker oog	<i>p. st. f</i> 0.20
Jean Dupuis	" " - 0.15
Zuiver mauve met wit oog, grootbloemig.	
Jules Cambon , donkerrose met groot wit oog	" " - 0.20
Jules Sandeau	" " - 0.15
Met zeer groote zuiverrose bloemen; laag.	
Karl Bleyje , licht violet	" " - 0.20
Katinka Beeil ,	" " - 0.20
Met groote karmijnroode bloemen.	
Kücken	" " - 0.15
Fraai zalmkleurig rose met donker oog.	
Lady Glenconner	" " - 0.25
Karmijnrose met lichter centrum.	
Le Printemps	" " - 0.15
Karmijnrose met wit oog, grootbloemig laag.	
Lisel Schöilkopf	<i>p. st. f</i> 0.20
Licht lila met wit; bloedrood oog.	
Lofna	" " - 0.15
Zachtrose, grootbloemig.	
Marcel Turbat	" " - 0.30
Groot zilverbont blad, bloemen als van Eclairer.	
Minerva	<i>p. st. f</i> 0.20
Lilarose met wit doorloopen en schitterend karmijnrood oog.	
Miss Ellen Willmott	<i>p. st. f</i> 0.20
Zeer aparte, zacht lila kleur met lichter midden.	
Muriel Rogers	<i>p. st. f</i> 0.20
Zacht rose met karmijn oog.	
Paul Ehmann	<i>p. st. f</i> 0.15
Zalmkleurig rose met licht karmijn rood oog.	

Reichsgraf v. Hochberg	<i>p. st. f</i> 0.15
Schitterend amarant purper.	
RIVERTON JEWEL	" " - 0.45
Nieuwe variëteit met bloemen van een mauve-rose kleur en schitterend karmijnrood oog.	
Rosa mundi	<i>p. st. f</i> 0.15
Met groote zachtrose bloemen, extra.	
Rijnstroom	" " - 0.15
Nieuwe Phlox met bloemen van een schitterend rose kleur, het meest gelijkend op Panthéon. De groeiwijze is echter forscher en de bloemen zijn groter.	
Seima	<i>p. st. f</i> 0.15
Deze schoone Phlox is eene door mij gewonnen hybride. Zij is sterk groeiend, geeft een groote tros met groote lichtrose bloemen, met een kersrood hart.	
Sofie Cordes , zacht lila met wit	<i>p. st. f</i> 0.20
Tapis Blanc	" " - 0.15
Zeer laaggroeiend, zuiver wit. Extra grootbloemig.	
Widar	<i>p. st. f</i> 0.15
Violetblauw met zuiver wit oog. Mooie groote trossen.	
William Ramsey , donker purper	<i>p. st. f</i> 0.15

ALGEMEENE COLLECTIE.

Onderstaande soorten per stuk *f* 0.15,
per 10 stuks *f* 1.20, per 100 stuks *f* 8.—.

Aegir, schitterend scharlakenrood, verbrandt niet.	
Antonin Mercier, donker lila met wit oog, laaggroeiend.	
Arthur Ranc, zacht rose, groote tros.	
Aurore, schitterend rose.	
Béranger, licht rose in wit overgaand.	
Braga, levendig lila rose.	
Caran d'Ache, zalmkleurig rose.	
Ciara Benz, schitterend rosekarmijn, met lila oog; laag.	
Coquelicot, oranje-scharlaken.	
Crépuscule, zilverachtig mauve-kleurig met helder karmijnrood oog.	
Dr. Charcot, donker violet.	
Eclairer, karmijn-violet met rose centrum.	
Etna, diep koraalrood.	
Eugène Danzanvillers, lila met wit.	
Fernand Corter, oranje met purper.	
Flambeau, oranje scharlakenrood met donker oog.	
Flora Hornung, wit met groot karmijnrood oog, laaggroeiend.	
Freifraulein von Lasberg, zuiver sneeuw wit.	
F. W. Maure, zalmkleurig oranje.	
Hanny Pfleiderer, licht rose, overgaand in zalmkleur met karmijnrood oog.	
Iris, purperblauw.	
Josephine Gerbeaux, wit met rood oog, grootbloemig.	
Le Madhi, zeer donkere violetkleur.	
Loki, zuiver zalmkleurig rose met donker karmijnrood oog.	
Mad. Paul Dutrie, zacht rose bloemen, die wit gevlekt zijn.	
Margarete Closs, zalmkleurig met karmijnrood oog.	
Météore, zacht rose met licht hart, extra grootbloemig.	
Mrs. Arthur Baker, zalmkleurig rose.	
Mrs. Oliver, zalmkleurig met wit hart.	
Nana coerulea, laag; bloeit rijk met mooie paarse bloemen.	
Panthéon, schitterend donkerrose.	
Rheingau, goed gevormde witte bloemen; knoppen en stengels donker violet.	
Rosenberg, karmijnviolet met bloedrood oog.	
Sigrid Arnoldson, vurig karmijnrood met donker centrum.	
Toistoi, koperachtig amarant met bloedrood oog.	

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "

BLOEITIJD.

Sept.-Nov. †**Polygonum amplexicaule** var. **oxyphyllum**
(= *polystachyum*) (2 M.), p. st. f 0.15

Indien men deze plant laat in den herfst ziet, met aan elk harer takken groote rose-achtig witte bloemtrossen, zoo zou men haar eerder voor een heester aanzien, dan voor een vaste plant, welker bladeren en stengels des winters telkens afsterven. Voor gazons is dit eene plant bij uitnemendheid, daar zij ook zonder eenige bedekking overwintert.

Polygonum Baidschuanicum, zie *Klimplanten*.

Aug.-Sept. **Polygonum bistortum superbum**, (50 cm.),
Met fraaie lichtrose bloemtrossen. p. st. f 0.20

Juli-Sept. **Polygonum ilchiangense** (60 cm.), p. st. f 1.10
Nieuwe uit China ingevoerde plant met een menigte zuiverwitte bloemen; rijkbloeiend.

Polygonum sachalinense (180 cm.) . . . p. st. f 0.15
Snelgroeijende plant met een heesterachtig gewas en groote bladeren. Zij laat zich zeer goed gebruiken als dekking en onder boomen.

Juni-Sept. †**Potentilla atrosanguinea** (**Gibsonscarlet**),
p. st. f 0.30

De bloemen, welke bijna gedurende den geheelen zomer in menigte worden voortgebracht, zijn schitterend levendig vermiljoenrood.

† **POTENTILLA HYBRIDEN.**

De *Potentilla's* kunnen tot de dankbaarste Vaste Planten worden gerekend. Zij bloeien den geheelen zomer tot laat in den herfst en zijn wat behandeling of grondsoort betreft niet zeer kieskeurig, zoodat dit dus niemand behoeft te weerhouden deze schoone planten aan te schaffen. De afgesneden bloemen laten zich ook uitnemend gebruiken.

Onderstaande soorten zijn dubbel, behalve waar
dit vermeld staat.

Arc-en-Ciel, chroomgeel, rood gestreept.

Californica, zuiver geel.

Cratère, purperrood, geel gerand.

Don Quichotte, geel geaderd, helder en donkerrood gestreept naar het midden.

Drapeau, kastanjebruin met donker midden.

Emille, purperrood, geel gerand.

Formosa, kersrood, rijkbloeiend, enkel.

Golconde, rood met geel.

Goldkugel, goudgeel.

Hamlet, donker karmijn.

Hopwoodiana, rose met-isabellageel, enkel.

L'achéron, donker vuurrood, geel gerand.

Landseer, rood, enkel.

Laurium, geel met rood gevlekt.

Lemoine, schitterend rood met donker hart, geel gerand.

Monsieur Rouillard, donker bloedrood met geel omzoomd.

Mont d'or, geel.

Nepalensis Miss **Wilimott**, met schitterend vermiljoen-roode bloemen, enkel.

Nigra plena, donker purper, bijna zwart.

Panorama, oranje purper gestreept.

Perfecta plena, scharlakenrood met geel hart.

Purpurea plena, purper karmijn en goudgeel.

Rosae flora, donker amarantrood.

Toulssaint Louverture, purperkarmijn.

Van Dijk, geel, rood gestreept.

Vase d'or, geel.

Variabilis plena, scharlakenrood met gele randjes.

Versicolor, geel en rood gevlekt.

Vulcain, helderrood, donker centrum.

William Roillson, kastanjebruin met oranje.

Potentilla's in		soorten	p. st. f
10	"	" 5	" - 1.50
25	"	" 5	" - 3.—

BLOEITIJD.

Juni-Sept. **aPotentilla nitida** . . . p. st. f 0.25

" **a** " " **aiba** . . . " - 0.45

Bovenstaande beide rotsplantjes vormen polletjes van ca. 15 cm. hoog; de eerste heeft zacht rose, de andere witte bloemen.

April-Mei. **aPrimula acaulis aiba plena**, wit, p. st. f 0.25

" **a** " " **Croussel plena**, dubbel
violet purper, p. st. f 0.25

" **a** " " **grandifi. hybriden**, in ge-

mengde kleuren, p. st. f 0.15

" **a** " " **iliacina pl.**, met dubbele
mat-lila bloemen, p. st. f 0.15

" **a** " " **Pompadour**, " - 0.90

Reeds zeer oude, doch zeldzame *Primula*, met schitterend bloedroode, dubbele bloemen.

April-Mei. **aPrimula acaulis sanguinea plena**, p. st. f 0.25

Dubbel donkerrood.

" **a** " " **suiphurea plena**, p. st. f 0.15

Dubbel geel.

Bovenstaande laaggroeiende *Primula's* zijn zeer lieve plantjes met goed gevulde bloemen. Zij bloeien zeer vroeg en rijk en groeien 15 cm. hoog.

April-Mei. **aPrimula Auricula** (15 cm.) . . p. st. f 0.15

Grootbloemige Luiksche Aurikels in gemengde kleuren.

Mei. **aPrimula Bulleyana** (40 cm.) . . . p. st. f 0.15

Deze heeft een nieuwe kleur die moeilijk is te beschrijven; gemsleur, oranje, abrikooskleur en scharlakenrood, alle komen er in voor. Niettegenstaande deze buitengewone kleurenvariatie, maakt zij een prachtig effect.



Primula Cashmeriana.

Maart-Mei. **a†Primula Cashmeriana** (30 cm.), p. st. f 0.15

Deze vroegbloeiende *Primula* heeft schoone lichtblauwe bloemhoofdjes.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " 5 " " " " " 4 " "

BLOEITIJD.

Mrt.-Mei. †**Primula Cashmeriana alba** (30 cm.), *p. st. f* 0.15
 Prachtige zuiverwitte variëteit van de voorgaande.

Mei-Juni. †**PRIMULA HYBRIDA LA LORRAINE**
 (30 cm.), *p. st. f* 0.45

Prachtige nieuwe hybride, zeer rijkbloeiend met karmijnrose bloemen.

Mei. **PRIMULA hybrida Mrs. James Douglas** (25 cm.),
p. st. f 0.45

Nieuwe kruising van *Primula Auricula*, gewonnen door den bekenden Engelschen *Primula*-kweeker James Douglas, met enorm groote bloemen van een purper blauwe kleur.

Maart-April. †**PRIMULA JULIAE** (20 cm.), *p. st. f* 0.45


Zeer vroegbloeiende, nieuwe plant uit den Kaukasus met schitterend purperrose bloemen.

Mei-Juni. **Primula luteola**. *p. st. f* 0.20

Fraaie geelbloemige soort.

Juni-Juli. **PRIMULA MOERHEIMI HYBRIDEN** (60 cm.),
p. st. f 0.75

Prachtige nieuwe *Primula*, in mijne kweekerij ontstaan uit herhaalde kruisingen tussehen *Primula Beesina* en *P. pulverulenta*. De planten hebben ongeveer dezelfde groeiwijze als *P. pulverulenta* en de bloemstengels bereiken ongeveer ook dezelfde lengte als deze, maar komen voor in alle denkbare kleurschakeeringen tussehen geel, oranje, rood, rose en violet. Er zijn mij weinig planten bekend, waarin zulke verscheidende kleurschakeeringen voorkomen en bijna geen enkele zaailing is gelijk aan de andere wat de kleur der bloemen betreft.



Primula Pulverulenta.


BLOEITIJD.

Juni. †**Primula Pulverulenta** (80 cm.) . . . *p. st. f* 0.15

Nieuwe *Primula*, in groei en blad veel overeenkomende met *P. japonica*. De bloemen zijn echter grooter en van een schitterender purperen kleur. De stengels sehijnen als met meel bestrooid en geven de plant daardoor een schoon aanzien.

Maart-Mei. †**Primula rosea grandiflora** (20 cm.),
 (Zie afbeelding blz. 86.) *p. st. f* 0.15

Uit het Himalayagebergte ingevoerde plant, waar zij op een hoogte van 3000 meter werd gevonden. De schoone helderrose bloemen hebben een donkergeel hart en zitten aan bloemhoofdjes bijeen.



Primula Sieboldi.

†**Primula Sieboldi**, in soorten op naam, *p. st. f* 0.15

Deze worden ook wel Japansche *Primula*'s genoemd en zijn in onze Hollandse tuinen nog veel te weinig in gebruik. De bloemen, die in vorm veel doen denken aan de bekende *Primula chinensis*, komen voor in diverse kleurschakeeringen van rood, rose, lila en wit. De planten groeien het best op een vochtige plaats, beschut voor de namiddagzon. Ze bloeien in April en Mei en zijn ook zeer geschikt voor potcultuur. Men kan ze dan reeds in Febr.-Maart in bloei hebben.

Primula Sikkimensis (40 cm.). *p. st. f* 0.25

Deze is afkomstig van het Himalayagebergte en zonder twiifel een der mooiste *Primula*'s. Zij heeft een eigenaardigen, doch aangename geur. De 40 cm. hooge stengels dragen een losse tros van neerhangende mooie zwavelgele bloemen.

Maart-Mei. **Primula veris elatior**, gemengde kleuren,
 (30 cm.), *p. 100 st. f* 6.—, *p. 10 st. f* 0.80, *p. st. f* 0.10

Bekende Sleutelbloem; een der vroegste voorjaarsbloemen; zij wordt veel gebruikt voor randen om heesterperken. Ook kan men deze planten zeer goed een plaatsje geven in een perk met struikrozen, mits deze niet te dicht op elkaar zijn geplant. Ze bloeien dan wanneer de rozen nog geheel kaal zijn, terwijl des zomers de rozen haar niet zullen hinderen.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

” ” ” ” ” 5 ” ” ” ” ” 4 ” ”



Primula rosea grandiflora. (Zie blz. 85.)

BLOEITIJD.

Mei-Juni. *Prunella Incls*a, (25 cm.) . . . p. st. f 0.25

Mei-Juni. „ *Webblana*. (25 cm.) . . . p. st. f 0.25

Maart-April. *Pulmonaria angustifolia azurea*
(30 cm.) p. st. f 0.15

Een der vroegste voorjaarsbloemen, die ook goed tegen koude en nachtvorsten kan, met prachtige blauwe bloemen.

Maart-April *Pulmonaria rubra* (30 cm.) . . . p. st. 0.15

Even vroeg als de vorige met purperroode bloemen.

April-Mei. *Pulmonaria sibirica maculata*
(30 cm.) p. st. f 0.25

Met eigenaardig gevlekt blad en paarsblauwe bloemen.

†PYRETHRUMS.

(Zie afbeelding blz. 87.)

De Pyrethrum is een plant, die in de laatste jaren zeer op den voorgrond is gekomen. Zij munt uit door een groote verscheidenheid van vormen en kleurentinten in wit, crème, rose, lila en rood. Vooral als snijbloem kan zij niet genoeg worden aanbevolen. Een vaas met deze bloemen maakt een verrassend schoon effect en ze behouden

zeer lang hare frischheid. Zij bloeien vanaf begin Juni en wanneer men zorg draagt bij het verbloeien de uitgebloeide stengels af te snijden, zullen ze ook in den nazomer een groote menigte bloemen geven.

10 stuks in enkele soorten naar mijne keus f 2.25

10 „ „ dubbele „ „ „ „ - 2.25

†*Pyrethrum* Lord Rosebery p. st. f 0.40

Met schitterend karmijn-scharlakenroode, dubbele bloemen; prachtige soort.

†*Pyrethrum* Mad Munler p. st. f 0.35


Met dubbele vleeschkleurige bloemen.

†*PYRETHRUM QUEEN MARY* p. st. f 0.35

Prachtige nieuwe varlêit met zeer groote dubbele licht rose bloemen. Prachtige snijbloem op lange stevige stengels.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

*Pyræthrum.*

BLOEITIJD.

Mei-Juni. *Ranunculus aconitifolius* fl. pl. (45 cM.)

p. st. f 0.30

Een der beste vaste planten. Een perk daarvan levert gedurende den bloeitijd een zeer schoon gezicht. De dubbele sneeuwwitte bloemen gelijken op miniatuur Camellia's en zijn onovertrefbaar voor bouquets, daar de bloemtrossen bovendien een lossen vorm hebben.

Mei-Juni. †*Ranunculus acris* fl. pl. (60 cM.) p. st. f 0.15

Dubbele goudgele boterbloem.

Mei-Juni. †*Ranunculus speciosus* fl. pl. (30 cM.),

p. st. f 0.15

Deze dubbele gele boterbloem met groote bloemen heeft een gedrongen groeiwijze en is zeer rijkbloeiend.

Sept.-Oct. *Rhexia virginica* p. st. f 0.25

Laagblijvend plantje met donkerrose bloemen, en gele meeldraden.

Juli. *Rodgersia podophylla* (80 cM.). . . p. st. f 0.30" " *tabularis* (120 cM.). . . " " - 0.25

Een nog zeer zeldzame, vaste plant met groote, prachtige, sterke bladeren van een heldergroene kleur, gelijkend op die van Petasites; de roomgele bloemen staan in lange trossen.

Deze uitstekende nieuwigheid houdt van een vochtige en beschaduwde standplaats.

Juli-Oct. †*ROMNEYA COULTERI* p. st. f 0.40

(Zie afbeelding blz. 88)

Deze plant wordt ook wel Californische Papaver genoemd. Zij groeit pl.m. 1½ M. hoog en heeft schoone grijsgroene bladeren en groote sneeuwwitte, satijnachtige

bloemen, die een donkeren stamper en oranjekeurige meeldraden hebben. De bloemen hebben een bijzonder sterke, heerlijke geur, zooals men bij geen enkele plant aantreft en bereiken een middellijn van 10—12 cM. In mijne kweekerij groeit deze plant zeer goed zonder eenige bijzondere zorg en trekt door den rijken bloei de aandacht van alle bezoekers. Daar de planten houtachtige wortels hebben, die bij het verplanten anders licht tot rotting zouden overgaan, worden ze in pot gekweekt en in pot of met potkluit verzonden. Bij ontvangst moet men de planten voorzichtig uit de potten kloppen en uitplanten zonder de kluiten te beschadigen. Ze groeien het best in voedzamen, goed doorlatenden grond op een warme plaats. Ze moeten des winters met een weinig ruigte of turfstrooisel bedekt worden.

BLOEITIJD.

Aug.-Sept. †*Rudbeckia Goldstrahl*

(180 cM.), p. st. f 0.15

Bloeit schoon met groote, dubbele gele bloemen.

Sept.-Oct. †*Rudbeckia Herbstsonne*,

p. st. f 0.20

Een der mooiste Rudbeckia's met groote goudgele bloemen op stevige stengels; zeer rijkbloeiend.

Juni-Aug. †*Rudbeckia laciniata Golden Glow* (180 cM.), p. st. f 0.15

Schoone decoratieplant met goedgevulde goudgele bloemen, op lange stengels gezeten.

Voor groote vaasbouquets zijn ze bijzonder geschikt.

BLOEITIJD.

Juli-Aug. †*Rudbeckia maxima* (1 M.). . . p. st. f 0.25

Met lichtgrijs blad en enkele gele bloemen.

Juli-Oct. †*Rudbeckia Newmanni* (50 cM.), p. st. f 0.15

Zeer schoone decoratieve plant met groote stevige, oranjegele bloemen met donkerbruin hart. Afgesneden blijven ze zeer lang goed.

Rudbeckia nitida Autumn Glory (1 M.). . p. st. f 0.20

Bloeit van Augustus tot October met groote, enkele gele bloemen.

Rudbeckia purpurea, zie *Echinacea*.

Aug.-Oct. *Rudbeckia atro-purpurea* (90 cM.), p. st. f 0.30Juli-Aug. †*Rudbeckia subtomentosa* (70 cM.), " " - 0.30

De gele bloemen hebben een purperen schijf.

Juli-Oct. †*SALVIA PSEUDO-COCCINEA PURPURI*

(30 cM.), p. st. f 0.55

Prachtige, zeldzame nieuwigheid, die hoewel eigenlijk niet tot de Vaste Planten behorende, zeer kan worden aanbevolen door den langdurigen bloei met vurig vermiljoenroode bloemen. Het verdient aanbeveling de planten in October op te nemen en in bak of koude kas te overwinteren.

Juli-Aug. *Salvia virgata nemorosa* (70 cM.), p. st. f 0.35

Rijkbloeiende plant met prachtige violet-blauwe bloemen.

Juli-Aug. *Salvia virgata nemorosa alba* (50 cM.),

p. st. f 0.55

Witte variëteit der voorgaande.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "

aSAXIFRAGA's.

Dit geslacht van Rotsplanten levert een groot aantal soorten op, welke zoowel aanbevelenswaardig zijn wegens de schoon gevormde bladeren, als om de bloemen, welke meest een witte of rose kleur hebben. Voor beplanting van rotspartijen zijn ze onmisbaar. De meeste soorten bloeien zeer vroeg in het voorjaar en laten zich uitnemend gebruiken voor snijbloemen. Ze nemen den schraalsten grond voor lief en een halfbeschaduwde standplaats.

a†S. *Cotyledon pyramidalis* (75 cm.) . . . p. st. f 0.20

Een der schoonste Saxifraga's. Zij vormt een groot rozet van bladeren, waaruit 60 à 70 cm. hooge bloemstengels met talloze witte bloemen te voorschijn komen. Ook zeer geschikt voor potcultuur.

a†S. *granulata fl. pl.* (20 cm.) p. st. f 0.15

Deze knollenvormende soort heeft zeer schoone, helderwitte gevulde bloemen, vroegbloeiend. Uitnemend geschikt voor bouquetten.

aS. *hybr. Schöne von Ronsdorf* (20 cm.), p. st. f 0.45


De talrijke middelgrote bloemen dezer nieuwe variëteit zijn schitterend donkerkarmijn en daar af en toe nieuwe bloemstengels te voorschijn komen, bloeit deze plant in Juni nog even volop als in April. Zoowel voor perken als voor randen is deze nieuwigheid bijzonder aanbevelenswaardig.

Mijne collectie Saxifraga's bestaat uit ruim

50 soorten en variëteiten.

Soortenlijst wordt op verlangen gaarne verstrekt.

Saxifraga's in soorten naar mijn keus, p. 10 st. f 1.20
" 100 " - 9.—



Scabiosa caucasica alba.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "

BLOEITIJD.

Juni-Oct. †*Scabiosa caucasica* (75 cm.) . p. " - 0.15

Gedurende den geheelen zomer tot laat in den herfst bloeit deze heerlijke plant met prachtige grootte langstelige zacht lila-blauw gekleurde bloemen, die door haar fraaien vorm reeds van verre de aandacht trekken. De afgesneden bloemen blijven lang frisch.

Juli-Sept. †*Scabiosa caucasica alba* (60 cm.), p. st. f 0.20
(Zie afbeelding.)

Witte variëteit van de vorige; zonder twijfel een der schoonste snijbloemen.

Juni-Juli. *Scabiosa Parnassi* 30 cm.) . . . p. st. f 0.25

Juli-Aug. " *pensylvanica* (2 M) . . . " - 0.25

Hooggroeiende plant met zwavelgele bloemen.

SCROPHULARIA nodosa variegata (25 cm.), p. st. f 0.45

Prachtige bontbladerige plant.

(Getuigschrift van Verdienste Ned. Mij v. T. en P. Augustus 1916.)

a SEDUMS EN SEMPERVIVUMS.

Helgeen van de Saxifraga's gezegd is, geldt grootendeels ook voor deze beide geslachten van rotsplanten, welke echter meer eigenaardig zijn door den bijzonderen vorm der bladeren met verschillende nuances van groen, waardoor ze zich, behalve voor rotspartijen, uitnemend laten gebruiken voor bijvende mozaïekvakken. Beide behoren tot de familie der Crassulaceën of Velpanten.

Sedum Anacampseros, met blauwgroen blad p. st. f 0.20

" *asiaticum*, schoon grijs blad. . . " " - 0.15

" *Ewersii*. " " - 0.15

" *kamschaticum* " " - 0.15

" *latifolium atro-purpureum* . . . " " - 0.25

" *obtusifolium*, met groen blad . . . " " - 0.30

" *reflexum*, grijsachtig blad . . . " " - 0.15

" *roseum*, met roseachtig blad . . . " " - 0.15

" *ruprestre*, grijsachtig blad . . . " " - 0.30

" *Spathulaefolium*. Een der mooiste

Sedums " " - 0.15

" *spectabile atro-purpureum* . . . " " - 0.30

Met prachtige grijsblauwe bladeren en bloemen van een diep robijn-roode kleur in den herfst.

Sedum spurium splendens p. st. f 0.25

Mooie vuurroode bloemen.

Sedums in soorten naar mijn keus,

p. 100 st. f 12.—, p. 10 st. f 1.50

Sempervivum arachnoïdeum Gnaphalium p. " - 0.10

Zoals de naam reeds aanduidt, zijn de bladeren van deze soort als met een spinneweb van fijne witte draden overdekt; een der beste voor steengroepen.

Sempervivum atro-violaceum p. st. f 0.15

" *Browni*, donkerrood; een der

" schoonste voor perken . . . p. st. f 0.10

" *Comolii* " " - 0.15

" *Cornutum* " " - 0.15

" *fimbriatum* " " - 0.10

" *Funckii* " " - 0.10

" *Powellii*, zeer schoone soort " " - 0.15

" *pyrenaicum* " " - 0.10

De groote bladeren dezer soort zijn donkerrood gekleurd; een der schoonste voor rotspartijen en mozaïekvakken.

Sempervivum Verloti p. st. f 0.15

Sempervivum's in soorten naar mijn keus,

p. 100 st. f 8.—, p. 10 " - 1.—

BLOEITIJD.

Aug.-Sept. †*Senecio clivorum* p. st. f 0.15

De groote ronde bladeren van deze nieuwe plant gelijken op die van *Petasites giganteus*. Hare stengels worden ongeveer 1 Meter hoog en brengen mooie zuivergele bloemen voort.

Aug.-Sept. †*Senecio clivorum Orange Queen*,
(70 cM.) p. st. f 0.25

Nieuwe variëteit, in mijne kweekerij gewonnen met groote, prachtige, oranje bloemen.

Sept.-Oct. †*Senecio tanguticus* p. st. f 0.20

Sterkgroeiende, nieuwe uit Centraal China afkomstige plant met rechte, bebladerde stengels van ongeveer 6 à 7 voet, voorzien van dichte bloemtrossen, bestaande uit kleine goudgele bloemen. Fraai gesneden blad.

Aug. *Senecio Veitchianus* (150 cM.) . . . p. st. f 0.20

Voortreffelijke sierplant met groote hartvormige bladeren. De stevige lange bloemstengels zijn over een lengte van 60 cM. rijk bezet met schitterend goudgele bloemen. Deze bekroonde nieuwigheid is bijzonder geschikt voor aanplanting bij vijvers etc.

Aug. *Senecio Wilsonianus* (150 cM.) . . . p. st. f 0.15

Prachtige nieuwigheid met groote, hartvormige bladeren en stevige, sterk vertakte en dicht met schoone goudgele bloemen bezette bloemstengels. Eveneens zeer geschikt om in de nabijheid van vijvers te planten.



Sidalcea candida.

Juni-Juli. †*Sidalcea candida* (60 cM.) . . . p. st. f 0.15

De fraaie witte bloemen dezer plant zijn aan lange bloemstengels gezeten en maken een mooi effect boven de donkergroene bladeren. De bloemen blijven lang goed en wanneer men de stengels afsnijdt en in water zet, openen zich de knoppen, en bloeien nog zeer lang.

Juli-Sept. †*Sidalcea malvaeflora Listeri*
(120 cM.), p. st. f 0.30

Met zachtrose bloemen op hooge stengels.

Juli-Oct. †*Sidalcea Rosy Gem.* p. st. f 0.15

Schoone variëteit met 3 à 4 voet hooge bloemstengels van rose bloemen; zeer rijk en lang bloeiend.

Juni-Aug. *aSilene acaulis grandiflora* (7 cM.), p. st. f 0.30

Zeldzame plant, die mooie polletjes vormt met lichtrose bloempjes.

BLOEITIJD.

Mei-Juli. *aSilene alpestris* (10 cM.) . . . p. st. f 0.25

Rotsplantje met zuiverwitte bloemen.

Juni-Aug. *aSilene maritima fl. pl.* . . . „ „ - 0.30

Kruipend plantje met groote dubbele witte bloemen.

Juni-Sept. *aSilene Schafta* (10 cM.) . . . p. st. f 0.25

Rotsplantje met purperrose bloempjes.

Juni-Sept. *Silphium perfoliatum* (150 cM.), „ „ - 0.25

Deze plant met groote gele bloemen heeft de eigenaardigheid, dat de bladeren, die twee aan twee ter weerszijden van den stengel zijn gezeten, telkens een beker vormen, die gewoonlijk met water gevuld is.



Soldanella alpina.

Mei-Juni. *aSoldanella alpina* (15 cM.) . . . p. st. f 0.20

Dit plantje wordt in wilden toestand in de Alpen gevonden. Het heeft schoone, ronde, groene bladeren, die aan zeer dunne steeltjes bevestigd zijn. De klokvormige bloempjes zijn van een diep blauwe kleur. Dit plantje vereischt een koele schaduwrijke plaats.

Aug.-Sept. †*Solidago aspera* (120 cM.) . . . p. st. f 0.20

Met sterkvertakte stengels en dichte goudgele bloemtrossen.

Aug.-Sept. †*Solidago brachystachys* (20 cM.), p. st. f 0.30

„ „ † „ *Buchleyi*, geel . . . „ „ - 0.25

Sept.-Oct. † „ *Golden Wings* (200 cM.), „ „ - 0.15

Hooggroeiende nieuwe variëteit met groote vederachtige bloemtrossen van een prachtig gele kleur.

Aug.-Sept. †*Solidago Riddelli* p. st. f 0.30

Sept.-Oct. „ *Shorti* (30 cM.) . . . „ „ - 0.15

Laaggroeiende geelbloeiende soort.

Aug.-Sept. *Solidago spectabilis* (60 cM.) . . . „ „ - 0.25

Sept. †*Solidago Virgaurea (Gulden roede)* (150 cM.),
p. st. f 0.20

Met schoone goudgele vederachtige bloemtrossen.

Juli-Sept. †*Solidago Virgaurea praecox (compacta)*

(50 cM.), p. st. f 0.20

Laaggroeiende soort met groote, vederachtige trossen gele bloemen. Deze aanbevelenswaardige plant begint in juli te bloeien.

Aug.-Sept. *Splgeia marylandica* (40 cM.), p. st. f 0.70

Schoone plant voor halfschaduw met vuurroode bloemen.


Juli-Juli. †*Spiraea Aruncus* (120 cM.) . . . p. st. f 0.20

(Zie afbeelding blz. 91 hiernevens.)

Vooral als alleenstaande plant in gazons is deze plant zeer aan te bevelen. De talrijke prachtige lange bloemaren zijn met een ontelbare menigte kleine witte bloempjes overdekt.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „ „



Spiraea Aruncus.

BLOEITIJD.

Juli-Aug. †*Spiraea Aruncus sinensis* (160 cm.), *p. st. f* 0.40
Sterkgroeiende variëteit van de voorgaande, met lange witte trossen.

Juli-Sept. †*Spiraea Aruncus* var. *Knelffi* (60 cm.),
p. st. f 0.35

Aanbevelenswaardige variëteit, welke lager groeit dan de gewone *Spiraea Aruncus*. Het blad is bijzonder fijn en sierlijk ingesneden, waardoor dit uitstekend geschikt is voor bouquets, evenals de prachtige witte bloemtrossen.

Juni-Juli. †*Spiraea filipendula* (50 cm.) . *p. st. f* 0.20
" " " " fl. pl. (50 cm.) " " - 0.15

Midden uit het rozet van varenachtige bladeren, welke zoowel des winters als des zomers groen blijven, komen de fraaie bloemtrossen met dubbele, witte bloemen te voorschijn.

Aug.-Sept. †*Spiraea gigantea* (150 cm.) . *p. st. f* 0.35
Hooggroeiende soort met witte bloemen op lange stengels.

Juli-Aug. †*Spiraea gigantea carnea* (150 cm.), *p. st. f* 0.40
Met groote platte bloemtrossen van rose bloemen met een rose-violet midden.

Juli-Aug. †*Spiraea palmata* (45 cm.) . . *p. st. f* 0.15
De diep roode kleur der stengels, overgaande in het karmijnrood der breede bloemtulpen, steekt fraai af bij het blad, dat in den herfst schoone tinten van bruin en goudgeel vertoont.

Juni. *Spiraea Ulmaria aurea* (50 cm.) . . *p. st. f* 0.15
Met goudgele bladeren.

Juni. *Spiraea Ulmaria* fl. pl. (90 cm.) . . " " - 0.15
Met dubbele witte bloemen.

Spiraea trifoliata, zie *Gillenia*.

Juni-Juli. *Spiraea venusta (lobata)* (90 cm.) " " - 0.20
Met schoone purperachtig rose bloemen.

Aug. †*Spiraea venusta magnifica* (130 cm.) " " - 0.20
De bloemen dezer voortreffelijke soort zijn veel grooter dan die der oorspronkelijke variëteit, terwijl ook de kleur veel mooier is.

Juni-Sept. *Stachys corsica* (5 cm.) . . . *p. st. f* 0.25
Laaggroeiend, zodenvormend rotsplantje met licht lila bloempjes.

Juni-Juli. *aStachys discolor* (25 cm.) . . . *p. st. f* 0.25
aStachys lanata (25 cm.) . . . " " - 0.15

Bekende plant met witte wolachtige bladeren, welke vooral voor randen een fraai effect maken. Men moet de bloemen geregeld afsnijden om de planten goed gevuld te houden.

Aug. †*Statice eximia* fl. albo (60 cm.), wit, *p. st. f* 0.15

Juli-Sept. †*Statice latifolia* (45 cm.), blauw, " " - 0.15
De stevige bloemstengels der *Statice* komen voort uit een rozet van gegolfde bladeren. Ze zijn als het ware overladen met een ontelbare menigte, fijne, donkerblauwe bloempjes. Voor bouquets zijn ze zeer schoon. Ook kan men ze, zoodra ze beginnen te ontluiken, afsnijden en drogen, door ze op een droge plaats in bosjes op te hangen, evenals men dit met Immortellen doet.

†*Stenanthium robustum* *p. st. f* 0.90

De 90—100 cm. lange bloemstengels geven met hare meestal 60 cm. lange witte bloemstukken den indruk van een geleverde *Solidago*. Zij verlangt een beschaduwde, vochtige standplaats.

Stipa pennata, zie *Stergrassen*.

BLOEITIJD.

Sept. †*Stockesia cyanea alba* (25 cm.) . *p. st. f* 0.15
Schoone, witte variëteit van de bekende *Stockesia Cyanea*; prachtig voor snijbloemen.

Juli-Sept. †*Stockesia cyanea praecox* (25 cm.) *p. st. f* 0.15

De oorspronkelijke soort bloeit zoo laat in den herfst, dat ze meestal niet meer in vollen bloei kan komen; deze vroegbloeiende variëteit is dus een belangrijke verbetering, daar ze reeds in Juli bloeit.

April-Mei. *Stylophorum diphyllum* (50 cm.), *p. st. f* 0.15
Fraai gewas met groote gele bloemen, die aan boterbloemen doen denken.

April-Mei. *aSynthyris reniformis* (20 cm.), *p. st. f* 0.15
Uit de polletjes met hartvormige bladeren komen vroeg in het voorjaar de trossen met blauwe bloemen.

Aug.-Sept. *Telekia (Buphtalmum) speciosa*, *p. st. f* 0.20
Uit het midden der groote bladeren verheffen zich de twee Meter hoge bebladerde en sterk vertakte bloemstengels met groote oranjegele straalbloemen. Schoone gazonplant.

Juni-Juli. *Thalictrum Adianthifolium* (50 cm.), *p. st. f* 0.15
Het fijne blad van deze plant gelijkt op *Adiantum*.

Juni-Juli. *Thalictrum Aquilegiaefolium* (90 cm.),
p. st. f 0.15

Schoone sierplant met bladeren als van de *Akelei* en met mooie witte bloemen.

Juni-Juli. *Thalictrum Aquilegiaefolium compactum*,
p. st. f 0.20
Laaggroeiende variëteit met witte bloemen.

Juni-Juli. †*Thalictrum Aquilegiaefolium purpureum*
(90 cm.), *p. st. f* 0.20
Variëteit met purperrose bloemen.

Juni-Juli. *Thalictrum cornuti* *p. st. f* 0.15
Variëteit, welke pl.m. 2 Meter hoog wordt en met crème-witte bloemen bloeit.

Aug.-Sept. †*THALICTRUM DIPTEROCARPUM*,
p. st. f 0.15

Prachtige nieuwe soort, welke een hoogte bereikt van 120—180 cm. De bloemen zijn purperviolet en maken met de talrijke citroengele helmknoppen een fraai effect. Zeer geschikt voor groepen of als alleenstaande plant, daar zij een open, zonnige standplaats bemint.

Een der mooiste snijbloemen die men zich kan denken.

Juli. *Thalictrum flavum glaucum* (125 cm.), *p. st. f* 0.25
Met fraai zeegroen blad en enorme bloemstengels met fijne gele bloempjes.

Juni-Juli. *Thalictrum glaucum major* (120 cm.)
p. st. f 0.25

" " *lasoplttilfolium* (120 cm.)
p. st. f 0.30

" " *sulphureum* (125 cm.) " " - 0.25
Schoone sierplant met fraai blad en zwavelgele bloemen.

Mei-Juli. †*Thermopsis montana* (40 cm.), *p. st. f* 0.15
Weinig bekende plant met heldergele bloemen.

aThymus lanuginosus *p. st. f* 0.15
Kruipende plant, welke den grond geheel als een mosachtig tapijt bedekt van een donker blauwgroene kleur. Zeer schoone plant voor mozaïekvakken en rotspartijen.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "

BLOEITIJD.

Juni-Juli. *aThymus Serpyllum albus* . . . p. st. f 0.15" " " *coccineus* . . . - 0.25

Deze beide laatste soorten hebben lichtgroen blad; de eerste heeft witte, de andere roode bloemen. Het zijn zeer aardig kruipende plantjes, die tot hetzelfde geslacht behooren, als de ook in het wild voorkomende Thym.

aThymus Serpyllum splendens p. st. f 0.20Mei-Juni. *a†Tiarella cordifolia* (30 cm.) . . p. st. f 0.15

Deze plant met hartvormige bladeren en sierlijke witte bloemtrossen verlangt een halfbeschaduwde standplaats.

Juni-Aug. *TRADESCANTIA virginica* (50 cm.), p. st. f 0.25" " " *alba* (50 cm.), p. st. f 0.25" " " *rubra* (50 cm.), p. st. f 0.15Sept.-Oct. *Tricyrtis hirta* (90 cm.) . . . " " - 0.15

Mooie en interessante plant met rose-achtige bloemen, die donkerkarmijn zijn gespikkeld. Groeit goed in de schaduw.

Mei. *aTrillium erectum album*, wit . . . p. st. f 0.30

Bovenstaande voorjaarsbloem is uit Amerika ingevoerd en groeit het best in de schaduw.

*Trillium grandiflorum.*

April-Mei. *†Trillium grandiflorum* (20 cm.), p. st. f 0.15
Prachtige voorjaarsbloem met groote sneeuw witte 3deelige bloemkroon, welker slippen eenigszins teruggebogen zijn.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "

†TRITOMA'S (Vuurpijlen).

Zoowel als Gazonplanten of wel als snijbloemen voor groote vazen worden de Tritoma's door weinig andere planten in schoonheid overtroffen. Uit de smalle overhangende rietachtige bladeren komen de tot 1½ M. lange stengels te voorschijn, welker bloemen variëren tusschen geel en rood.

*Tritoma.*

BLOEITIJD.

Juli-Oct. *†T. corallina* (60 cm.) . . . p. st. f 0.30

Schoone laaggroeiende variëteit met helder groen loof en bloemtrossen van scharlakenroode tot oranje-roode kleur.

Juli-Oct. *†T. Goldelse* (80 cm.) . . . p. st. f 0.15

Buitengewoon rijkbloeiende hybride met heldergele bloemen.

Aug.-Sept. *†T. gracilis Golden spire* (60 cm.),
Zuiver goudgeel. p. st. f 0.40

Juli-Oct. *†T. Mac Owani* (45 cm.) . . . - 0.15

Zeer los en elegant-bloeiende variëteit met oranje-gele bloemen; de laagstgroeiende. Zij is zeer rijkbloeiend.

Aug.-Sept. *†T. Quartiniana* (80 cm.), p. st. f 0.20

Met zeer lang neerhangend blad en dikke stengels met roode bloemen.

Juli-Oct. *†T. rufa* (60 cm.) . . . p. st. f 0.15

Zeer fraaie, kleinbloemige variëteit met roode en gele bloemen.

Sept.-Oct. *†T. Rufus* (120 cm.) . . . p. st. f 0.35Juli-Oct. *†T. Torchlight* (80 cm.) . . . - 0.20

Met oranjegele bloemen. Zeer rijkbloeiend.

Mei-Juni. *†T. Tucki* p. st. f 0.20

De vroegst bloeiende; bloemen rood in geel overgaand.

Juli-Oct. *†T. Uvaria grandiflora* p. st. f 0.30

Gewone vuurpijl.

† TROLLIUS (60—80 cm.)

Deze behoren zeker tot de beste en schoonste vaste planten van het voorjaar. De langstelige, hartvormige bladeren vormen krachtige bossen, waaruit zich de slanke bloemstengels verheffen. De bloemen hebben, naar gelang van de soort, een prachtige, goudgele tot donker oranje-gele kleur en blijven na afgesneden te zijn, lang goed. Zij bloeien Mei-Juni, en gewoonlijk ook nog in den nazomer.

BLOEITIJD.

Mei-Juni. †T. *caucasicus Orange Globe* . . . p. st. f 0.30

Deze voor enkele jaren ingevoerde, nieuwe Trollius heeft enorm groote, oranjegele bloemen, welker bloembladeren naar binnen zijn gebogen, waardoor ze als het ware bolvormig zijn.

†T. *dschungaricus*, vroegbloeiend . . . p. st. f 0.30

†T. *Earliest of All* . . . „ „ - 0.40

Vroeg- en rijkbloeiend, met licht oranjegele bloemen.

Mei-Juni. †T. *Empire Day* . . . p. st. f 0.30

Rijkbloeiend, met zeer groote kogelronde, licht oranje-gele bloemen, waarin oranje meeldraden.

Mei-Juni. †T. *europæus superbus* . . . p. st. f 0.15

Grootbloemig, zuivergeel; rijkbloeiend.

Mei-Juni. †T. *Feuertroll* (65 cm.) . . . „ „ - 0.45

Nieuwe variëteit met schitterend oranje-roode bloemen.

Mei-Juni. T. *Fire Globe* . . . p. st. f 0.30

Grootbloemig donker oranje.

†T. *giganteus* . . . „ „ - 0.30

Mei-Juni. †T. *His Majesty* . . . „ „ - 0.40

†T. *hybr. Goldquelle* . . . „ „ - 0.45

Met prachtige oranjegele bloemen; zeer grootbloemig. Getuigschrift van Verdienste 11 Mei 1915.

Mei-Juni. †T. *japonicus Excelsior* . . . p. st. f 0.20

Deze variëteit bloeit zeer lang met grooten rijkdom van bloemen gedurende bijna den geheelen zomer en door de fraaie oranje kleur harer bloemen kan men haar gerust onder de schoonste snijbloemen rangschikken.

†T. *japonicus (Fortunei) fl. pl.* . . . p. st. f 0.30

Juli-Aug. †T. *Ledebouri* (120 cm.) . . . „ „ - 0.20

Zeldzame nieuwe plant met bekervormige, oranje-kleurige bloemen, waarboven de lange, donker-oranje meeldraden prachtig uitkomen.

Mei-Juni. †T. *Lichtball* . . . p. st. f 0.35

Extra groote, dichte bloemen, oranjegeel, stevige 50—60 cm. hoogte stelen.

Mei-Juni. †T. *Orange Crest* (80 cm.) . . . p. st. f 0.30

Met een menigte zuiver oranje bloemen.

Mei-Juni. †T. *pumilus Yunnanensis* . . . „ „ - 0.25

Bijzonder fraaie, nieuwe plant, met donkergroene bladeren en helder goudgele, bekervormige bloemen. Nieuwe soort, welke uit China ingevoerd is.

†T. *Springhill Beauty* . . . p. st. f 0.45

Zeer rijkbloeiend, helder oranjegeel.

BLOEITIJD.

Juli-Oct. *Tropæolum speciosum* . . . p. st. f 0.15

Schoone klimplant met fijne bladeren. Ofschoon zij jaarlijks tot aan den grond afsterft, bereikt zij des zomers in een korten tijd een hoogte van 3 M. en dikwijls nog veel hoger, en bloeit met prachtig scharlakenroode bloemen. Van deze plant kunnen alleen worteltjes worden afgeleverd, die eenige centimeters onder de oppervlakte in den grond moeten worden ingegraven. Het is echter raadzaam minstens 5 of 10 stuks te nemen, daar ze bij het verplanten dikwijls doodgaan.

April-Mei. *Uvularia grandiflora* (25 cm.) . . . p. st. f 0.25

Met fraaie gele bloemen; vroegbloeiend.

Mei-Juni. *Uvularia sessilifolia* (25 cm.) . . . „ „ - 0.25

Met gele bloemen.

Juli-Oct. *Verbascum Caledonia* . . . p. st. f 0.15

Met hooge stengels, waarvan de bloemen een eigenaardige bronsachtige kleur hebben.

Juli-Oct. *Verbascum densiflorum* (1 M.) . . . p. st. f 0.15

De bloemen zijn kopergeel met donker midden.

Aug.-Sept. *Verbascum hybridum Mars* . . . p. st. f 0.20

Nieuwe hybride tusschen V. Wiedemannianum en V. Pannosum, in mijne kweekerij door kruising ontstaan. Uit een rozet van prachtige viltige bladeren worden de 150 à 200 cm. hooge bloemstengels voortgebracht, die gedurende een langen tijd van den zomer prijken met groote isabella-kleurige bloemen, naar het midden in rood overgaand.

Aug.-Sept. *Verbascum vernale* . . . p. st. f 0.30

Zeldzame plant van middelmatige hoogte en een buitengewoon groote menigte kleine heldergele bloemen met bosjes van rose meeldraden.

Juli-Aug. *Verbascum Wiedemannianum* (1 M.), p. st. f 0.15

Met eigenaardig grof blad en lange stengels met violette bloemen.

Mei. *Veronica alpina* (30 cm.) . . . p. st. f 0.25

Met licht lila bloempjes.

Mei-Juni. *Veronica amethystina* (40 cm.), „ „ - 0.15

Met Amethystblauwe bloemen.

Mei-Juni. *aVeronica gentianoides fol. var.* (30 cm.), p. st. f 0.15

Deze soort heeft fraai zilverbont blad. De bloemen zijn wit met blauwe aderen.

Juni-Juli. *Veronica incana* (45 cm.) . . . p. st. f 0.20

Prachtig zilvergrijs blad, met violette bloemen.

†*Veronica longifolia subsessilis* (Hendersoni), p. st. f 0.25

De schoonste der Veronica's met groote trossen diep blauwe bloemen.

Juni. *aVeronica Royal blue* (30 cm.) . . . p. st. f 0.25

Zodenvormende soort met blauwe bloemen.

aVeronica rupestris . . . p. st. f 0.25

Laaggroeiend met blauwe bloemen.


aVeronica rupestris Trehani . . . „ „ - 0.25

Laaggroeiende soort met goudgeel blad en blauwe bloemen. Zeer geschikt voor mozaïekvakken.

Juli-Aug. *Veronica sibirica alba* (1 M.) . . . p. st. f 0.20

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

*Veronica spicata elegans.*

BLOEITIJD.

Juli-Aug. †*Veronica spicata elegans* . . . p. st. f 0.20

Met lange, spitse, elegante bloemaren, met witte bloemen.

Juli-Sept. *Veronica spicata Erika*. p. st. f 0.45

Nieuwe variëteit met prachtige donker rose-roode bloemen. Wordt ongeveer 30 cM. hoog.

Juli-Aug. *Veronica virginica* (90 cM.) . . . p. st. f 0.25

Deze soort heeft lange, lila bloemaren.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

*Vinca minor.*

BLOEITIJD.

Mei-Juni. *aVinca minor*, *Maagdepalm* . . . p. st. f 0.15

„ „ „ „ „ *fol. arg. var., Zilverbonte*
Maagdepalm, p. st. f 0.25

Deze beide kruipende planten, zoowel de groene met hare glanzige bladeren, als de schoone zilverbonte, hebben helderblauwe bloemen; ze kunnen niet genoeg worden aanbevolen voor randen. Zelfs onder boomen groeien ze goed, en maken, wanneer ze eenigen tijd gestaan hebben, een tapijt van blad en bloemen. Zooals de afbeelding laat zien, kunnen ze ook als hangplant dienst doen.

Viola cornuta G. Wermig p. st. f 0.15

Buitengewoon rijkbloeiend Viooltje met een prachtig violet-blauwe kleur.

April-Juni. *aViola gracilis*. p. st. f 0.15

Een zeldzame variëteit uit Griekenland. Vroeg in het voorjaar komen hare bekoorlijke bloempjes van een diep violetblauwe kleur en met klein wit oog te voorschijn.

VIOLA CORNUTA HYBRIDEN.

(TUFTED PANSIES.)

Deze viooltjes, ontstaan door eene kruising van *Viola cornuta* × *Viola tricolor maxima*, zijn in Engeland reeds vele jaren in cultuur en hebben daar, dank zij de vele goede eigenschappen, die deze hybriden van hare beide ouders hebben overgenomen, eene vrij algemeene bekendheid verworven. Zij hebben de groeiwijze van *V. cornuta*, en bloeien vanaf April tot in het late najaar bijna zonder ophouden, terwijl zij volkomen winterhard zijn. De bloemen komen, wat vorm en grootte betreft, overeen met de gewone grootbloemige pensées, doch de kleuren zijn meer effen en zuiverder.

Archle Grant, donker purperblauw.

Ardwell Gem, zwavelgeel.

Desdemona, donkerblauw.

Maggie Smoth, lilablauw.

Mauve Express, mauve.

Thomas Glenn, helderlichtblauw.

True Blue, donkerblauw.

Wm. Neil, paarsachtig rose.

p. 10 stuks in soorten f 1.20

p. 100 „ „ „ - 8.—

Juni-Juli. *Yucca filamentosa* (75 cM.) . . . p. st. f 0.40

Deze schoone sierplant doet veel denken aan een Aloë. De smalle, grijsgroene bladeren zijn neerhangend aan de uiteinden; terwijl de bloemen aan lange stevige stengels gezeten, klokvormig neerhangen en wit met een zacht groene tint gekleurd zijn.

ERICA'S (HEIDE.)

Voor beplanting van Rotspartijen kunnen de verschillende soorten van Heide niet genoeg worden aanbevolen. Het is wenschelijk den grond met wat heidegrond of turfstrooisel te vermengen. Ook verdient het aanbeveling, om bij strenge koude een lichte bedekking van dennentakken aan te brengen.

E. cinerea p. st. f 0.20
Laaggroeiend, met purperrose klokjes.

E. herbacea alba, wit " " - 0.20
" " **carnea**, rose " " - 0.20

Deze beide laatste bloeien reeds in Februari of Maart, zoodra vorst of sneeuw voorbij zijn. De planten zijn dan als 't ware met bloemen overdekt.

E. Mackayana plena p. st. f 0.20
Met fijne, dubbele, schitterend rose bloempjes, in groote menigte. Bloeit in Augustus.

E. mediterranea hybrida p. st. f 0.20
Bloeit in April-Mei met donkerrose bloempjes.

E. Tetralix alba, witte dopheide p. st. f 0.15

" **vagans alba**, wit " " - 0.15

" **rubra**, donkerrose " " - 0.20

Deze beide laatste vormen gedrongen polletjes, die in Augustus zeer rijk bloeien.

E. (Calluna) vulgaris Alportii p. st. f 0.15
Met lange, slanke, grijsgroene takjes en donkerroode bloemen.

E. vulgaris elata, lange takken, witbloeiend p. st. f 0.15
" **fl. pleno**, dubbele heide " " - 0.15

Deze laatste is een der mooiste van alle heidesoorten, met kleine dubbele lila bloempjes in groote menigte.

SIERGRASSEN EN GAZONPLANTEN.

Weinig planten zijn er, die in een tuin zooveel afwisseling aanbrengen als juist deze. Hetzij men ze plaatst aan den rand van den vijver, of als alleenstaande planten midden in het gazon, ze maken overal een even schoon effect. Sommige moeten in den winter worden bedekt voor de vorst, met een flinke hoop droge bladeren.

Bambusa Metake (180 cM.) p. st. f 0.55

Prachtige winterharde bamboeplant met groote donker-groene ingesn. bladeren. Ze heeft een oostersch aanzien.

Bambusa nana (60 cM.) p. st. f 0.40

" **scriptoria** (1 M.) " " - 0.45

" **viridi striata** (120 cM.) " " - 0.45

Carex japonica fol. var. (25 cM.) " " - 0.25

Eulalia japonica gracillima univittata (1½ M.)
p. st. f 0.25

Zeer decoratieve plant met lange, uiterst smalle, sierlijk aan den top neerhangende bladeren. Winterhard.

Eulalia japonica fol. var. (1½ M.) p. st. f 0.30

De smalle, lange, bonte bladeren buigen zich naar alle kanten rondom de plant met een sierlijke ronding naar buiten, wat aan deze plant een bijzonder schoon aanzien geeft. Winterhard.

Eulalia japonica zebrina (180 cM.) p. st. f 0.40

De bladeren van deze variëteit zijn dwars gestreept, als de huid van een Zebra, met sterk geteekende, geelachtige lijnen. Zeer schoon. Winterhard.

Eulalia japonica zebrina stricta (180 cM.), p. st. f 0.25

Wat kleur en vorm der bladeren betreft, gelijkt deze op de hiervoor genoemde, doch het gewas staat rechtop.

Gunnera manicata p. st. f 1.50

(Zie afbeelding blz. hiernevens.)

Prachtige, zeldzame gazonplant, waarvan de bladeren, zooals de afbeelding laat zien, een reusachtige afmeting krijgen. Moet evenals de *G. scabra* in den winter gedekt worden.



Gunnera scabra.

Gunnera scabra, extra zware planten p. st. f 0.30

" " kleinere planten " " - 0.25

De bladeren dezer plant hebben eenigszins den vorm van Rabarber, doch zijn veel grooter en geven haar een tropisch aanzien. Moet gedekt worden.

Gynerium argenteum, Pampasgras (potplanten),
p. st. f 1.50

Het bekende Pampasgras kan niet genoeg worden aanbevolen voor beplanting van gazons, waar deze plant gedurende den bloei in Sept.-Oct. een schitterend effect maakt. Vooral is dit het geval bij de *echte* soort, die zich niet uit zaad laat kweken en daardoor steeds hoog in prijs blijft. Zij is echter gemakkelijk te herkennen aan de zeegroene kleur harer bladeren, die een lengte van 2 Meter bereiken, terwijl de groote bloempluimen op enorm lange rechtopstaande bloemstengels zijn gezeten en een prachtige schitterend zilverwitte kleur hebben.

Gynerium argenteum elegans p. st. f 0.45

Deze variëteit wordt veel in Frankrijk gekweekt en daar als een der schoonste aanbevolen. Zij is daarbij zeer rijkbloeiend.

Holcus mollis fol. var. p. st. f 0.15

Laaggroeiend, bont siergras, geschikt voor randen. Winterhard.


Imperata sachariflora p. st. f 0.25
Met lange elegante zilveren pluimen.

Phalaris arundinacea fol. var. " " - 0.25

Zilverbont siergras, dat veel gebruikt wordt voor randen. Winterhard.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "



Gunnera manicata in de Kon. Kweekerij „Moerheim". Deze plant is breed $6\frac{1}{2}$ Meter, hoog $3\frac{1}{2}$ Meter.

Stipa pennata p. st. f 0.20
Fraai siergras met zeer fijne aren.

Behalve de bovengenoemde, zijn nog van de in de lijst der Vaste Planten en Rotsplanten voorkomende als gazonplanten aan te bevelen:

Agapanthus.
Bocconia's.
Cimicifuga's.
Crambe cordifolia.
Echinacea's.
Erythrochaete palmatifida.
Eupatoria purpurea.
Harpaliums.
Helianthus.
Inula macrocephala.

Paeonia's.
Papaver orientale var.
Polygonum amplexicaule oxyphyllum.
Rudbeckia laciniata Golden Glow.
Spiraea Aruncus.
" venusta (lobata).
Telekia speciosa.
Tritoma's.

VARENS voor den vollen grond.

Voor het aanleggen van perken op beschaduwde plaatsen, waar andere planten niet groeien, komen de vollegronds-Varens hoe langer hoe meer in gebruik. Vele soorten, vooral de *Adiantum* met fijne bladeren, leveren een onschatbaar materiaal voor bouquets.

Voor op stijve kleigronden verzuime men niet den grond te vermengen met bladaarde, boschgrond of turfstrooisel. Ofschoon bij elke plant de gemiddelde hoogte is aangegeven, moet men hierop niet te veel rekenen, want deze hangt veel af van de grondsoort. Ook groeien de planten, indien ze een of twee jaar vastgestaan hebben, gewoonlijk hooger dan het eerste jaar na de planting. Des winters bedekke men ze met zeer weinig blad of rugte.

Adiantum pedatum (50 cm.) p. st. f 0.20

Deze kan men gerust een der schoonste vollegronds-varens noemen. Zij wordt ook Venushaar of in 't Engelsch „Maidenhair" genoemd. De waaiervormig uitgespreide, fijne bladeren maken met haar staalblauwe bladstelen een onvergelykelijk schoon effect, ook in bouquets.

Allosurus crispus (15 cm.) p. st. f 0.50

Een welbek. Britsche varen, met peterseliëachtig blad.

Aspidium Goldianum p. st. f 0.45

" *splulosum* (70 cm.) " " - 0.40

Asplenium Rollandiae (60 cm.) " " - 0.40

Prachtige variëteit met smalle bladeren.

Asplenium Thelypteroides (70 cm.) " " - 0.40

Athyrium Filix femina congestum grandiceps (25 cm.)

p. st. f 0.55

" " " *Victorlae* (70 cm.) " " - 0.55

Cystopteris asplenoides (30 cm.) " " - 0.25

Dicksonia punctillobula (70 cm.) " " - 0.35

Lastrea Filix mas fluctuosa cristata " " - 0.45

" " " *grandiceps* (90 cm.) " " - 0.40

" " " *linearis* (80 cm.) " " - 0.40

" *pseudo mas polydactyla* (80 cm.) " " - 0.40

" *probingua crispa* " " - 0.55

Een zeer mooie variëteit met prachtig gekrulde bladeren.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "

<i>Lastrea rigida</i> (30 cm.)	<i>p. st. f</i> 0.35
<i>Onoclea sensibilis</i> (60 cm.)	„ „ - 0.20
Schoone forschgroeiende varen.	
<i>Osmunda cinnamomea</i> (75 cm.)	„ „ - 0.35
Dit is een zeer schoone, sterk groeiende soort met fraai blad.	
<i>Osmunda Claytoniana</i> (75 cm.)	<i>p. st. f</i> 0.45
Zeer zeker is dit de schoonste en de elegantste van deze soort. De bladeren hebben aan de voorzijde een schoon fluweelachtig aanzien.	
<i>Osmunda gracilis</i> (75 cm.)	<i>p. st. f</i> 0.45
Zooals de naam reeds aanduidt, heeft deze varen met haar slanke bladeren een eleganten, sierlijken vorm.	
<i>Osmunda regalis</i> (90 à 120 cm.)	<i>p. st. f</i> 0.20
Koningsvaren. Deze draagt, evenals de 3 vorige, de sporen niet zooals de meeste soorten onder aan de bladeren, doch in schoone bruine pluimen aan 'teinde der bladstelen.	

<i>Osmunda regalis cristata</i> (70 cm.)	<i>p. st. f</i> 0.30
Nieuwe variëteit van de „Koningsvaren" met gekruld blad.	
<i>Polypodium vulgare</i> (40 cm.)	<i>p. st. f</i> 0.20
„ „ <i>Barrowii</i>	„ „ - 0.80
<i>Polystichum Barnesi</i> (100 cm.)	„ „ - 0.40
„ „ <i>angulare divisilobum</i> (45 cm.)	„ „ - 0.90
„ „ <i>cristatum</i> (80 cm.)	„ „ - 0.30
„ „ <i>setosum</i>	„ „ - 0.45
„ „ <i>pumilum</i> (30 cm.)	„ „ - 0.25
<i>Scolopendrium undulatum</i> (30 cm.)	„ „ - 0.35
Schoone variëteit met sierlijk gegolfd blad.	
<i>Struthiopteris germanica</i> (75 cm.)	<i>p. st. f</i> 0.15
Duitsche Kelk- of Bekervaren, zoo genoemd, omdat de bladeren in den vorm van een beker groeien.	
<i>Struthiopteris japonica</i> (100 cm.)	<i>p. st. f</i> 0.50
„ „ <i>pennsylvanica</i>	„ „ - 0.55



D. Winterharde Waterplanten.

Liet men vroeger het begroeiën van vijvers, grachten enz. en de oevers daarvan geheel aan de natuur over, in den laatsten tijd heeft men ingezien, dat men deze met weinig kosten en moeite kon versieren. Die met * zijn gemerkt, plante men aan den oeverkant, zoodanig dat de wortelen steeds vochtig kunnen blijven. De andere planten plaatste men in zandigen tuingrond in een oude mand of kist, op den bodem waarvan men eenige steenen heeft gelegd. Deze late men voorzichtig zinken daar, waar het water $1\frac{1}{2}$ à 2 voet diep is. De verzending der waterplanten geschiedt vanaf omstreeks half April tot einde Mei. De soorten, die voor kleine aquariums geschikt zijn, heb ik met de letter *a* aangeduid.

* <i>Acorus Calamus</i> , <i>Kalmuswortel</i>	<i>p. st. f</i> 0.15
* <i>Alisma natans</i>	„ „ - 0.15
* <i>Allisma Plantago</i> , <i>Waterweegbree</i>	„ „ - 0.15
Deze plant geeft wijdvertakte 3 voet hooge bloemschermen met fijne lichtroze bloempjes.	
<i>Aponogeton distachyon</i>	<i>p. st. f</i> 0.50
Met prachtige witte, zeer welriekende bloemen. Niet geheel winterhard.	
* <i>Butomus umbellatus</i>	<i>p. st. f</i> 0.15
Zvanebloem met prachtig purperroode bloemschermen.	
* <i>Calla palustris</i>	<i>p. st. f</i> 0.15
De witte bloemen hebben veel overeenkomst met de Aäronskelk (<i>Slangenwortel</i> .)	
* <i>Caltha palustris</i>	<i>p. st. f</i> 0.15
Vroegbloeiende gele moerasplant (<i>Dotterbloem</i>).	
* <i>Caltha palustris fl. pl.</i>	<i>p. st. f</i> 0.15
Deze moerasplant heeft groote dubbele goudgele bloemen en bloeit zeer vroeg. (<i>Dubbele Dotterbloem</i> .)	
* <i>CALTHA PALUSTRIS HORTULANUS</i> BUDDE ,	

p. st. f 1.50

Eenige jaren geleden ontving ik van den bekenden Hortulanus, den Heer J. K. Budde te Utrecht, een pakje zaad van een half dubbele *Caltha palustris*, die ik toen in den handel gebracht heb onder den naam van *C. palustris semiplena*. Onder de zaailingen bevond zich een enkele plant die uitmuntte door zeer groote bloemen die er ongeveer uitzagen als een gele Cactus Dahlia. Het is mij tot heden nog niet gelukt de plant uit zaad echt te krijgen en daar zij langzaam groeit, kon de vermeerdering slechts uiterst langzaam geschieden. Eindelijk heb ik er een partijtje van gekweekt en kan ze nu voor

de eerste maal aanbieden. Ik heb in het bovenstaande aanleiding gevonden om deze prachtige Nieuwigheid naar den Heer Budde te noemen.

* <i>Caltha palustris nana plena</i>	<i>p. st. f</i> 0.15
Laaggroeiende dubbele gele Dotterbloem.	
* <i>Caltha palustris semiplena</i>	<i>p. st. f</i> 0.25
Schoone, nieuwe halfdubbele Dotterbloem; eene groote verbetering van de enkele variëteit. De vorm is sierlijker dan die der dubbele.	
* <i>Caltha polypetala</i> , NIEUW!	<i>p. st. f</i> 0.20
Met reusachtige bladeren en groote bloemen; bloeit vroeg in het voorjaar.	
* <i>Eriophorum angustifolium</i>	<i>p. st. f</i> 0.10
Moerasplant met zilverwitte wolachtige pluimen.	
* <i>Glyceria spectabilis fol. var.</i>	<i>p. st. f</i> 0.15
Deze plant behoort tot de grassen en haar elegante omgebogen bladeren zijn prachtig wit en groen gestreept. Daar de oorspronkelijke soort aan waterkanten groeit, is deze plant zeer aan te bevelen voor aanplanting langs vijvers, enz. De hoogte is ongeveer 90 cm.	
* <i>Hottonia palustris</i>	<i>p. st. f</i> 0.10
Losdrijvende waterplant met zeer schoone rozerode bloemtrossen.	
* <i>Hydrocharis morsus ranæ</i>	<i>p. st. f</i> 0.10
* <i>Iris Pseudacorus</i> , <i>Gele Zwaardlelie</i>	„ „ - 0.10
* <i>Menyanthes trifoliata</i>	„ „ - 0.15
<i>Waterdrieblad</i> ; met zeer schoon gevormde vleeschkleurige bloemen.	
<i>Nuphar luteum</i> , <i>Gele Waterlelie</i>	<i>p. st. f</i> 0.15

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

*Nymphaea Marliacea.*

WINTERHARDE NYMPHAEA'S (Waterlelies).

N. alba, Witte Waterlelie p. st. f 0.25

De Waterlelies zijn voldoende bekend, om elke aanbeveling overbodig te maken. Een schotel van deze bloemen met bruine beukenbladeren er tusschen maakt een hoogst verrassend effect. De navolgende collectie Waterlelies met verschillend gekleurde bloemen kan ik naast de witte en gele zeer aanbevelen.

N.B. De verzending der Waterlelies uit onderstaande lijst heeft bij voorkeur in de maand Mei plaats. Om echter eenige zekerheid te hebben, dat men de verlangde soorten ontvangt, is het wenschelijk vroegtijdig te bestellen.

N. AURORA p. st. f 1.40

Prachtige, grootbloemige variëteit, zeer rijkbloeiend. De bloemen welke bij het opengaan geel met rose zijn. worden spoedig fraai rood.

N. FROEBELI p. st. f 2.—

Een der beste roode waterlelies. De groote bloemen zijn donker wijnrood. Zeer sterke soort.

N. GLADSTONIANA p. st. f 1.40

Reusachtige sneeuw witte bloemen, goudgele stampers.

N. JAMES BRYDON p. st. f 3.50

De fraaie, groote bloemen dezer soort zijn rose karmijn.

N. LAYDECKERI PURPURATA p. st. f 1.50

Met groote, helder karmozijnroode bloemen; sterke en rijkbloeiende soort.

N. LAYDECKERI ROSEA PROLIFERA p. st. f 4.—

Een buitengewoon mildbloeiende verscheidenheid met kleinere welriekende bloemen. Deze zijn bij het opengaan vleeschkleurig en worden later rose en donkerkarmijn; de beste voor kuipen en ondiepe bassins.

N. MARLIACEA ALBIDA p. st. f 1.40

Met enorm groote zuiver witte bloemen.

N. MARLIACEA CARNEA p. st. f 1.25

Zacht vleeschkleurig, grootbloemig.

N. MARLIACEA CHROMATELLA " " - 0.90

Enorme prachtige lichtgele bloemen en donkerbruin gemarmerd blad.

N. ODORATA ROSEA p. st. f 1.25

Met mooie rose bloemen.

N. PAUL HARIOT " " - 3.—

Grootbloemig heldergeel, zacht koperkleurig genuanceerd. Zeer mildbloeiend.

Bovengenoemde Nymphaea's, welke alle volkomen winterhard zijn, zijn buiten zonder bedekking of kunstmatige warmte gekweekt en zullen daardoor bij een goede behandeling spoedig aanslaan.

Wanneer men van eéne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "

Ranunculus Lingua	p. st. f 0.15
*Sagittaria sagittifolia, Pijlkruid.	„ „ - 0.15
a* „ japonica, enkelbloemig	„ „ - 0.30
a* „ „ fl. pl., dubbelbl.	„ „ - 0.45

Deze beide planten gelijken eenigszins op het gewone Pijlkruid, doch hebben forsker groeiwijze. De groote witte bloemen hebben een middellijn van 3-4 cm. en maken langs oevers van vijvers of grachten een zeer schoon effect.

*Scirpus lacustris, Bies	p. st. f 0.15
Stratiotes aloides	„ „ - 0.10
*Typha angustifolia	„ „ - 0.15

Met zeer eigenaardige bruine zaadpluimen.

*Typha latifolia	p. st. f 0.15
Evenals de vorige; blad iets breeder.	

aUtricularia vulgaris, Blaasjeskruid	„ „ - 0.10
--	------------

Zeer eigenaardig gewas, dat gewoonlijk onder water groeit. Tegen den bloei vullen zich de blaasjes, waarmee de plant kleine waterdiertjes vangt, met lucht, waardoor de plant aan de oppervlakte komt en dan bloeit met fraaie gele bloemen.

aVillarsia nymphæoides	p. st. f 0.15
----------------------------------	---------------

De bladeren hebben eenige overeenkomst met de witte Waterlelie en zijn bruin gevlekt. De bloemen zijn geel. (Watergentiaan.)

AFDEELING III.

Boomen en Heestergewassen.

A. Struikrozen.



Het planten geschiedt het best vanaf eind October tot eind November, of van half Maart tot eind April. De bodem moet voor rozen minstens 60 cm. diep omgewerkt zijn, en zwaar, vruchtbaar en vochthoudend wezen.

Vóór het planten late men de rozen vooral niet in zon of wind liggen. Mochten ze onverhoopt zijn uitgedroogd, zoo legge men ze eerst een paar uur in water.

Waar de bodem te vast en te nat is, vermene men dien met fijn turfstrooisel, verteerd blad en mest; door

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

drogen zandigen grond mengte men eenige klei of leem en vooral koemest. Men moet ze niet plaatsen bij groote boomen of in de schaduw. Bij het planten make men vooral ruime gaten, terwijl men zorgt, dat de mest niet aan de wortels raakt en deze laatste goed met den grond vermengd wordt. Stevig met den voet aandrukken is vooral op lichte gronden beslist noodzakelijk. De rozenperken mogen vooral op droge gronden niet te hoog worden aangelegd en zooveel mogelijk vlak. De struikrozen moeten zoo diep worden geplant, dat de plaats van veredeling 3 à 5 cm. onder de oppervlakte komt.

Vóór den winter behandelde men de struikrozen als volgt: de struiken worden tot op een voet hoogte rondom aangehoogd met aarde en de daardoor ontstane gaten met verteerde koemest gevuld. Men bedekke daarna het geheele perk met droog blad, waarover men eenige dennentakken kan leggen tegen het opwaaien der bladeren. In plaats van droog blad kan men ook turfstrooisel nemen.

Het snoeien der rozen geschiedt jaarlijks begin April; sterk groeiende soorten moeten lang gesnoeid worden d. w. z. de takken moeten niet te sterk worden ingekort, want anders zou de struik wel veel nieuwe takken vormen maar weinig bloeien. Zwak groeiende soorten moeten evenwel sterk worden ingesnoeid, daar men anders spoedig veel zwak hout zou krijgen, terwijl ze toch van nature reeds goed bloeien. Het oude en zwakke hout, alsook waterloten, moeten zooveel mogelijk worden verwijderd en krachtige gezonde eenjarige takken behouden. Men verzuime vooral niet de in 't voorjaar geplante rozen direct na het planten te snoeien, en wel voor de eerste maal alle soorten zeer kort. Het is meermalen gebeurd, dat men mijn advies vroeg over het slecht groeien van nieuw geplante rozen en meestal bleek mij, dat ze geheel zonder snoeien waren geplant en de struiken dus voorgoed waren bedorven.

Nieuwere Polyantha Rozen.

Deze laten zich zeer goed gebruiken als potplanten en voor perken, daar zij zoo lang bloeien.

ERNA TESSCHENDORFF p. st. f 0.25

Een sport van Mad^{me} N. Levavasseur met schitterend karmijnroode bloemen, welke zich bijzonder leent zoowel voor perken als voor potcultuur.

JESSIE p. st. f 0.25

Bloeit onafgebroken gedurende den geheelen zomer en heeft een prachtig, glanzend loof. Groote trossen met helder kersroode bloemen. De kleur verbleekt niet.

MAMAN TURBAT p. st. f 0.25

Nieuwigheid met krachtigen groei en prachtige zacht-rose bloemen.

ORLEANS p. st. f 0.25

Geraniumrood met rose. Centrum wit. Een mooie kleurencombinatie.

YVONNE RABIER p. st. f 0.25

De beste witte Polyantharoos; zeer groot- en rijkbloeiend.

KEURCOLLECTIE VAN STRUIKROZEN.

N.B. H beteekent: hybride-remontant; T: theeroos; TH: theehybride; P: Pernetiana.

ARNOLD JANSSEN TH p. st. f 0.25

Aanbevelenswaardige roos van een opvallende zeer effectvolle kleur, n.l. gloeiend donker karmijnrood. De bloemen zijn groot, gevuld en welriekend.

BRILLIANT TH. p. st. f 0.30

Met fraaie, glanzend donker scharlakenroode bloemen.

BRITISH QUEEN TH p. st. f 0.30

Met groote gevulde bloemen van een zuiverwitte kleur. Rijkbloeiend.

CHATEAU DE CLOS VOUGEOT TH . . . p. st. f 0.35

Fluweelrood met vuurrooden weerschijs, later in donkerkarmijnrood overgaand. Van krachtigen groei; zeer rijkbloeiend.

COLONEL LECLERC TH p. st. f 0.20

Kersrood met karmozijnrooden weerschijs, groote, tamelijk volle en ronde bloem.

EDWARD MAWLEY TH p. st. f 0.25

Prachtige roos van een donker karmijnroode kleur; rijkbloeiend.

ETOILE DE FRANCE TH. p. st. f 0.25


De bloem heeft een zeldzaam schoonen vorm en haar kleur is fluweelachtig donkerrood.

FRAU CARL DRUSCHKI H p. st. f 0.25

Zuiver witte, doorbloeiende roos, welke beschouwd kan worden als een der beste witte rozen.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "



Een veld met Rozen in de Koninklijke Kweekrij „Moerheim.”

STRUIKROZEN (vervolg).

GENERAL MC. ARTHUR TH *p. st. f 0.20*
Schitterend scharlakenroode bloem. Grootte roos, eenigszins plat gevormd. Rijkbloeiend.

GEORGE C. WAUD TH *p. st. f 0.20*

Prachtig oranje-scharlaken; grootte, goed gevulde bloem; zeer geurig.

GEORGE DICKSON H *p. st. f 0.20*

Zeer welriekend en rijkbloeiend met fluweelachtige, zwart karmozijnroode bloemen.

HUGH DICKSON H *p. st. f 0.20*

Grootte schoongevulde bloemen van een schitterend karmijnroode kleur en een onberispelijken vorm.

JONKHEER J. L. MOCK TH *p. st. f 0.25*

Sterke groeier. De bloemen, welke in grooten rijkdom worden voortgebracht, staan op stevige en rechte stelen en zijn zeer groot, fijn gevormd en van een heerlijken geur. De kleur is karmijnrood, overgaand in prachtig rose. *Extra.*

KAISERIN AUGUSTE VICTORIA TH *p. st. f 0.30*

Van buiten wit, binnen geel. Bekende snijroos.

LADY ALICE STANLEY TH *p. st. f 0.20*

De kleur is aan de buitenzijde diep koraalrood en aan de binnenzijde dof vleeschkleurig.

LADY ASTOWN TH *p. st. f 0.25*

Schoone, sterk groeiende roos, met prachtige spitse knoppen, welke bloemen van fijn rose kleur met geelachtig hart voortbrengt. Zij bloeit bijna den geheelen zomer.

LADY HILLINGDON T *p. st. f 0.25*

Diep abrikoosgeel, spitse knoppen; zeer rijkbloeiend en krachtige groei; heerlijke trekroos.

LAURENT CARLE TH *p. st. f 0.20*

Schitterend karmozijnrood; zeer grootte bloem, lange stelen.

LIBERTY TH *p. st. f 0.25*

Glanzend karmozijnrood, rijkbloeiend en van een onberispelijken vorm en houding. Uitstekende perkroos.

LOUISE CATHERINE BRESLAU P *p. st. f 0.25*

Van krachtigen groei met mooi bronsgroen blad. Knop lang, koraalrood genuanceerd met chroomgeel. Bloem zeer groot en vol, kleur koperachtig rood met oranje en geel.

MAD. CAROLINE TESTOUT TH *p. st. f 0.20*

Vleeschkleurig rose, zeer geschikt voor perken.

MAD. EDMOND ROSTAND P *p. st. f 0.30*

Sterke groeier, met lange knoppen. De fraaie grootte bloemen zijn zacht vleeschkleurig.

MAD. EDOUARD HERRIOT, P NIEUW! *p. st. f 0.25*

Zonder twijfel een der beste rozen. Zij bloeit zeer rijk met middelgrootte halfgevulde bloemen, welke koraalrood zijn, met geel en saffraanrose. Vooral de knoppen hebben een prachtige nieuwe kleur. Goede trek-, snij- en perkroos, welke herhaaldelijk met hoogste prijzen werd bekroond.

MAD. SEGOND WEBER TH *p. st. f 0.20*

Zalmkleurige rose; grootte, fraai gevormde bloem.

MARY COUNTESS OF ILCHESTER TH *p. st. f 0.25*

Levendig karmijnrood, grootte bloemen met grootte, ronde bloembladeren.

MARQUISE DE SINETY TH *p. st. f 0.25*

Prachtige oranjekeurig roos.

MELANIE SOUPERT TH *p. st. f 0.30*

Met lange spitse knoppen en bloemen van een fraaie goudgele kleur.

MEVROUW DORA VAN TETS TH *p. st. f 0.25*

Met middelgrootte, welriekende bloemen van eene schitterend donkerscharlaken-karmozijnroode kleur met eene fluweelachtigen weerschijs.

MRS. AARON WARD TH *p. st. f 0.25*

Prachtige gele roos met zalmkleurig rose weerschijs. Rijkbloeiend; grootte volle bloem.

MRS. ANDREW CARNEGIE TH *p. st. f 0.30*

Prachtige nieuwe roos met grootte zuiverwitte bloemen; grooter dan Fr. C. Druschki en met een heerlijke geur.

MRS. WALLACE H. ROWE TH *p. st. f 0.30*

Nieuwe roos van een bijzondere mooie mauve kleur.

PHARISAËR TH *p. st. f 0.20*

Zeer rijkbloeiende soort met lichtrose bloemen, welke kleur in het midden in donker zalmkleur overgaat.

RAYON D'OR P *p. st. f 0.30*

Met prachtige oranje-kopergele, karmijn gestreepte, grootte knoppen; de grootte bloemen zijn van een prachtig cadmium-geel, bij het verbloeien in zonnebloemgeel overgaand.

RED LETTER DAY. TH *Nieuw!* *p. st. f 0.60*

De felst roode kleur; prachtroos.

RICHMOND TH *p. st. f 0.25*

Uit Amerika afkomstige schoone roos met schitterend donker-bloedroode bloemen.

SUNBURST TH, NIEUW! *p. st. f 0.25*

Bloeit zeer rijk met prachtige, grootte en schoongevormde bloemen, van Cadmium-gele kleur, overgaand in oranjegeel.

WILLOWMERE, P NIEUW! *p. st. f 0.20*

Een nieuwe roos welke alle aanbeveling verdient. De lange knoppen op krachtige bloemstelen zijn koraal-karmijnrood. De bloem is groot, lang en en kelkvormig, van schitterende krechtroode kleur met in het midden geel, aan de punten der petalen karmijnrose.

STRUIKROZEN

in verschillende soorten naar mijne keus.

10 stuks in 10 soorten f 2.—

100 " " 25 " - 18.—

KLIMROZEN.

in soorten naar mijne keus.

p. st. f 0.30.

HOOGSTAMROZEN

in prima soorten naar mijne keus.

p. st. f 1.—.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "

ROSA RUGOSA.**JAPANSCH ROZEN.**

Deze rozen kunnen zonder eenige bedekking den strengsten winter doorstaan. Zij groeien tot 2 Meter hoog, en bloeien zeer rijk. De takken zijn over de geheele lengte met groote, dicht opeengeplaatste stekels voorzien, waardoor ze uitnemend geschikt zijn tot het aanleggen van heggen, die spoedig zoo worden, dat er hond noch kip door kan. De bloemen zijn enkel, doch schoon gevormd.

Rosa rugosa, helder karmijnrood . . . p. 10 st. f 1.50

„ „ wit . . . „ „ „ - 1.50



Rosa rugosa.

B. Groenblijvende Sierheesters en Azalea's.

RHODODENDRONS.

Van dit schoone plantengeslacht met donkergroene glauzige bladeren, welke ook gedurende den winter het oog aangenaam aandoen, kan ik eene zeer schoone collectie aanbieden, welke de meest mogelijke variatie van rijkgekleurde bloemen oplevert. Op kleiachtige gronden moet de aarde met turfstrooisel worden vermengd, indien men de planten flink wil laten groeien en bloeien. Zij teelen het weligst in zwarte, liefst veenachtige tuinaarde. Een flinke bemesting met zuivere koemest kan in alle gevallen worden aanbevolen.

De prijs hangt af van de grootte der planten en het aantal knoppen.

Nieuwe Rhododendron Hybride.

PINK PEARL, de schoonste vleeschkleurig rose Rhododendron met enorm groote trossen en bloemen. Waardevolle nieuwigheid, welke zonder twijfel eene der schoonste is, die thans in cultuur is. Om te vervroegen zoowel als voor perken is zij bijzonder geschikt.

Sterke planten met knoppen van f 1.75 tot f 3.50 p. st.

RHODODENDRON-HYBRIDEN.**SOORTENLIJST.**

Abraham Lincoln, violetrood, donkere vlek.

Album elegans, wit.

Album grandiflorum, wit.

Alexander Adie, helderrood.

Bertha Parson, lila rose.

Bylslanum, centrum wit, roode boorden met het wit samenvloeiend.

Carl Mette, vurig donkerrood.

Catawblense grandiflorum album, wit met zacht lila weerschijn.

Charlie Waterer, scharlakenrood, licht midden.

Chevallier Felix de Sauvage, zacht helderrood, donker purperen vlek.

Cunningham White, wit.

Cynthia, rose karmijn.

Doncaster, schitterend donker karmijn.

Dr. Torry, rose violet met bruine vlek.

Duke of Connaught, karmozijnrood, licht midden.

Fastuosum fl. pl., dubbelbloemig, licht lila.

Fred. Waterer, vurig karmijn, grootbloemig.

Gerda, wit met breeden, donkerrooden rand.

Giganteum, zacht karmijn.

Gloriosum, vleeschkleur.

Gomer Waterer, wit met zachten blos, grootbloemig.

John Walter, helderrood.

John Waterer, schitterend karmijn, grootbloemig.

Julius Schläme, zacht rose, purperen vlek.

Kate Waterer, helder zacht rose, centrum lichter, geelkleurige vlek.

Lady Clementina Walsh, bijna wit met lichtrose rand.

Lee's dark purple, donkerpaars.

Lord Roberts, donkerrood met zwarte vlek.

Madame Carvalho, wit met bronzen vlek.

Madame Moser, dubbel rood.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

Madame Victor Charon.

Madame Wagner, centrum zuiver wit, helder zacht-roode rand.

Marchiones of Lansdowne, bleek rose, donkere vlek.

Miss Milner, karmijnrood.

Monsieur Thiers, helder karmijnrood.

Mrs. John Waterer, zacht rood.

Mrs. R. S. Holford, helder rood.

Mrs. Tom Agnew, zuiver wit, bronzen vlek.

Parson's Gloriosum, rose wit, gele vlek.

Prince Camille de Rohan, wit met rose, donkere purperen vlek.

Princess Mary of Cambridge, centrum wit, lila rand.

Princesse de Wagram, karmijnrood.

Prof. Dr. Drude, paars.

Purpurea elegans, purperrood.

Robert Croux, donkerrood.

Rosamundi, helder rose.

Stella (Waterer), wit met lila tint, sterk geteekende vlek.

Stephan Davies, karmijnrood, donkere vlek.

The Queen, wit met lila tint.

William Austin, hoog rood.

Zware planten in bovenstaande soorten met veel knoppen . p. st. f 0.60, f 0.80, f 1.— en f 1.25

Extra zware planten met veel knoppen,
p. st. f 1.50 à f 2.50

N.B. De prijzen worden geregeld naar het aantal knoppen en naar de grootte in verband met de soorten. Wegens den enormen voorraad kan ik deze planten zóó billijk aanbieden.

Bij afname van groote hoeveelheden voor perken of onderbeplanting onder hooge boomen, prijs per correspondentie.

RHODODENDRON PRAECOX.

Alpenroos, welke zeer vroeg en rijk bloeit met schoone rozeroode bloemen per stuk f 0.50 à f 0.75

ANDROMEDA FLORIBUNDA.

Bloeit reeds in April met witte bloemtrossen,
per stuk f 0.75

WINTERHARDE AZALEA'S.

Prachtige grootbloemige heesters, welke reeds zeer vroeg in vele kleuren bloeien. Uitstekend geschikt voor het beplanten van perken of om te worden geforceerd. Zij laten in den winter het blad vallen.

Azalea's in soorten op naam,
per stuk f 0.60 à f 1. à f 1.50

„ **Mollis chinensis hybriden**, p. st. - 0.50 „ - 0.60

AZALEA BALSAMINAEFLORA.

Een der schoonste Azalea's met groote dubbele, zalmkleurig roode bloemen, die aan Balsaminen doen denken. Zeer rijkbloeiend. Wegens den lagen, eenigszins kruipenden groei, is dit een prachtige plant voor rotspar-tijen. Zij laat zich ook zeer goed in de kamer in bloei trekken per stuk f 0.60

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

AZALEA HINODIGIRI.

Bloeit met een groot aantal groote prachtige vuur-roode bloemen. Ook als kamerplant zeer geschikt en gemakkelijk in bloei te trekken per stuk f 0.60

AZALEA LEDIFOLIA ALBA.

Buitengewoon rijkbloeiend met prachtige, groote, zuiverwitte bloemen. Deze is eveneens volkomen winterhard en een goede groeier per stuk f 0.60 à f 0.90

AZALEA YODOGAWA.

Fraaie Japansche Azalea met groote dubbele bloemen van een purper-violette kleur per stuk f 0.80

BUXUS (RANDPALM).

Zeer aan te bevelen voor randen om perken in stadstuintjes of voor randen om borders. Men plante 7 à 8 stuks per strekkende Meter per 100 stuks f 5.—

DAPHNE CNEORUM.

Prachtig groenblijvend heestertje met klein blad en schitterend roode bloemen per stuk f 0.60

ILEX AQUIFOLIUM (Hulst).

	Hoogte in cM.	p. stuk
Zilverbont	80—90	f 0.70
	100—120	- 1.—
	70—90	- 0.70
Goudbont	100—120	- 1.—
	130—150	- 1.30
Hodginsi , donkergroen, grootbl.	70—80	- 0.70
	90—100	- 1.—
Perado , „ „	80—90	- 0.70
	100—110	- 1.—
	120—140	- 1.30
Pyramidais (Bes-Hulst)	60—80	- 0.70
	90—100	- 1.—

Deze variëteit brengt in het najaar een menigte vuur-roode bessen voort.

	Hoogte in cM.	p. stuk
Camellifolia , Camellia-blad.	80—90	f 0.80
	100—110	- 1.—
	120—130	- 1.30
Silver Queen , Zilverbont, grootbl.	70—80	- 1.—
	90—100	- 1.20
	90—100	- 1.—
Mad. Brlot , Zilverb., grootbl., extra	110—120	- 1.25
	130—140	- 1.50
GOLDEN KING (Nieuw)	60—70	- 1.10
	80—90	- 1.50

Prachtige nieuwe Hulst met donkergroene, goudgerande, groote bladeren van eenen onberispelijken vorm. In mijn kweekkerij staan planten, die zonder eenige beschutting de strengste winters hebben verdragen. Deze aanbevelenswaardige soort verwief te Londen een 1ste klas Certificaat.

	Hoogte in cM.	p. stuk
Golden Queen	90—100	f 1.—
	110—120	- 1.25
PERNYI	50—60	- 2.—
	70—80	- 3.—

Prachtige nieuwe soort met kleine bladeren; iets geheel eigenaardigs.

	Hoogte in cM.	p. stuk
Ilex Aquifolium	90—110	f 0.70
	120—140	- 0.90

Gewone groene Hulst. Geschikt voor onderbeplanting.

KALMIA LATIFOLIA.

Een der schoonste en dankbaarste groenblijvende Heesters, welke gedurende de maanden Mei en Juni overdekt zijn met prachtige vleeschkleurige bloemen, die fraai afsteken tegen de donkergroene bladeren.

per stuk f 0.60

MAGNOLIA.

Deze heester, welke reeds vroeg in 't voorjaar bloeit met fraaie bloemen, wordt ook tulpenboom genoemd.

Soulangeana, sterke struiken. Met veel knop. Hoogte 2 à 2½ M. per stuk f 1.50

C. Coniferen.

Bijna alle soorten van Coniferen blijven ook des winters groen. Ze worden veelvuldig geplant zoowel in groepen of in perken en als alleenstaande boomen. Wil men schuren, muren of schuttingen aan het oog onttrekken, zoo zijn daarvoor de Coniferen bij uitstek geschikt. Op kleigronden is het aanbevelenswaardig om den grond met turfstrooisel te vermengen. In alle geval moet vóór de planting de grond flink worden losgewerkt.

De door mij gekweekte Coniferen zijn dikwijls verplant en hebben daardoor vaste kluiten, hetgeen de kans op goed aangroeien aanmerkelijk verhoogt. Men vraagt mij dikwijls hoeveel stuks benodigd zijn voor een perk. Dit kan men echter zelf gemakkelijk uitrekenen, wanneer men nagaat, dat het aantal vierkante meters van de oppervlakte van het perk ook nage-noeg het aantal der benodigde Coniferen aanwijst.

De meest geschikte tijd om Coniferen te verplanten is van begin April tot einde Mei, en half Augustus tot half October. Ze worden in verschillende grootten geleverd en hoofdzakelijk in de volgende soorten.

Meestal worden de wortelen ingepakt in gaaslinnen, hetwelk bij het planten vooral niet mag worden verwijderd. Indien de grond droog is, maakt men de kluit vóór het planten wat vochtig.




N.B. Mijne Coniferen zijn met bijzondere zorg gesnoeid, van onderen tot boven goed gevuld, en daardoor in één woord pracht-exemplaren te noemen.

Gezicht op een partij *Picea pungens glauca* Kosteri.

	Hoogte in cM.	Prijs p. stuk.
Abies Arizona	60—70	f 2.—
„ concolor violacea	60—70	- 0.75
	80—90	- 0.90
	100—110	- 1.20
„ Nordmanniana , welbekende schoone Nordman Spar	50—60	- 1.—
	70—80	- 1.25
Chamæcyparis (Cupressus) Lawsoni , gewone snelgroeiende donkergroene Cypres	100—110	- 0.50
	120—130	- 0.60
	140—150	- 0.75
„ „ „ Alumi	80—90	- 0.80
	100—110	- 1.20
„ „ „ Silver Queen	70—90	- 0.60
	100—120	- 0.80
	130—140	- 1.—
„ „ „ Stuarti aurea	130—140	- 1.30
„ „ „ Triomf van Boskoop , nieuw! een der schoonste met blauw-groen loof.	110—120	- 1.10

	Hoogte in cm.	Prijs p. stuk.
Juniperus japonica aurea	80—90	f 1.—
	100—110	- 1.20
	120—140	- 1.50
„ Pfitzeriana	70—80	- 0.80
	90—100	- 1.10
„ virginica elegantissima	60—70	- 0.80
	90—100	- 1.—
	70—80	- 0.80
„ „ glauca	90—100	- 1.—
	110—130	- 1.20
	140—160	- 1.50
Picea exceisa Alcockiana	110—120	- 0.80
„ „ inverta , prachtige treurspar met neerhangende takken.	130—150	- 1.—
„ pungens glauca Kosteri . DE BESTE BLAUWE SPAR, behoudt ook des winters haar prachtige blauwe kleur. (Zie afbeelding op blz. 106.)	90—100	- 2.—
	100—110	- 2.50
„ PUNGENS MOERHEIMI , belangrijke verbetering van de voorgaande. De kleur der naalden is zeer helder blauw	60—70	- 3.—
	80—90	- 5.—
	80—100	- 0.80
Pseudotsuga Douglasi glauca elegans , mooie blauwgroene soort met lange naalden	100—120	- 1.—
	130—150	- 1.20
	160—170	- 1.50
„ „ „ Moerhelmi , komt in vorm overeen met de vorige, maar groeit meer gedrongen en de kleur is helderblauw	80—100	- 1.—
	110—130	- 1.20
	140—160	- 1.50
Retinospora squarrosa Veitchi	60—70	- 0.50
	80—90	- 0.60
	100—110	- 0.85
	120—130	- 1.—
„ obtusa aurea	60—70	- 0.70
	80—100	- 1.—
	90—100	- 0.90
„ „ „ Youngi	110—120	- 1.10
	130—140	- 1.30
	150—160	- 1.50
„ „ felicoides	60—70	- 1.20
„ „ gracilis	60—70	- 1.20
	80—90	- 1.50
	100—110	- 2.—
„ Crippsi , NIEUW! schoon heldergeel. Volkomen winterhard	80—90	- 1.10
	100—110	- 1.25
	120—130	- 1.40
	140—150	- 1.60
„ pisifera filifera	70—80	- 0.80
	90—100	- 1.—
	110—120	- 1.20
„ „ plumosa	80—90	- 0.50
	100—110	- 0.70
	120—130	- 1.—
„ „ „ aurea	60—70	- 0.60
	80—90	- 0.80
Sciadopitys verticillata , Japansche parasolden, prachtig vooral als alleenstaande plant	110—130	- 7.—
	140—150	- 9.—
	160—170	- 12.—
Taxus baccata , bekende Taxus	60—80	- 0.80
	90—110	- 1.20
	120—130	- 1.60
	140—150	- 2.—
„ „ aurea variegata , gedrongen groeiende goudbonte variëteit der voorgaande	65—85	- 1.—
„ „ semperaurea	50—60	- 0.75
	70—80	- 1.—
„ fastigiata (hibernica) zuilvormige Taxus	70—80	- 0.80
	90—100	- 1.20
„ „ aurea variegata , zuilvormige goudbonte Taxus	60—70	- 1.—
	80—100	- 1.30

	Hoogte in cm.	Prijs p. stuk
<i>Taxus fastigiata nova</i>	60—80	f 1.—
	90—100	- 1.30
„ <i>pyramidalis Overeinderi</i> , piramidevormig	70—80	- 0.80
	90—100	- 1.—
	110—120	- 1.25
<i>Thuya occidentalis</i> , bekende Conifeer, die veel gebruikt wordt voor het planten van heggen, waarvoor ze dan ook meer dan eenige andere plant geschikt is, daar zij, naar verhouding, weinig onderhoud vordert en prachtig ondoordringbare hagen vormt	160—180	- 0.80
	180—200	- 1.—
<i>Thuya occidentalis lutea</i> , goudgeel	110—120	- 0.80
„ <i>Wareana aurea</i> , geel	60—70	- 0.60
<i>Thuyopsis borealis</i>	110—120	- 1.—
	130—140	- 1.50
„ <i>doiobrata</i>	60—70	- 0.80
	80—90	- 1.—



D. Klimplanten.

Onderstaand sortiment kan ik ten zeerste aanbevelen tot het bedekken van muren of schuttingen, tot het bekleeden van waranda's en priëltjes of wel om oude boomstammen aan het oog te onttrekken. Enkele klimplanten, die 's winters afsterven als *Tropaeolum speciosum*, enz. zijn onder de rubriek „Vaste planten” opgenomen.

Ampelopsis Henryana p. st. f 0.60

Met zeer mooi gekleurd blad en zelfhechtend evenals A. Veitchi.

Ampelopsis quinquefolia p. st. f 0.40

Algemeen bekende wilde wingerd, die veel wordt gebruikt voor priëlen en waranda's. In den herfst neemt het blad een prachtig roode kleur aan.

Ampelopsis Veitchi p. st. f 0.50

Zelfklimmende wilde wingerd. Deze moet gedurende den eersten winter na de planting worden gedekt. Zij is bij uitstek geschikt voor bedekking van muren en schuttingen, daar zij zich door zuigworteltjes daaraan vasthecht en de loten vlak tegen den muur aangroeien, waardoor zij in 't geheel niet behoeft te worden aangebonden. Het blad wordt ook fraai bloedrood in den herfst.

Clematis, in vele schoone soorten op naam, p. st. f 0.60

Clematis Jackmanni „ „ - 0.75

Prachtige donkerblauwe Clematis.

Hedera Helix, gewone klimop „ „ - 0.50

Polygonum Auberti „ „ - 0.75

Komt veel overeen met de volgende, maar is minder vatbaar voor ziekte.

Polygonum Baldschuanicum p. st. f 0.75

Met sneeuw witte bloemen van juli tot September.



E. Vruchtboomen en diverse Ooftgewassen.

N.B. Wanneer vruchtboomen bij strenge vorst mochten aankomen, mogen ze vooral niet direct worden uitgepakt. Men berge de pakken op een vorstvrije plaats in schuur of kelder en late ze eerst langzaam ontdooien.

APPELS.

Hoogstam kroonboomen, in soorten naar onze keus,
p. st. f 1.25

Vruchtstruiken.

AALBES, Fay's Prolific, grootvr. roode,
p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15

" **Hollandsche roode dikkop**,
p. 10 st. f 1.60, p. st. f 0.20

Deze soort is een buitengewoon krachtige groeier en gemakkelijk te herkennen aan de donkere, eenigszins gekrulde, forsche bladeren en het dikke lichtgrijze hout, dat in een dikken eindknop eindigt. Zij bloeit later dan andere soorten, waardoor de bloesem zelden bevroren ook later rijpt dan de meeste andere, zoodat men van deze soort nog vruchten kan plukken, als er overigens geen aalbessen meer zijn. Zij geeft zeer lange trossen met buitengewoon groote, lichtroode doorschijnende bessen, die een heerlijken, frisschen smaak hebben.

Deze soort overtreft alle andere soorten in rijkdragendheid.

AALBES, Hoornsche roode grootvruchtige,
p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15

" **Kernlose** . . . " 10 " - 2.40, " " - 0.30
Zeldzame soort met roode vruchten, voortreffelijk voor Compôte.

AALBES, peervormige . p. 10 st. f 3.60, p. st. f 0.45
Nieuw, met zeer lange trossen roode bessen.

AALBES, witte van „Bar-le-Duc”,
p. 10 st. f 2.40, p. st. f 0.30

Deze nieuwe Aalbes is een buitengewoon sterke groeier. De bessen bevatten nagenoeg geen pitten, waarom zij bijzonder voor het bereiden van Jam is aan te bevelen. Voor het bereiden van de in Frankrijk bekende „Confiture de Bar-le-Duc” wordt deze soort uitsluitend gebruikt.

AALBES, witte Kromhout . p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15

" **lang-trossige**, " 10 " - 2.—, " " - 0.25
Bijzonder krachtig groeiende soort, welke als een der rijkstdragende kan worden aanbevolen. De grootste trossen zijn vaak 20 cm. lang met vele groote bessen van geelachtig witte kleur en heerlijken smaak.

AALBES zwarte Boskoop Giant,
p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15

Bijzonder grootvruchtige nieuwe zwarte bes, welke in Engeland in de laatste jaren zeer veel opgang heeft gemaakt, en daar thans zeer gezocht is, vooral omdat zij minder vatbaar is voor ziekten.

AALBES, zwarte Gollath, p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15
Voortreffelijke, sterke, gezonde soort; groote trossen met schoone groote vruchten.

FRAMBOOS Gollath, . p. 100 st. f 4.50, p. 10 st. f 0.70

Door hare sterke vertakkingen, als ze flink ruim geplant is, levert deze nieuwe framboos veel meer op dan vele

andere soorten. Bovendien heeft zij het voordeel van zeer vroeg rijp te zijn. De vruchten zijn van heerlijken smaak, groot van afmeting en sterk, zoodat zij bij het verpakken niet licht kneuzen.

FRAMBOOS Hornet, bekende uitnemende soort,
p. 100 st. f 4.—, p. 10 st. f 0.60

FRAMBOOS Immertragende von Feldbrunnen,
p. 100 st. f 5.—, p. 10 st. f 0.70

Deze soort geeft een enorme opbrengst, daar zij niet alleen gelijk met andere vroege soorten draagt, maar ook in den herfst een rijke opbrengst geeft. Zeer aanbevelenswaardig.

FRAMBOOS Superlative, rijkdragend en geurig,
p. 100 st. f 3.—, p. 10 st. f 0.50

" **The Devon** " 100 " - 5.—, " 10 " - 0.70

Voortreffelijke nieuwe krachtig groeiende Framboos. De struiken bereiken een hoogte van 2½—3 Meter. De groote vruchten zijn rondachtig kegelvormig, saprijk, en van eenen heerlijken, frisschen smaak. De opbrengst dezer soort is in één woord verbazend en de vruchten welke goed rijp worden zijn buitengewoon groot.



Loganbes.

LOGANBES p. st. f 0.35

Zeer geurige vruchten, het midden houdende tusschen braam en framboos.

Diversen.

TURFSTROOISEL.

De *grove* kwaliteit hiervan wordt hoofdzakelijk gebruikt als strooisel in de stallen, waar het verre bovenstroo te verkiezen is.

Het *fijne* strooisel wordt gebezigd in kippen- en duivenhokken en ter bedekking van rozen en bloembollen gedurende den winter; voorts om er de potten in te plaatsen in broeibakken en serres en voor het vermengen van kleigrond, waar perken met Rhododendrons, Coniferen, enz. worden aangelegd.

Verder ter vermenging van bakaarde en om gedurende den winter Knol-Begonia's, Lelies enz. in te bewaren.

Het wordt geleverd in geperste pakken van omstreeks 100 kilo. De prijzen zijn aan verandering onderhevig.

Proefbalen fijn f 2.50; grof f 2.25
Per 1000 kilo. „ - 18.—; „ - 16.—

Grootere hoeveelheden prijs per correspondentie.

BLOEMENMEST.

Van deze geconcentreerde *Kunst- of Bloemenmest* zijn in de laatste jaren de prachtigste resultaten verkregen; op de meest verschillende gewassen, als: Potplanten, Begonia's, Rozen, Palmen, Azalea's en Gazons, is zij met succes aangewend.

Voor *Potplanten* strooie men om de 4 à 5 weken een eierlepelje op elken pot.

Voor *Bloemen* in den vollen grond neme men 1 ons op den vierkanten meter.

Ook verdient het aanbeveling voor *Grasperken*; men strooie dan in Maart 1 ons op den vierkanten meter.

Men kan deze mest ook met succes gebruiken om bij het oppotten van planten den grond te vermengen en neme dan 1 kilo op 1 hectoliter grond.

Deze mest kan, mits droog bewaard, zeer lang goed blijven.

Prijzen: Per kilo f 0.65; bij minstens 5 kilo (bruto) tegelijk f 0.60 per kilo.

RAFFIA-BINDBAST

in gevlochten strengen; 1e kwaliteit, per kilo f 1.50.

TONKING TUINSTOKKEN,

van Bamboe, om bij Dahlia's, Rozen enz. te plaatsen; lengte pl.m. 1.80 meter.

Per stuk f 0.08; per 100 stuks f 7.—.

STEEK-ETIQUETTEN, met olieverf geel geschilderd.

No. 1.	Lengte 35 cM., breedte 3.5 cM., p. 100 st. f 1.50
„ 2.	„ 25 „ „ 3.0 „ „ 100 „ - 0.80
„ 3.	„ 20 „ „ 3.0 „ „ 100 „ - 0.70
„ 4.	„ 16 „ „ 2.0 „ „ 100 „ - 0.40
„ 5.	„ 10 „ „ 1.5 „ „ 100 „ - 0.25

HANG-ETIQUETTEN, met olieverf geel geschilderd en voorzien van gegalvaniseerd draad.

No. 1.	Lengte 10 cM., breedte 3.0 cM., p. 100 st. f 0.55
„ 2.	„ 8 „ „ 3.0 „ „ 100 „ - 0.50
„ 3.	„ 10 „ „ 2.0 „ „ 100 „ - 0.50

KANKERWAS, middel tegen kankerziekte, p. bus f 1.—

ENTWAS, om koud te gebruiken, per bus . . - 0.75

X. L. ALL.

Het eenige, voor planten onschadelijke besproeiingsmiddel ter verdelgung van Insecten (in zeepvorm, ter oplossing in water); per doos van 1/2 Kilo f 2.—; 1 1/2 Kilo f 5.50, 3 1/2 Kilo f 12.— met gebruiksaanwijzing.

NESTKLOSSEN.

BROEDNESTEN,

SLAAPHOKJES voor VOGELS.

SYSTEEM „VAN TONGEREN.”

Voor VOLIÈRE, TUIN, BOSCH en WANDELPARKEN, ter bevordering der nestgelegenheid voor insectenetende vogels.

Nooit mag een nest achterover hangen, daar dan water in het vlieggat dringt en de vogels daardoor het nest niet betrekken. Alle nesten moeten steeds goed vast en zoveel mogelijk met de opening naar het Zuid-Oosten worden aangebracht.



De hieronder aangeboden zijn geschikt voor Koolmees, Pimpelmees, Zwartkopmees, Zwarte Mees, Kuifmees, Boomklever, Draaihal, Zwartgrijs, Vliegenvanger, het gekraagde Roodstaartje en de kleine bonte Specht.

No. 1a.	Natuurhout p. st. f 0.65
„ 1b.	„ eekhoornvrij door gaas „ „ - 0.85

**VOEDERBLOKKEN.**

Zeer aardig en praktisch, met veel succes in groote en kleine tuinen in de nabijheid der broed-nesten of aan raamkozijnen op te hangen.

Door asphalt wordt het zaad tegen water bewaard en kan gemakkelijk van boven worden gevuld.

Werkt automatisch, waardoor er geen zaad verloren gaat.

No. 8a. Natuurhout, *p. stuk* f 0.70.

NESTKLOSSEN.

SYSTEEM MARIUS LEYDS.

Voor Spreeuwen, Spechten, enz., *per stuk* f 0.70

VOGELVOEDER.

Koolzaad	<i>per ons</i>	f 0.30
Slazaad	" "	- 0.30
Radijszaad	" "	- 0.15

PRIMA ENGELSCHES MESSEN

in prijzen van f 1.— tot f 2.— per stuk.

**SNOEISCHAREN**

in prijzen van f 2.— tot f 6.— per stuk.

Bij bestelling gelieve men op te geven hoeveel men ongeveer wenscht te besteden.

„DECORATIEVE TUINBEPLANTING”

DOOR

A. J. VAN LAREN

Hortulanus aan den Hortus Botanicus te Amsterdam.

Prijs f 12.—.

Dit boek kan ik aan elken liefhebber van den tuin en vooral ook aan hen, die een betrouwbaren gids wenschen voor het gebruik van vaste planten in den tuin, ten zeerste aanbevelen. Uit elke bladzijde van het boek spreekt de groote liefde van den heer van Laren voor de natuur en voor den rijkdom van vaste planten, heesters enz. die tegenwoordig den bloemenliefhebber wordt aangeboden. Vooral aan hen, die in hun tuin zoogenaamde Borders of Boordbedden willen aanleggen, geeft dit boek talrijke wenken en ook afbeeldingen, die getuigen dat de heer Van Laren van zijn onderwerp een grondige studie heeft gemaakt.



ALPHABETISCH REGISTER

van Zaden, Planten, Heesters, enz.

	Bladz.		Bladz.		Bladz.		Bladz.
Aalbessen	109	Asparagus	36	Calceolaria	36	Cynoglossum	21, 60
Abies	106	Aspersie	2, 44	Calendula	17	Cynosurus	13
Abutilon	36	Asperula	16	Calla	98	Cypres	106
Acacia	36	Asphodelus	51	Calliopsis	17, 18	Cyrtipedium	60
Acaena	48	Aspidium	97	Calluna	96	Cystopteris	97
Acanthus	48	Asplenium	97	Caltha	98		
Achillea	48	Aster	16, 17, 51, 52	Campanula	18, 40, 41, 43, 56, 57	Dactylus	13
Aconitum	43, 48	Astilbe	43, 53, 54, 55	Cannabis	18	Dahlia's	21, 46
Acorus	98	Athyrium	97	Canna's	36	Daphne	105
Acroclineum	35	Aubriëtia	55	Cantaloupen	7	Datura	21
Actaea	43, 59	Augurken	2	Capucijners	4	Delphinium	21, 43, 60—63
Adiantum	97	Avena	13, 35	Cardamune	57	Dessertblad	12
Adonis	14, 48	Azalea	105	Cardonzen	12	Dessertkool	6
Afrikanen	31			Carduus	18	Dianthus	22, 41, 63
Agapanthus	49	Balsaminen	24	Carex	96	Dicksonia	97
Ageratum	14	Bambusa	96	Cassia	57	Dictyna	63
Agrostemma	14	Barbarea	55	Catananche	57	Dictamnus	43, 63, 64
Agrostis	13, 35	Bartonia	17	Celosia	37	Digitalis	41
Ajuga	49	Basilicum	12	Centaurea	18, 37, 57	Dille	12
Alisma	98	Bastaard klaver	13	Centranthus	19	Dimorphothea	22
Allosorus	97	Beemdlanbloeem	13	Chamaecyparis	106	Diplostephium	64
Alonsoa	14	Begonia	36, 45	Chamaepeuce	41	Diversen	110, 111
Alpecuris	13	Bekervaren	98	Cheiranthus	19	Doperwten	4
Alpenplanten	40, 98	Bellis	40	Chelone	58	Doronicum	64, 65
Alpenroos	105	Bessen	109	Chrysanthemum	19, 20, 37, 41, 58	Dotterbloem	98
Alstroemeria	49	Betonica	55	Chrysurus	35	Dracaena	38
Althaea	40	Bidens	17, 43, 55	Cichorei	3, 4	Dragon	12, 44
Alyssum	14, 40, 49	Bies	100	Cimicifuga	43, 59	Duizendschoonen	41
Amaranthus	15	Bieten	2	Cineraria	37	Dwerg-Asters	17
Ammobium	35	Bindsalade	10	Citroenkruid	12		
Ampelopsis	108	Bitterkers	11	Claytonia	8	Eccremocarpus	33
Amsonia	49	Blaasjeskruid	100	Clarkia	20	Echinacea	43, 64
Anagallis	15	Bleekselderij	11	Clematis	59, 60, 108	Echinops	64
Anchusa	15, 49	Bloemenmest	110	Cleianthus	37	Edeldistel	44, 66, 67
Andromeda	105	Bloemkool	5	Clitoria	33	Edelweiss	70
Andijvie	1	Bloemzaden	14—44	Cobaea	33	Eierplant	39
Anemonen	43, 49, 50	Bocconia	56	Codonopsis	43, 60	Elymus	64
Anemoneopsis	50	Boerenkool	6	Coix	35	Engelsch Raygras	13
Anjelieren	21	Bolbegonia's	36, 45	Coleus	37	Entwas	110
Antennaria	50	Boltonia	64	Collinsia	20	Epacris	38
Antheuis	50	Boonen	3	Collerette Dahlias	46	Epimedium	64
Anthericum	43, 50	Boonenkruid	12	Coniferen	106—108	Eragrostis	35
Antholyza	50	Boschbeemdgras	13	Convallaria	60	Eremurus	43, 64, 66
Anthoxanthum	13	Boschviooltje	43	Convolvulus	21	Erica	43, 96
Antirrhinum	15	Boterkool	12	Coreopsis	41, 60	Erigeron	66
Anijs	12	Brachycome	17	Coriander	12	Eriophorum	98
Aponogeton	98	Briza	35	Coriaria	60	Erodium	22, 66
Appelboomen	109	Brocoli	5	Cosmea	21	Erwteboonen	3
Aquilegia	40, 43, 50	Broednesten	110	Cosmidium	21	Erwten	4
Arabis	43, 50	Bromus	35	Colula	60	Eryngium	44, 66, 67
Arenaria	50	Browallia	17	Cowgras	13	Erythrochaele	67
Arctotis	15	Buddleia	56	Crambe	6	Eschscholtzia	23
Aristolochia	33	Bupththalmum	56	Crepis	21	Esschenkruid	43, 64
Armeria	50, 51	Butomus	98	Crinum	60	Etiquetten	110
Arnica	51	Buxus	105	Crusianella	60	Eulalia	96
Arrhenutrum	51			Cuphea	21	Eupatorium	67
Artemisia	15, 51	Oacalia	17	Cupressus	106	Euphorbia	67
Artisjokken	2	Cactus Dahlias	21, 46	Cyclamen	37, 38, 60	Evonymus	67
Asarum	51	Calampellis	33				
Asclepias	51	Calandrinia	17				

Bladz.		Bladz.		Bladz.		Bladz.	
Fioringras	13	<i>Hutchinsia</i>	73	Lelietje van dalen	60	<i>Oenothera</i>	27, 78
Frambozen	109	<i>Hydrocharis</i>	98	Lepelblad	12	<i>Omphalodes</i>	79
<i>Francoa</i>	38	<i>Hypericum</i>	73	<i>Leptosiphon</i>	24	<i>Onoclea</i>	98
Fransch Raygras	13	<i>Iberis</i>	24, 73	<i>Leptosyne</i>	25	<i>Onopordon</i>	42
<i>Freesia</i>	38	<i>Ilex</i>	105	Leverbloem	72	Ooftgewassen	109
<i>Fuchsia</i>	38, 67, 68	Immortellen	35	<i>Liatris</i>	44, 76	Oost-Ind. Kers	31, 32, 34
<i>Funkia</i>	44, 68	<i>Impatiens</i>	24, 39	Lieve vrouwebedstr.	12, 44	<i>Ornithopus</i>	13
<i>Gaillardia</i>	23, 44, 68	<i>Imperata</i>	96	<i>Ligularia</i>	76	<i>Orobis</i>	44, 79
<i>Galega</i>	69	Incarnaat	13	<i>Linaria</i>	25, 42, 76	<i>Osmunda</i>	98
<i>Gaura</i>	23	<i>Incarvillea</i>	44, 73	<i>Linum</i>	25, 42	Overbl. Klaver	13
Gazongras	13	Insecten-middel	110	<i>Lithospermum</i>	76	Overbl. Planten	40-98
Gazonplanten	96, 97	<i>Inula</i>	73	<i>Lobelia</i>	25, 42	Overbl. Spinazie	11
Gebroken-hart	63	<i>Ipomaea</i>	33	Loganbes	109	<i>Oxalis</i>	27, 79
<i>Genista</i>	69	<i>Iris</i>	73-75, 98	<i>Lolium</i>	13		
<i>Gentiana</i>	69	Italiaansch Raygras	13	<i>Lotus</i>	39	Paardepeen	13
<i>Geranium</i>	69	Ivoordistel	41	<i>Lunaria</i>	42	<i>Paeonia</i>	79
<i>Gerbera</i>	41	Jaapjespeen	13	Lupinen	13, 25, 44, 76	Pampasgras	96
<i>Gesneria</i>	38	Japansche Azalea's	105	Luzerne	13	<i>Papaver</i>	27, 42, 80
<i>Geum</i>	44, 69, 70	Japansche hop	33	<i>Lycunis</i>	44, 76, 77	<i>Passiflora</i>	34
<i>Gilia</i>	23	Japansche Rozen	104	<i>Lysimachia</i>	77	Pek-Anjer	77
<i>Gillenia</i>	44, 70	Jobstranen	35	<i>Lythrum</i>	44, 77	<i>Pelargonium</i>	39
Gipskruid	23, 42, 70	Judaspenning	42			<i>Pentstemon</i>	42, 80
<i>Gladiolus</i>	46	Juffertje in 't groen	27	Maagdepalm	95	Peper (Spaansche)	12
Glaskoolrapen	6	<i>Juniperus</i>	107	<i>Magnolia</i>	106	<i>Perilla</i>	28
<i>Glauetum</i>	23			Maidenhair	97	<i>Petasites</i>	80
<i>Glechoma</i>	70	Kaasjesbloem	77	Mais	36	Peterselie	7
<i>Gloxinia</i>	38, 46	Kalabassen	34	Majoraan	12, 44	<i>Petunia</i>	28
<i>Glyceria</i>	98	Kalmia	106	<i>Malope</i>	25	Peulen	4
<i>Gnaphalium</i>	70	Kalmuswortel	98	<i>Malva</i>	12, 44, 77	<i>Phaetia</i>	28
<i>Godetia</i>	23	Kamgras	13	Mangelwortelen	13	<i>Phalaris</i>	96
<i>Gomphrena</i>	35	Kankerwas	110	Margeriet	19, 20, 37, 41, 58	<i>Phleum pratense</i>	13
Goudsbloem	17	Kapperkool	6	Mariadistel	18	<i>Phlox amoena</i>	80
Gras-Anjelier	41	Kattestaart	15	<i>Matricaria</i>	25	" <i>Arends</i>	81
Graszaden	13	Kelkvaren	98	<i>Maurandia</i>	34	" <i>decussata</i>	44, 81, 82
Groentezaden	1-12	Kerstroos	71	<i>Meconopsis</i>	77	" <i>divaricata</i>	83
<i>Gunnera</i>	96	Kervel	12	<i>Medeola</i>	39	" <i>drummondii</i>	28, 29
<i>Gynertium</i>	96	Klaverzaden	13	<i>Megasia</i>	77	" <i>setacea</i>	83
<i>Gypsophila</i>	23, 42, 70	Klimkomkommers	5	Meide	12	" <i>suffruticosa</i>	83
		Klimop	108	<i>Melissa</i>	77	<i>Physalis</i>	83
Hanekammen	37	Klimplanten	33, 34, 108	<i>Melittis</i>	77	<i>Physostegia</i>	83
Hangetiquetten	110	Klimrozen	103	Meloenen	7	<i>Picea</i>	107
<i>Harpalum</i> (zie <i>Helianthus</i>)		Klokbloemen	18, 40, 41, 43, 56, 57	<i>Menyanthes</i>	98	Pimpernel	12
Hazestaart	36	Knolbegonia's	36, 45	<i>Mertensia</i>	77	Pinksternakels	13
<i>Hedera</i>	108	Knollen	9, 13	<i>Mesembrianthemum</i>	26	Pioen-Dahlia's	46
<i>Hedysarum</i>	70	Knolrapen	6, 13	Messen	111	Pioenrozen	79
Heerenboonen	3	Knolselderij	11	<i>Meum</i>	77	<i>Pityrospermum</i>	83
Heesters	104	<i>Koelia</i>	24	Mierikswortel	44	Planten v/d. Moestuin	44
Heide	43, 96	Koepeen	13	<i>Mimosa</i>	39	<i>Platyodon</i>	43, 56
<i>Helanium</i>	70	Kogeldistel	64	<i>Mimulus</i>	26	Pluksalade	10
<i>Helianthella</i>	44, 71	Komkommers	5	<i>Mina tobata</i>	34	<i>Plumbago</i>	83
<i>Helianthemum</i>	71	Komijn	12	<i>Mirabilis</i>	26	<i>Poa</i>	13
<i>Helianthus</i>	24, 71	Koningsvaren	98	Molsalade	10	<i>Podophyllum</i>	83
<i>Helichrysum</i>	35, 71	Kool	5, 6	<i>Monarda</i>	77	<i>Polemonium</i>	83
<i>Helopsis</i>	71	Koolrabi	6	Monnikskap	43, 48	Polyantharozen	101
<i>Heliotropium</i>	38	Koolrapen	6, 13	<i>Montbretia</i>	77, 78	<i>Polygala</i>	83
<i>Helleborus</i>	71	Kooltje vuur	14	Mosterd	12	<i>Polygonum</i>	84, 108
Hemelroosje	14	Korenbloem	18, 57	<i>Mulgedium</i>	78	<i>Polypodium</i>	98
<i>Hemerocallis</i>	72	Kraag-Dahlia's	46	Muskusplant	26	<i>Polystichum</i>	98
<i>Hepatica</i>	72	Kropaar	13	Muurbloemen	19	Pompoenen	7
<i>Heraclum</i>	72	Kropdunsel	10	<i>Myosotis</i>	42	<i>Portulaca</i>	29
Herfst-Anemonen	43, 49, 50	Kropsalade	9, 10			Postelein	8
Herfst-Asters	51, 52	Krootten	2	Nachtschoonen	26	<i>Potentilla</i>	84
Herfst-Seringen	44, 81, 82	Kruidje-roer-mij-niet	39	<i>Nemesia</i>	26	Potplanten	36-40
Herfst-Violieren	19			<i>Nemophila</i>	26	Prei	8
<i>Heuchera</i>	72	<i>Lagurus</i>	36	<i>Nepeta</i>	78	<i>Primula</i>	39, 42, 44, 84, 85
<i>Hieracium</i>	72	Lampionplant	83	<i>Nesaea</i>	78	Princesseboonen	3
<i>Holcus</i>	13, 96	Landbouwzaden	13	Nestklossen	110, 111	Pronkboonen	3
Hoogstamrozen	103	<i>Lastrea</i>	97, 98	<i>Nieotiana</i>	26, 27	<i>Prunella</i>	86
Hoppeklaver	13	<i>Lathyrus</i>	24, 33, 34, 42, 75	<i>Nierenbergia</i>	78	<i>Pseudotsuga</i>	107
<i>Hordeum</i>	36	<i>Lavatera</i>	39, 76	Nieuw Zeel. Spinazie	11	<i>Pulmonaria</i>	86
<i>Hottonia</i>	98	Lavendel	12, 44	<i>Nigella</i>	27	Pijlkruid	100
<i>Houstonia</i>	72	<i>Lavendula</i>	76	<i>Nuphar</i>	98	<i>Pyrethrum</i>	42, 86
Hulst	105	Leeuwenbekjes	15	<i>Nycterinia</i>	27		
<i>Humulus</i>	33			<i>Nymphaea</i>	99	Raapstelen	9
						Rabarber	8, 44

	Bladz.		Bladz.		Bladz.		Bladz.
Radijs	8	Siepels	12	<i>Thalictrum</i>	43, 44, 92	<i>Viscaria</i>	32
Raffia	110	Siergrassen	35, 96	<i>Thermopsis</i>	92	Vlambloemen	28, 29, 44, 81, 82
Ramenas	8	Sierheesters	104	<i>Thunbergia</i>	34	Voederblokken	111
<i>Randpalu</i>	105	Sierkalabassen	34	<i>Thuya</i>	108	Voedergewassen	13
<i>Ranunculus</i>	87, 100	Siertabak	26, 27	<i>Thuyopsis</i>	108	Voederknollen	13
Rapen	9, 13	<i>Silene</i>	31, 90	Thym	12	Voederwortelen	13
Raygras	13	<i>Silphium</i>	90	<i>Thymus</i>	92, 93	Vogelvoeder	111
<i>Rehmannia</i>	43	Sjalotten	11	<i>Tiarella</i>	93	Voorjaars-Asters	51
Reseda	29	Slaaphokjes v. vogels	110	Timotheegras	13	Vossestaart	13
<i>Retinosporu</i>	107	Slaboonen	3	Tomaten	11	Vruchtboomen	109
Reukgras	13	Slangenwortel	98	Tonkingstokken	110	Vruchtstruiken	109
Reuzendistel	42	Sleutelbloem	44, 85	<i>Torenia</i>	40	Vuurpijl	93
Reuzenhennepe	18	Snoeimessen	111	<i>Tradescantiu</i>	93	Vuurwerkplant	43, 64
<i>Rhexia</i>	87	Snoeischaren	111	<i>Tricyrtis</i>	93		
<i>Rhodanthe</i>	35	Snijbiet	2	Trilgras	35	Waldmeister	12, 44
<i>Rhododendron</i>	104, 105	Snijboonen	3	<i>Trillium</i>	93	Warmoes	2
<i>Ricinus</i>	30	Snijmoes	12	<i>Tritonia</i>	93	Waterdriëblad	98
Riddersporen	21, 43, 60—63	Snijsalade	10	<i>Trollius</i>	44, 94	Watergentiaan	100
<i>Rodgersia</i>	44, 87	Snijselderij	10	<i>Tropaeolum</i>	31, 32, 34, 94	Waterkers	12
<i>Rouneya</i>	87	<i>Solanum</i>	39	Tuinboonen	3	Waterlies	98, 99
Roode Klaver	13	<i>Soldanella</i>	90	Tuinbouwartikelen	110, 111	Waterplanten	98—100
Roode Kool	6	<i>Solidago</i>	90	Tuingereedschapp.	110, 111	Waterweegbree	98
Rood Vlas	25	Sparren	106, 107	Tuinkers	11	Westerw. Raygras	13
<i>Rosa Polyantha</i>	101	<i>Spergula</i>	13	Tuinselderij	10	<i>Whitlavia</i>	32
„ <i>rugosa</i>	104	Spersieboonen	3	Tuinstekken	110	Wingerd	108
Rotsplanten	40—98	<i>Spigelia</i>	90	Tulpenboom	106	„ (wilde)	108
Rozemarijn	12	Spinazie	11	Tulpenpapaver	27	Winterpostelein	8
Rozen	100—103	<i>Spiraea</i>	90, 91, 92	Turfstrooiisel	110	Winterviolieren	19
<i>Rudbeckia</i>	43, 64, 87	Spruitkool	6	Turnips	13	Winterwortelen	12
<i>Rumex patientia</i>	11	Spurrie	13	<i>Typha</i>	100	Witloof	4
Ruw beemdgras	13	<i>Stachys</i>	92			Witte klaver	13
		Stamboonen	3	Uien	12	Witte kool	5, 6
<i>Sagittaria</i>	100	Stamrozen	103	<i>Utricularia</i>	100	Witte-onschuld	21
<i>Saintpaulia</i>	39	<i>Statice</i>	31, 92	<i>Uvularia</i>	94	Wonderboom	30
Salade	9, 10	Steeketiquetten	110	Varens	97	Wortelen	12
Salie	12, 44	<i>Stenanthium</i>	92	Vaste Planten	40—98	Wortelpeterselie	7
<i>Salpiglossis</i>	30	Sterkers	11	Vedergras	36	Wijnruit	12
<i>Salvia</i>	30, 39, 43, 87	<i>Stipa</i>	36, 97	Veldbeemdgras	13		
<i>Sauvitalia</i>	30	<i>Stockesia</i>	92	Veldsalade	10	<i>Xeranthemum</i>	35
<i>Saponaria</i>	30, 88	Stokboonen	3	Venkel	12	X. L. All (Insectenmid.)	110
Savoye Kool	6	Stokrozen	40	Venushaar	97		
<i>Saxifraga</i>	89	<i>Stratiotes</i>	100	<i>Verbascum</i>	94	IJskruid	26
<i>Scabiosa</i>	30, 44, 89	<i>Streptocarpus</i>	40	<i>Verbena</i>	32	<i>Yucca</i>	95
Schapengras	13	Stroobloemen	35	Vergeet-mij-niet	42		
<i>Schizanthus</i>	31, 39	Struikrozen	100—103	Vergeet-mij-niet		<i>Zea</i>	36
Schorseneeren	10	Struisgras	35	(Kaapsche)	15	Zeekool	6
<i>Sciadopitys</i>	107	<i>Strulhiopteris</i>	98	<i>Veronica</i>	94, 95	Zeeviolieren	19
<i>Scirpus</i>	100	<i>Stylophorum</i>	92	Vetplanten	89	<i>Zinnia</i>	32
<i>Scolopendrium</i>	98	Suikerboonen	3	<i>Villarsia</i>	100	Zomer-violieren	19
<i>Scrophularia</i>	89	Suikerwortelen	13	<i>Vinca</i>	40, 95	Zonnebloemen	24, 71
Secateur	111	<i>Synthyris</i>	92	<i>Viola cornuta</i>	43, 95	Zorggras	13
<i>Sedum</i>	89			„ <i>gracilis</i>	95	Zuring	12, 44
Seiderij	10, 11	Tabak	26, 27	„ <i>odorata</i>	43	Zwaardlelie	98
<i>Seuipervivum</i>	89	<i>Tagetes</i>	31	„ <i>tric. maxima</i>	32	Zwanebloem	98
<i>Senecio</i>	31, 44, 90	<i>Taxus</i>	107, 108	Violieren	19	Zweedsche klaver	13
Serradella	13	<i>Telekia</i>	92	Viooltjes	32	Zwenkgras (hard)	13
<i>Sidalcea</i>	44, 90	<i>Tetragonia</i>	11			„ (rood)	13



Ruimte voor Aanteekeningen.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Groentezaden, Bloemzaden,
Gras- en Klaverzaden, Vaste
Planten, Alpenplanten, Begonia's,
Siergrassen, Varens, Water-
planten, Struikrozen, Rhodo-
dendrons, Azalea's Coniferen,
Klimplanten, Bessenstruiken,
Vruchtboomen, Turfstrooisel,
enz. enz.